

Lääke ja raskaus -pilottihanke: Raskaudenaikainen lääkkeiden käyttö

Miia Artama

3.6.2008

LÄÄKEHOITO JA RASKAUS

-seminaari

Lääkelaitos


Tavoite

Tarkastella raskaudenaikaisen lääkkeiden käyttöä:


Synnytykseen päätyneiltä raskauksilta

Keskeytykseen päätyneiltä raskauksilta


Lääkkeiden käyttö raskauden aikana




Synnyttäneiden lääkkeiden käyttö raskauden aikana




Lääkkeiden käyttö raskauden aikana keskeytyksissä




Synnyttäneiden (n=341 833) yleisimmin hankkimat lääkkeaineet tai lääkeaineyhdistelmät




Yleisimmin hankitut lääkeaineet tai lääkeaineyhdistelmät keskeytyksissä (n=64 059)




Lääkkeitä hankkineiden osuudet yleisimmin käytetyissä lääkeryhmissä tupakoineilla ja tupakoimattomilla synnyttäneillä naisilla



Synnyttäneiden hankkimien lääkeaineiden tai yhdistelmävalmisteiden lukumäärät eri ikäryhmissä ja erityiskorvausoikeuden mukaan



Lääkeaineiden tai yhdistelmävalmisteiden lukumäärät eri ikäryhmissä ja erityiskorvausoikeuden mukaan keskeytyksissä



Yleisimmät erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat sairaudet synnytyksissä

Sairaus	erityiskorvaukseen oikeutetut		erityiskorvattuja lääkkeitä ostaneet	
	n	% oikeutetuista (n=20 601)	n	%
Astma	8 927	43,3	5 585	62,6
Kilpirauhasen vajaatoiminta	2 571	12,5	2 544	98,9
Epilepsia	2 310	11,2	1 388	60,1
Reuma	1 714	8,3	589	34,4
Diabetes	1 498	7,3	1 489	99,4
Krooninen verenpainetauti	1 378	6,7	1 166	84,6
Haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti	1 203	5,8	945	78,6
Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt	767	3,7	398	51,9

Yleisimmät erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat sairaudet keskeytyksissä

Sairaus	erityiskorvaukseen oikeutetut		erityiskorvattuja lääkkeitä ostaneeet	
	n	% oikeutetuista (n=3 985)	n	%
Astma	1 612	40,5	520	32,3
Epilepsia	540	13,6	251	46,5
Kilpirauhasen vajaatoiminta	407	10,2	256	62,9
Vaikeat psykoosit ja muut vaikeat mielenterveyden häiriöt	337	8,5	168	49,9
Reuma	301	7,6	100	33,2
Diabetes	296	7,4	232	78,4
Krooninen verenpainetauti	277	7,0	196	70,8
Haavainen paksusuolentulehdus ja Crohnin tauti	182	4,6	89	48,9

Johtopäätöksiä lääkkeiden käytöstä raskauden aikana

- Lähes joka toinen synnyttäneistä ja 30 % naisista joiden raskaus keskeytettiin, oli hankkinut reseptilääkkeitä raskauden ja/tai sitä edeltävän kuukauden aikana
- Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja oli kummassakin ryhmässä n. 6 %
- Pitkäaikaissairauksia sairastavat ja iältään vanhemmat synnyttäjät käyttivät lääkkeitä muita enemmän

Johtopäätöksiä lääkkeiden käytöstä raskauden aikana

- Yleisin raskaana olleiden naisten pitkäaikaissairaus oli astma
- Psykelääkkeiden käyttö oli yleisempää naisilla joiden raskaus keskeytettiin, verrattuna synnyttäneisiin, samoin raskausaikana tupakoinneilla äideillä verrattuna tupakoimattomiin
- Aineisto tarjoaa hyvät mahdollisuudet arvioida reseptilääkkeiden haitallisuutta sikiön ja raskaudenkulun kannalta

Johtopäätöksiä lääkkeiden käytöstä raskauden aikana

- Puolet raskaana olleista naisista ei käytä lääkkeitä
- Suurin osa käytettävistä lääkkeistä on turvallisia
- Osasta lääkkeitä ei tiedetä onko turvallisia
- Osa lääkkeitä tiedetään haitallisiksi: järjestelmän tarkoituksena on tukea haittojen minimointia oikealla lääkehoidolla