

# Potilasopas

**LIBTAYO** ▼  
(semiplimabi)

## Tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa immuunivälitteisiin haittavaikutuksiin liittyvien komplikaatioiden minimoimiseksi

Tämä potilasopas auttaa sinua tunnistamaan LIBTAYO-hoidon (semiplimabin) haittavaikutuksia ja ilmoittamaan niistä.

Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean verkkosivuilla: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi). Lisätietoja saat pakkausselosteesta osoitteesta [www.laakeinfo.fi](http://www.laakeinfo.fi) tai soittamalla Regeneronin lääketietopalveluun, puh. 0800 772223 tai sähköpostitse: [medical.information\\_Global@regeneron.com](mailto:medical.information_Global@regeneron.com)

### Tärkeää tietoa

- Kerro lääkärille kaikista sairauksistasi ja kaikista käyttämästäsi lääkkeistä ennen kuin käytät LIBTAYO-valmistetta.
- LIBTAYO voi aiheuttaa vakavia haittavaikutuksia, jotka voivat pahentua.
- Ilmoita kaikista haittavaikutuksista lääkärille, vaikka niitä ei olisi mainittu tässä potilasoppaassa.
- Ilmoita viipymättä kaikista haittavaikutuksista lääkärille, vaikka olisit poissa kotoa.
- Älä yritä hoitaa mitään haittavaikutuksia itse kysymättä ensin neuvoa lääkäriltä.
- Pidä potilaskortti aina mukana hoidon aikana.
- Näytä potilaskortti aina, kun käyt jonkun muun kuin sinulle LIBTAYO-valmistetta määränneen lääkärin vastaanotolla.

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista Fimealle: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA; tai sähköpostitse myyntiluvan haltijalle Regeneronille: [medical.information\\_Global@regeneron.com](mailto:medical.information_Global@regeneron.com).

## Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos havaitset jonkin seuraavista merkeistä tai oireista tai jos ne pahenevat:

### Ihovaivat

- ihottuma tai kutina
- rakkuloiden muodostuminen iholle
- haavaumat suussa tai muilla limakalvoilla

### Keuhkovaivat (pneumoniitti)

- uusi tai paheneva yskä
- hengenahdistus
- rintakipu

### Suolistovaivat (paksusuolitulehdus)

- toistuva ripuli, joka on usein veristä tai limaista
- tihentynyt ulostamistarve
- musta tai tervamainen uloste
- voimakas vatsakipu tai vatsan aristus

### Maksavaivat (maksatulehdus)

- ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus
- voimakas pahoinvointi tai oksentelu
- kipu vatsan oikealla puolella
- uneliaisuus
- tumma (teen värinen) virtsa
- verenvuotoalttius tai normaalia herkempi mustelmien muodostuminen
- näläntunteen heikkeneminen

### Hormoneja erittäviin rauhasiin liittyvät vaivat

- itsepintainen tai epätavallinen päänsärky
- nopea syke
- lisääntynyt hikoilu
- poikkeava palelu tai kuuma olo
- voimakas väsymys
- huimaus tai pyörtyminen
- painonnousu tai painonlasku
- tavallista voimakkaampi nälän tai janon tunne
- hiusten lähtö
- ummetus
- äänen madaltuminen
- hyvin matala verenpaine
- tihentynyt virtsaamistarve
- pahoinvointi tai oksentelu
- vatsakipu
- muutokset mielialassa tai käytöksessä (kuten seksuaalisen halun heikkeneminen, ärtyneisyys tai unohtelu)

### Tyypin 1 diabeteksen tai diabeettisen ketoasidoosin oireet

- tavallista voimakkaampi nälän tai janon tunne
- tihentynyt virtsaamistarve
- painonlasku
- väsymys tai pahoinvointi
- mahakipu

- nopea ja syvä hengitys
- sekavuus
- poikkeava uneliaisuus
- makealta tuoksuva hengitys, makea tai metallinen maku suussa tai muutos virtsan tai hien hajussa

### Munuaisvaivat (munuaistulehdus ja munuaisten vajaatoiminta)

- harventunut virtsaamistarve
- verivirtsaisuus
- nilkkojen turvotus
- näläntunteen heikkeneminen

### Infuusion liittyvät reaktiot (jotka voivat joskus olla vaikeita tai hengenvaarallisia)

- vilunväristykset
- vapina tai kuume
- kutina tai ihottuma
- kasvojen punoitus tai turvotus
- hengenahdistus tai hengityksen vinkuminen
- huimaus tai pyöritys
- selkä tai niskakipu
- pahoinvointi
- oksentelu
- vatsakipu

### Muulla elimistössä ilmenevät vaivat

- Hermostoon liittyvät vaivat
  - päänsärky tai niskan jäykkyys
  - kuume
  - väsymys tai heikotus
  - vilunväristykset
  - oksentelu
  - sekavuus
  - muistiin liittyvät vaikeudet tai uneliaisuus
  - kohtaukset (kouristuskohtaukset)
  - näkö- tai kuuloharhat (aistiharhat)
  - vaikea lihasheikkous
  - pistely, tunnottomuus, heikkous tai polttava kipu käsivarsissa ja jaloissa
  - raajojen halvaus
- Lihas- ja nivelvaivat
  - nivelkipu tai -turvotus
  - lihaskipu, -heikkous tai -jäykkyys
- Silmävaivat
  - näkökyvyn muutokset
  - silmäkipu tai silmien punoitus
  - valoherkkyys
- Sydämeen ja verenkiertoelimistöön liittyvät vaivat
  - sykemuutokset, nopea sydämensyke, tunne, että sydän jättää lyönnin väliin, sydämentykytys
  - rintakipu
  - hengenahdistus
- Muut
  - kuivuus elimistön eri puolilla, kuten suussa, silmissä, nenässä, kurkussa ja ihon pintakerroksissa
  - mustelmat iholla tai verenvuoto, maksan ja/tai pernan suureneminen, imusolmukkeiden suureneminen

## Tärkeät yhteystiedot

Lääkärin nimi \_\_\_\_\_

Lääkärin puhelinnumero \_\_\_\_\_

Oma nimeni \_\_\_\_\_

Oma puhelinnumeroni \_\_\_\_\_

Lähiomainen hätätilanteita varten \_\_\_\_\_

Lähiomaisen puhelinnumero \_\_\_\_\_

**REGENERON**

© 2024 Regeneron Ireland DAC. Kaikki oikeudet pidätetään.