

Potilaskortti

Rivaroxaban Krka 2,5 mg
Rivaroxaban Krka 10 mg
Rivaroxaban Krka 15 mg
Rivaroxaban Krka 20 mg



(merkitse potilaalle määrätty annos rastiamalla ruutu)

603327

- ◆ Pidä tämä kortti aina mukanas
- ◆ Näytä tämä kortti aina lääkärille tai hammaslääkärille ennen hoitotoimenpiteitä



Tietoa terveydenhuollon ammattilaiselle:

- ◆ INR-mittausta ei tule käyttää, koska se ei kuvaa Rivaroxaban Krka -valmisteen antikoagulanttivaikutusta luotettavasti.

Mitä minun tulisi tietää Rivaroxaban Krka -valmisteesta?

- ◆ Rivaroxaban Krka ohentaa verta ja estää siten vaarallisten veritulppien muodostumisen.
- ◆ Ota Rivaroxaban Krka -valmistetta juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Parhaan suojan veritulppia vastaan saat, **kun otat sinulle**

määrätyt annokset säännöllisesti.

- ◆ Älä lopeta Rivaroxaban Krka -valmisteen ottamista keskustelematta ensin lääkärin kanssa, sillä lopettaminen saattaa lisätä veritulpan riskiä.
- ◆ Ennen kuin aloitat ottamaan Rivaroxaban Krka -valmistetta, kerro lääkärille kaikista muista lääkevalmisteista, joita parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai aiot alkaa ottaa.
- ◆ Kerro aina että käytät Rivaroxaban Krka -valmistetta ennen kuin sinulle tehdään kirurginen tai muu toimenpide.

Milloin tarvitsen lääkärin apua?

- Rivaroxaban Krka -valmisteen kaltaista verenohennuslääkettä käytettäessä on tärkeää olla tietoinen sen mahdollisista haittavaikutuksista. Yleisin haittavaikutus on verenvuoto. Jos tiedät, että sinulla on verenvuotoriski, älä ala käyttää Rivaroxaban Krka -valmistettä keskustelematta asiasta ensin lääkärin kanssa. Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulla ilmenee jotain seuraavista verenvuodon merkeistä tai oireista:
- ◆ kipua

- ◆ turvotusta tai epämukavuutta
- ◆ päänsärkyä, huimausta tai heikotusta
- ◆ epänormaalia mustelmien muodostumista, nenä- tai ienverenvuotoa tai jos verenvuodon tyrehtyminen kestää poikkeuksellisen kauan
- ◆ tavallista runsaampaa kuukautisvuotoa tai muuta verenvuotoa emättimestä
- ◆ virtsassasi on verta ja se voi olla vaaleanpunaista tai ruskeaa taikka ulosteesi ovat punaisia tai mustia
- ◆ yskit verta taikka oksennat verta tai kahvinporoja muistuttavia hiukkasia

Miten otan Rivaroxaban Krka -valmistetta?

- ◆ Parhaan suojan saamiseksi Rivaroxaban Krka
 - 2,5 mg voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman
 - 10 mg voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman
 - 15 mg tulee ottaa ruoan kanssa
 - 20 mg tulee ottaa ruoan kanssa



Haittavaikutuksista ilmoittaminen

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden
haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

sekä myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

KRKA Finland Oy, pharmacovigilance.fi@krka.biz, puh. 020 754 5330

Versio: 1.0, Fimean hyväksymispäivämäärä: 2.12.2020

**Käytän verohennuslääkettä, joka on Rivaroxaban Krka
(rivaroksabaani)**

Nimi: _____

Osoite: _____

Syntymäaika: _____

Paino: _____

Muut lääkkeet/sairaudet: _____

Hätätapauksissa ilmoittakaa:

Lääkärin nimi: _____

Lääkärin leima: _____

Lääkärin puhelin: _____

Ilmoittakaa myös:

Nimi: _____

Puhelin: _____

Suhde potilaaseen: _____