

Kun tarvitset lisätietoja:

- Keskustele lääkärisi, hoitajasi tai apteekkihenkilökunnan kanssa.
- Lue huolellisesti pakkausseloste, joka tulee lääkkeesi mukana.
- Soita Amphastar France Pharmaceuticals +358 75 3257709. Muina aikoina jätä viesti vastaajaan, niin palvelemme sinua mahdollisimman pian. Puhelu on sinulle maksuton.

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan viranomaiselle (www-sivusto: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, FI-00034 Fimea). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Voit ilmoittaa Amphastarin tuotteeseen liittyvän haittavaikutuksen tai tuotevirheepäilyn sähköpostitse gps@amphastar.com tai soittamalla Amphastar France Pharmaceuticals: n puhelinvaihteeseen +358 75 3257709.

FIMEAn hyväksymä 25.3.2024

Amphastar France Pharmaceuticals
Usine Saint Charles 60590 Eragny sur Epte,
Ranska
Puhelinvaihte: +358 75 3257709
Tiedustelut: gps@amphastar.com

© 2024 Amphastar
All rights reserved.

Baqsimi® is a registered trademark of Amphastar

baqsimi®



VAIKEAN HYPOGLYKEMIAN HOITON

KÄYTTÖAIHE

Baqsimi® on tarkoitettu vaikean hypoglykemian hoitoon aikuisille, nuorille ja 4 vuotta täyttäneille lapsille, joilla on diabetes mellitus.

MITÄ BAQSIMI® ON

- Baqsimi® on nenään annosteltava glukagonijauhe. Glukagoni on luontainen hormoni, jota muodostuu haimassa. Glukagoni vaikuttaa päinvastoin kuin insuliini, eli se nostaa veren sokeripitoisuutta.
- Baqsimi® on käyttövalmis valmiste, joka ei vaadi sekoittamista. Kerta-annospakkaus sisältää vakioannoksen.
- Baqsimi®-valmiste ei vaadi sisäänhengitystä. **Baqsimi®-valmiste annetaan vaikean hypoglykemian hoitoon vaikka olisit tajuton, nenäsi olisi tukkoinen tai olisit ottanut jotain nenän tukkoisuutta lievittävää valmistetta.**
- Baqsimi®-valmistetta ei tarvitse säilyttää jääkaapissa. Valmiste tulee säilyttää alle 30°C lämpötilassa.
- **Tämä potilasohje perustuu Baqsimi®-valmisteen pakkauselosteeseen ja käyttöohjeeseen. Lue aina pakkausseloste ja käyttöohje huolellisesti ennen kuin aloitat Baqsimi®-valmisteen käytön.**

MILLOIN BAQSIMI®-VALMISTETTA KÄYTETÄÄN

- Baqsimi®-valmistetta käytetään vaikean hypoglykemian (erittäin matalan verensokerin) hoitoon, kun potilas ei pysty syömään tai juomaan itse ja tarvitsee toisen apua.
- On tärkeää, että ympärilläsi olevat ihmiset tunnistavat hypoglykemian mahdolliset oireet, jotta he voivat tarvittaessa auttaa sinua.

Mahdollisia hypoglykemian oireita voivat olla:

- huimaus
- keskittymisvaikeus tai sekavuus
- kouristukset tai tajunnan menetys
- mielialan vaihtelut
- koordinaatiokyvyn heikentyminen
- vapina tai hikoilu

MITEN BAQSIMI®-VALMISTETTA KÄYTETÄÄN

Lue Baqsimi®-valmisteen käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.

- Kerro perheenjäsenillesi ja ystävillesi, miten Baqsimi®-valmistetta käytetään. **Heidän on osattava käyttää Baqsimi®-valmistetta jo ennen kuin sitä tarvitaan.**
- **Älä** poista suojapäällystettä äläkä avaa koteloa ennen kuin olet valmis antamaan annoksen. Jos kotelo on avattu, lääkkeeseen on voinut joutua kosteutta, eikä lääke ehkä vaikuta oikein.
- **Älä** paina annospainiketta ennen nenään asettamista. Muussa tapauksessa kerta-annospakkauksessa oleva kerta-annos menee hukkaan.
- Baqsimi®-valmistetta ei tule käyttää pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen.

Annoksen valmistelu:

- Poista suojapäällyste vetämällä punaisesta nauhasta.
- Avaa kansi ja ota kerta-annospakkaus kotelosta.



Säilytä kerta-annospakkaus suojapäällysteisessä kotelossa annoksen antamiseen asti.

BAQSIMI®-VALMISTEEN ANNOSTELU

Annoksen antaminen:



- **PITELE** kerta-annospakkausta sormien välissä kuten kuvassa. **Älä paina annospainiketta ennen nenään asettamista.**



- **ASETA** kerta-annospakkauksen kärki toiseen sieraimeen.



- **PAINA** annospainike kokonaan pohjaan, **kunnes annospainikkeen vihreä viiva ei enää näy.**

BAQSIMI[®]-VALMISTEEN

ANNOSTELU (jatkuu)

Annoksen antamisen jälkeen:

Jos potilas on tajuton, käännä hänet Baqsimi[®]-valmisteen antamisen jälkeen kylkiasentoon tukehtumisen estämiseksi.

Soita heti hätänumeroon 112.

Kannusta potilasta syömään tai juomaan runsaasti sokeria sisältävää välipalaa, kuten makeisia tai hedelmämehua, mahdollisimman pian.

Hävitä käytetty kerta-annospakkaus ja kotelo.

Voit katsoa Baqsimi[®]-valmisteen
käyttöohjevideon osoitteessa
www.baqsimi.eu

KERRO LÄHEISILLESII, ETTÄ SINULLA ON BAQSIMI®- VALMISTE MUKANASI.

Alla olevassa keltaisessa Baqsimi®-kortissa on ohjeita, miten toimia vaikeassa hypoglykemiassa. Pidä keltaista korttia mukanasii.

Kirjoitathan kortin tyhjään kohtaan, missä säilytät Baqsimi®-valmistetta.

**VAIKEASSA
HYPOGLYKEMIASSA ETSI
KELTAINEN KOTELO.**

**MINULLA ON
DIABETES.
VAIKEASSA
HYPOGLYKEMIASSA
EN PYSTY
AUTTAMAAN
ITSEÄNI.**

Etsi **pieni keltainen kotelo.**
Säilytän sitä

Säilytä kerta-annospakkaus
suojapäällysteisessä kotelossa annoksen
antamiseen asti. Seuraa käyttöohjeita ja
soita hätänumeroon 112.