

PATIENTKORT FÖR ZESSLY® (INFLIXIMAB)

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Patientens namn: _____

Läkarens namn: _____

Läkarens telefonnummer: _____

Det här patientkortet innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver vara medveten om innan och under din behandling med Zessly. Visa alltid det här kortet för alla läkare som är delaktiga i att behandla dig (oavsett vilken sjukdom det gäller). Läs igenom bipacksedeln till Zessly noggrant innan du börjar ta den här medicinen.

Datum för behandlingsstart med Zessly: __ / __ / __

Nuvarande administrering: _____

Det är viktigt att du och din läkare antecknar varunamnet och tillverknings-satsnumret på läkemedlet.

Be läkaren att anteckna typ och datum för senaste screening(ar) för tuberkulos (TBC) nedan:

Test: _____

Datum: __ / __ / __

Resultat: _____

Test: _____

Datum: __ / __ / __

Resultat: _____

Se till att du alltid har med dig en lista över alla andra läkemedel som du använder när du träffar sjukvårdspersonal.

Lista över allergier: _____

Lista över andra läkemedel: _____

Rapportering av biverkningar

Om du märker några biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Du kan också rapportera biverkningarna direkt (se kontaktuppgifter nedan). Genom att rapportera biverkningarna kan du hjälpa till att få mer information om säkerheten för detta läkemedel.

Webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Infektioner

Innan du får behandling med Zessly:

- Tala om för läkaren om du har någon infektion, även om den är mycket lindrig.
- Det är mycket viktigt att du berättar för läkaren om du någon gång har haft TBC eller om du har haft nära kontakt med någon som har TBC. Läkaren kommer att ta ett prov för att se om du har TBC. Be läkaren anteckna typ och datum för senaste screening(ar) för TBC på kortet.
- Tala om för läkaren om du har hepatit B eller om du vet eller misstänker att du är bärare av hepatit B-viruset.

Under behandlingen med Zessly:

- Tala omedelbart om för läkaren om du har några tecken på en infektion. Sådana tecken kan bland annat vara feber, trötthet, (ihållande) hosta, andfåddhet, viktminskning, nattliga svettningar, diarré, sår, problem med tänderna, en brännande känsla när du kissar eller "influensaliknande" symtom.

Hjärtsvikt:

Innan du får behandling med Zessly:

- Tala om för läkaren om du har några hjärtproblem, till exempel lindrig hjärtsvikt.

Under behandlingen med Zessly:

- Tala omedelbart om för läkaren om du märker av några tecken på hjärtproblem. Sådana tecken kan bland annat vara andfåddhet, svullna fötter eller förändrad hjärtrytm.

Graviditet och vaccinationer:

- Om du har fått Zessly medan du var gravid är det viktigt att du informerar barnläkaren om det innan ditt barn får några vaccinationer.
- Barnet bör inte få något "levande vaccin" som BCG (används för att förebygga TBC) inom 6 månader efter födseln.

Bär med dig det här kortet i 4 månader efter din sista dos Zessly, och vid graviditet i minst 6 månader efter att barnet föddes.

Biverkningar kan uppstå långt efter din sista dos.