

## **En patientvägledning om OZURDEX®-behandling** **(intravitreal dexametasonimplantat 0,7 mg)**

### **Hur ska jag förbereda mig för min behandling?**

Innan du får behandling med OZURDEX® kan du få ögondroppar med antibiotika. Du ska då använda dessa i ögat varje dag 3 dagar före injektionen. Du ska fortsätta med den här antibiotikabehandlingen i ytterligare 3 dagar efter att du har fått OZURDEX®. Observera att användning av ögondroppar med antibiotika kan variera enligt lokala riktlinjer.

### **Vad inkluderar min behandling?**

För att förbereda dig för din behandling kommer din läkare:

- Tvätta ögat och huden runt omkring för att undvika infektion och eventuellt ge dig ytterligare ögondroppar med antibiotika.
- Täcka över ansiktet med en särskild duk.
- Du får bedövning i ögat så att det inte ska göra ont.
- Läkaren använder en anordning som försiktigt håller ögat öppet.

Läkaren kommer sedan att använda en särskild applikator för att injicera läkemedlet genom den vita delen av ögat in i ditt öga.

Du kan höra ett klickande ljud under injektionen och känna ett visst tryck på ögat.

Efter behandlingen utför läkaren några vanliga ögontester för att bedöma om behandlingen lyckades.

### **Vad händer efter behandlingen?**

Liksom alla läkemedel kan OZURDEX® orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. En utförlig lista över biverkningar finns i den bipacksedel som medföljer OZURDEX®. Be läkaren eller sjuksköterskan ge dig bipacksedeln.

Efter injektionen kan du se otydligt (dimsyn) upp till en dag efteråt. Du kan också se fläckar eller prickar, detta är vanligt men bör försvinna med tiden. Kontakta din läkare om dessa symtom inte försvinner eller blir värre.

Om du normalt sett kör bil eller använder maskiner ska du inte fortsätta med det förrän all dimsyn har gått tillbaka.

### ***Kontakta din läkare omedelbart om du upplever något av följande;***

- Nedsatt syn efter injektionen
- Dimsyn som kvarstår längre än en dag efter injektionen
- Ögonsmärter eller ökat obehag i eller runt ögat
- Rödögdhet som blir värre
- En känsla av fläckar eller prickar framför ögat
- Utsöndring av vätska från ögat.

Det här är nödnumret du ska ringa om du upplever allvarliga biverkningar eller reaktioner: