

## TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA LÄÄKÄREILLE / APTEEKKIHENKILÖKUNNALLE

- Tämä potilas saa natriumoksibaattia narkolepsian ja katapleksian hoitoon.
- Natriumoksibaatti voi aiheuttaa hengityksen vajausta ja keskushermoston lamaantumista, kouristuksia, masennusta ja itsetuhoisuutta.
- Opiaatteja ja barbituraatteja ei tule käyttää yhtä aikaa natriumoksibaatin kanssa. Hengitykseen ja keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä tulee välttää. Välttää erityisesti käyttämästä **valproaattia** ja topiramaattia natriumoksibaatin kanssa.
- Natriumoksibaatti voi aiheuttaa väärinkäyttöä/ riippuvuutta.
- Tutustukaa Natriumoxibat Reig Jofre 500 mg/ml oraaliliuos valmisteyhteenvetoon ennen kuin määrätte/annatte potilaille muita lääkkeitä.

Voitte ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan Laboratorio Reig Jofre, S.A. -yritykselle osoitteeseen [pharmacovigilance@reigjofre.com](mailto:pharmacovigilance@reigjofre.com) tai Fimealle [www-sivusto: www.fimea.fi](http://www.fimea.fi), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA.

Fimean hyväksymispäivämäärä: 13.11.2019

# Natriumoksibaatti

Natriumoksibaatin ensimmäinen  
määräyspvm:

#### YHTEYSTIEDOT

Potilaan nimi

Potilaan puhelinnumero

Läheisen nimi

Läheisen puhelinnumero

Hoitavan lääkärin nimi:

Hoitavan lääkärin puhelinnumero:

Hätänumero

#### TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA POTILAILLE

##### TOIMIKAA NÄIN

- Pitäkää tämä kortti aina mukanne.
- Näyttäkää tämä kortti kaikille Teitä hoitaville lääkäreille ja apteekkihenkilökunnalle.
- Pitäkää lääkelistanne aina mukanne asioidessanne lääkärissä tai apteekissa.
- Jos Teillä ilmenee natriumoksibaatin käytön yhteydessä epätavallisia oireita, kertokaa asiasta välittömästi lääkärillenne.
- Säilyttäkää natriumoksibaattia lasten ulottumattomissa.

#### TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA POTILAILLE

Natriumoksibaatti voi heikentää hengitystä ja tajuntaa.

##### **ÄLKÄÄ** tehkö mitään seuraavista:

- **ÄLKÄÄ** nauttiko alkoholia natriumoksibaattihoidon aikana
- **ÄLKÄÄ** ottako lääkärinne määräämää annosta enempää lääkettä
- **ÄLKÄÄ** ajako tai käytätkö koneita 6 tunnin ajan natriumoksibaatin ottamisen jälkeen
- **ÄLKÄÄ** ottako mitään muita lääkkeitä ilman, että keskustellette ensin asiasta lääkärinne kanssa
- **ÄLKÄÄ** antako natriumoksibaattianne kenellekään muulle.