

## VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION FÖR LÄKARE/APOTEKSPERSONAL

- Denna patient tar natriumoxibat som behandling för narkolepsi med kataplexi.
- Natriumoxibat kan orsaka nedsatt andningsfunktion, CNS-depression, anfall/kramper, depression och självmordsbenägenhet.
- Opioider och barbiturater får inte användas tillsammans med natriumoxibat. Andra preparat som ger nedsatt andningsfunktion och CNS-depression ska undvikas. Var särskilt försiktig med att använda topiramet och **valproat** tillsammans med natriumoxibat.
- Natriumoxibat har missbruks-/beroendepotential.
- Se produktresumén för Natriumoxibat Reig Jofre 500 mg/ml oral lösning före förskrivning/utlämning av andra läkemedel till denna patient.

Du kan rapportera biverkningar direkt till Laboratorio Reig Jofre, S.A. på [pharmacovigilance@reigjofre.com](mailto:pharmacovigilance@reigjofre.com) eller till Fimeas webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi), Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA

Fimea godkännandedatum: 13.11.2019

# Natriumoxibat

Datum för första ordinationen  
av natriumoxibat:

### KONTAKTUPPGIFTER

Patientens namn

Patientens telefonnummer

Närmaste anhörigs namn

Närmaste anhörigs telefonnummer

Behandlande läkares namn:

Behandlande läkares telefonnummer:

Kontaktnummer för medicinsk akuthjälp

### VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION FÖR **PATIENTER**

#### DET HÄR SKA DU GÖRA

- Ha alltid med dig detta kort.
- Visa kortet för läkare eller apotekspersonal som behandlar dig.
- Ha med dig en lista med alla läkemedel du tar när du besöker läkare eller har kontakt med apotekspersonal.
- Om du får ovanliga symtom medan du tar natriumoxibat ska du genast berätta det för läkaren.
- Förvara natriumoxibat utom räckhåll för barn.

### VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION FÖR PATIENTER

Natriumoxibat kan dämpa andningen och medvetandenivån.

#### Det här ska du **INTE GÖRA:**

- **DRICK INTE** alkohol medan du behandlas med natriumoxibat
- **TA INTE** mer än den dos läkaren har ordinerat
- **KÖR INTE** bil eller andra fordon och använd inte maskiner inom 6 timmar från att du har tagit natriumoxibat
- **TA INTE** andra läkemedel om du inte har diskuterat det med läkaren först
- **DELA INTE** natriumoxibat med någon annan.