

Namn, patient:	Se till att du alltid tar med en lista över alla andra läkemedel som du använder vid varje besök till hälso- och sjukvårdspersonal.	Be din läkare att notera typ och datum för senaste tuberkulosundersökning:	Patientkort	Potilaan nimi:	Varmista, että sinulla on mukana luettelo kaikista muista käyttämistäsi lääkkeistä, kun menet vastaanotolle.	Pyydä lääkäriä merkitsemään tähän tiedot viimeisimmästä tuberkuloosiseulonnasta:	Potilaskortti	Patientens navn:	Du skal sikre dig, at du ved hvert lægebesøg også medbringer en liste over alle andre lægemidler, som du bruger.	Du skal bede din læge om at notere type og dato for seneste screening (er) for tuberkulose (TB) nedenfor:	Patient Informationskort
Namn, läkare:	Lista över andra läkemedel:	Undersökning:	SV FI DK	Lääkärin nimi:	Luettelo muista käytössä olevista lääkkeistä:	Menetelmä:	SV FI DK	Lægens navn:	Liste over anden medicin:	Test:	SV FI DK
Telefonnummer, läkare:		Datum:	Remsima[®] infiximab	Lääkärin puh.nro:		Tulos:	Remsima[®] infiximabi	Lægens telefonnummer:		Dato:	Remsima[®] infiximab
Datum för påbörjad behandling med Remsima:	Lista över allergier:	Resultat:	Visa detta kort vid varje tillfälle som du besöker läkare.	Remsima-hoito aloitettu:	Allergiat:	On tärkeää, että sinä ja lääkäri merkitsette muistiin lääkkeesi kaupanimen ja eränumeron.	Näytä tämä kortti kaikille hoitoosi osallistuville lääkäreille.	Dato for start på Remsima-behandling:	Liste over allergier:	Resultat:	
Senaste behandlingar:		Produktnamn:		Annetut infuusiot:		Kauppanimi:		Nuværende doseringer:		Det er vigtigt, at du og din læge noterer præparatnavn og batchnummeret på din medicin.	
Pharma code area		Tillverkningsnummer:				Eränumero:				Præparatnavn:	
		HEALTHCARE CELLTRION™ LM117807-PA002								Batchnummer:	
										HEALTHCARE CELLTRION™ LM117807-PA002	

Detta patient informationskort innehåller viktig säkerhetsinformation, som du skal være opmærksom på før og under behandling med Remsima.	Infektioner Før behandling med Remsima	Under behandling med Remsima	Under behandling med Remsima	Tämä potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa, josta sinun on hyvä olla tietoinen ennen Remsima-hoidon aloitusta ja sen aikana.	Infektiot Ennen Remsima-hoitoa	Remsima-hoidon aikana	Remsima-hoidon aikana	Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan och under behandlingen med Remsima.	Infektioner Före behandling med Remsima	Under behandling med Remsima	Under behandling med Remsima
Behold dette kort som reference i 4 måneder efter din sidste Remsima-dosis, når du starter på et nyt kort. Læs indlægsedlen for Remsima grundigt, inden De begynder at tage medicinen. Opbevar dette kort på dig i 4 måneder efter du har fået din sidste dosis Remsima, eller i tilfælde af graviditet i mindst 6 måneder, efter du har født. Bivirkninger kan forekomme lang tid efter sidste dosis.	<ul style="list-style-type: none"> Fortæl din læge, hvis du har en infektion, også selvom det er en meget let infektion. Det er meget vigtigt, at du fortæller din læge, hvis du nogensinde har haft tuberkulose (TB), eller hvis du har været i tæt kontakt med en person, som har haft TB. Din læge vil teste dig for at se, om du har haft TB. Du skal bede din læge om at notere type og dato for din(e) seneste screening(er) for TB på kortet. Fortæl din læge, hvis du har hepatitis B, eller hvis du ved eller har mistanke om, at du er bærer af hepatitis B virus. 	<ul style="list-style-type: none"> Fortæl straks din læge, hvis du har tegn på en infektion. Tegn inkluderer feber, træthed, (vedvarende) hoste, kortåndethed, vægttab, natlig svedtendens, diarré, sår, tandproblemer, en brændende smerte, når du lader vandet, eller influenza lignende symptomer. 	<ul style="list-style-type: none"> Hvis du har fået Remsima, mens du var gravid, er det vigtigt, at du informerer dit barns læge om det, for dit barn bliver vaccineret. Dit barn må ikke få en "levende vaccine", fx BCG (bruges til at forebygge tuberkulose) inden for 6 måneder efter fødslen. 	<ul style="list-style-type: none"> Kerrot lääkäriille, jos sinulla on jokin infektio, vaikka se olisi hyvin vähäinenkin. On erittäin tärkeää, että kerrot lääkäriille, jos sinulla on joskus ollut tuberkuloosi tai jos olet joskus ollut läheisessä kontaktissa henkilön kanssa, jolla on ollut tuberkuloosi. Sinulle tehdään tuberkuloosin seulontakokeet. Pyydä, että lääkäri merkitsee tiedot seulontakokeista tähän korttiin. Kerrot lääkäriille, jos sinulla on B-hepatitti tai jos tiedät tai epäilet olevasi B-hepatittiviruksen kantaja. 	<ul style="list-style-type: none"> Kerro heti lääkärille, jos sinulle ilmaantuu sydänongelmien oireita. Tällaisia oireita ovat hengenahdistus, jalkojen turvotus tai muutos sydämen lyöntirytmissä. 	<ul style="list-style-type: none"> Jos olet saanut Remsima-valmistetta raskauden aikana, on tärkeää että kerrot siitä lastasi hoitavalle lääkärille, ennen kuin lapsesi saa mitään rokotuksia. Lapsellesi ei saa antaa "elävää rokotetta", kuten BCG-rokotetta (käytetään tuberkuloosin ehkäisyyn) 6 kuukauteen syntymän jälkeen. 	<ul style="list-style-type: none"> Tala omedelbart om för din läkare om du har en infektion, även en lindrig sådan. Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare om du någonsin har haft tuberkulos (TBC) eller om du har varit i nära kontakt med någon som har haft tuberkulos. Din läkare kommer att undersöka om du har tuberkulos. Be din läkare att notera typ och datum för senaste tuberkulosundersökning på kortet. Tala om för din läkare om du har hepatitis B eller om du vet eller misstänker att du är bärare av hepatit B-virus. 	<ul style="list-style-type: none"> Tala omedelbart om för din läkare om du märker tecken på hjärtproblem. Sådana tecken omfattar feber, trötthetskänsla, (ihållande) hosta, andfäddhet, viktnöskning, nattliga svettningar, diarré, sår, tandbesvär, sveda vid urinerings eller influensaliknande symtom. 	<ul style="list-style-type: none"> Om du har fått Remsima under din graviditet, är det viktigt att du informerar ditt barns läkare om detta innan ditt barn får något vaccin. Ditt barn ska inte få "levande vacciner", såsom BCG (används för att förhindra tuberkulos) inom 6 månader efter födseln. 		