

Visa detta kort för all
vårdpersonal som behandlar
dig, t.ex. din tandläkare eller
akutläkare.

Läs bipacksedeln för mer
information. Du får även tillgång
till bipacksedeln genom att avläsa
QR-koden nedan.



www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret
för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55, 00034 FIMEA

Ditt namn:

RINVOQ®-förskrivarens namn:

Förskrivarens telefonnummer:

Datum då RINVOQ®-behandlingen
inleddes:

Version 2.0. Date approved June, 2021.

FI-RNQ-210028/RMP/5.10.2021

AbbVie Oy
Tel. 010 2411 200

PATIENTKORT

Bär alltid med dig detta kort

Säkerhetsinformation om RINVOQ® (upadacitinib) för patienter

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får till Fimea www.fimea.fi eller till ombudet för innehavare av godkännandet för försäljning (AbbVie Oy).

Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska känna till före och under behandling med RINVOQ®.

Risk för infektioner

RINVOQ® kan förvärra en infektion du har sedan tidigare eller öka risken för att du får en ny infektion, t.ex. tuberkulos, bältros eller virushepatit.

Tala genast om för din läkare om du märker tecken på infektion, såsom:

- Feber, svettning, frossa, viktnedgång eller ihållande hosta – dessa kan vara tecken på tuberkulos
- Smärtsamma utslag med blåsor – detta kan vara ett tecken på bältros
- Trötthet eller andfåddhet – detta kan vara ett tecken på lunginflammation.

Vacciner som förebygger infektioner

Levande vacciner (t.ex. influensavaccin i form av nässpray, vaccin mot vattkoppor, mässling/påssjuka/röda hund) ska inte ges under eller strax före behandling med RINVOQ®.

Innan du får några vacciner, tala med din läkare som vet vilka vacciner du **inte** ska ges före eller under behandling med RINVOQ®.

Kolesterol

Din läkare kontrollerar dina kolesterolvärden medan du tar RINVOQ® för att bestämma om du behöver börja en kolesterolsänkande behandling.

Preventivmedel, graviditet och amning

RINVOQ® får inte tas under graviditet.

- Använd effektiva preventivmedel medan du tar RINVOQ® och i 4 veckor efter den sista dosen. Tala med din läkare om effektiva preventivmedel.
- Berätta genast för din läkare om du planerar graviditet eller om du blir gravid.
- Amma inte under behandlingen med RINVOQ®.

Blodproppar i venerna (djup ventrombos) eller lungorna (lungemboli)

Tala genast om för din läkare om du får tecken på djup ventrombos eller lungemboli, såsom smärtsam svullnad i benet eller bröstsmärta.