

Visa detta kort för all  
vårdpersonal som behandlar  
dig, t.ex. din tandläkare eller  
akutläkare.

Läs bipacksedeln för mer  
information. Du får även tillgång  
till bipacksedeln genom att avläsa  
QR-koden nedan.



[www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret  
för läkemedelsområdet Fimea  
Biverkningsregistret  
PB 55, 00034 FIMEA

Ditt namn:

RINVOQ®-förskrivarens namn:

Förskrivarens telefonnummer:

Datum då RINVOQ®-behandlingen  
inleddes:

Version 1.0. Datum för godkännande 17.10.2019.

FI-RNQ-190002/RMP/18.2.2020

AbbVie Oy  
Tel. 010 2411 200

## PATIENTKORT

Bär alltid med dig detta kort

### Säkerhetsinformation om RINVOQ® (upadacitinib) för patienter



Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får till Fimea [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi) eller till ombudet för innehavare av godkännandet för försäljning (AbbVie Oy).

Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation som du ska känna till före och under behandling med RINVOQ®.

## Risk för infektioner

---

RINVOQ® kan förvärra en infektion du har sedan tidigare eller öka risken för att du får en ny infektion, t.ex. tuberkulos, bältros eller virushepatit.

Tala genast om för din läkare om du märker tecken på infektion, såsom:

- Feber, svettning, frossa, viktnedgång eller ihållande hosta – dessa kan vara tecken på tuberkulos
- Smärtsamma utslag med blåsor – detta kan vara ett tecken på bältros
- Trötthet eller andfåddhet – detta kan vara ett tecken på lunginflammation.

## Vacciner som förebygger infektioner

---

Levande vacciner (t.ex. influensavaccin i form av nässpray) ska inte ges under eller strax före behandling med RINVOQ®.

Innan du får några vacciner, tala med din läkare som vet vilka vacciner du inte ska ges före eller under behandling med RINVOQ®.

## Kolesterol

---

Din läkare kontrollerar dina kolesterolvärden medan du tar RINVOQ® för att bestämma om du behöver börja en kolesterolsänkande behandling.

## Preventivmedel, graviditet och amning

---

RINVOQ® får inte tas under graviditet.

- Använd effektiva preventivmedel medan du tar RINVOQ® och i 4 veckor efter den sista dosen. Tala med din läkare om effektiva preventivmedel.
- Berätta genast för din läkare om du planerar graviditet eller om du blir gravid.
- Amma inte under behandlingen med RINVOQ®.

## Blodproppar i venerna (djup ventrombos) eller lungorna (lungemboli)

---

Tala genast om för din läkare om du får tecken på blodproppar i venerna eller lungorna, såsom smärtsam svullnad i benet eller bröstsmärta.