



Potilasopas

Käyttöaihe:

Froidir on reseptilääke, joka on tarkoitettu

- sellaisten skitsofreniapotilaiden hoitoon, joille muut lääkkeet eivät ole tehonneet.

Skitsofrenia on psykiatrinen sairaus, johon kuuluvat ajattelun, tunnereaktioiden ja käyttäytymisen häiriöt. Tätä lääkettä voi käyttää skitsofrenian hoitoon vain, jos olet jo kokeillut vähintään kahta muuta psykoosiläkettä, mukaan lukien jokin uudempi, ns. epätyypillinen psykoosilääke, ja nämä lääkkeet eivät ole tehonneet tai ne ovat aiheuttaneet vaikeita haittavaikutuksia, joita ei ole voitu hoitaa.

- Parkinsonin taudin yhteydessä esiintyvien vaikeiden ajatus-, tunne- ja käytöshäiriöiden hoitoon silloin, kun muu lääkitys ei ole tehonnut.



Tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa

TÄRKEÄ VAROITUS:

KLOTSAPIINIIN KÄYTTÖÖN ON YHDISTETTY MERKITTÄVÄ RISKI


SEURAAVIEN TILOJEN KEHITTÄMISELLE:

AGRANULOSYTOOSI

- Agranulosytoosi on verisairaus, jossa luuydin (luun sisällä oleva pehmytkudos, joka auttaa muodostamaan verisoluja) ei muodosta tarpeeksi tietyn tyyppisiä valkosoluja eli neutrofiilejä, jotka taistelevat infektiota vastaan. Agranulosytoosi voi johtaa vakavaan infektiin ja kuolemaan.
- Älä ota Froidir-valmistetta, jos sinulla on ollut klotsapiinin aiheuttama agranulosytoosi aikaisemmin.
- Ota heti yhteys lääkäriin, jos sinulla esiintyy merkkejä vilustumisesta tai kuumeesta, sinulla on influenssan kaltaisia oireita, kurkkukipua tai muita infektion oireita, Froidir-hoidon aikana. Sinulta on pikaisesti otettava verinäyte, jotta voidaan tarkistaa, johtuvatko oireesi lääkkeestä.
- Ennen Froidir-hoidon aloittamista lääkäri kysyy aiemmista sairauksistasi ja ottaa verikokeen varmistukseksi, että veresi valkosolumäärä on normaali. Tämän selvittäminen on tärkeää, koska elimistösi tarvitsee valkosoluja puolustautuakseen infektioita vastaan.
- Froidir voi aiheuttaa vakavaa veren valkosolujen määrän vähenemistä (ns. agranulosytoosia). Vain säännöllisten verikokeiden avulla lääkäri voi selvittää, onko sinulla riski saada agranulosytoosi.
- Verikokeet on tehtävä kerran viikossa hoidon ensimmäisten 18 viikon aikana ja tämän jälkeen vähintään kerran kuukaudessa.
- Jos veren valkosolujen määrä on laskenut, Froidir-hoito on lopetettava välittömästi, minkä jälkeen valkosolujen määrän tulisi palautua normaaliksi.
- Sinun on käytävä verikokeissa 4 viikon ajan Froidir-hoidon lopettamisesta.

SYDÄNLIHASTULEHDUS JA KARDIOMYOPATIA:

- Klotsapiinin tiedetään aiheuttavan sydänlihastulehdusta (ns. myokardiitti) ja sydänlihassairautta (ns. kardiomyopatia), jotka voivat johtaa kuolemaan. Ota heti yhteys lääkäriin, jos sydämesi syke on nopea tai epäsäännöllinen, jopa levossa, tai sinulla on sydämentykytyksiä, hengitysvaikeuksia, rintakipua tai selittämätöntä väsymystä. Lääkärin täytyy tutkia sydämesi ja tarvittaessa ohjata sinut välittömästi sydäntautilääkärille.



Näitä materiaaleja sekä muita tietoja voi pyytää paikalliselta edustajalta
Orion Pharma
PL 65, 02101 Espoo
tai
www.aesculapius.fi

Paikalliset yhteystiedot haittavaikutusten raportointia varten
Orion Pharma
Drug Safety
Orionintie 1, 02101 Espoo
tai
pharmacovigilance@orionpharma.com

tai
www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus - ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
FI-00034 Fimea



