

Lääkeaine ATC-koodi	Yhdistelmä- valmisteiden lääkeaineet		Luokittelu	Hyväksytty
Akrivastiini R06AX18		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi aiheuttaa väsymystä.	23.2.2015
Alendronaatti M05BA04		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Ei vuodepotilaille. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Potilaan tulee pystyä ottamaan lääke riittävän vesimäärän kera ja olemaan puoli tuntia pystyasennossa lääkkeenoton jälkeen. Käyttöaikausitus korkeintaan 5 vuotta. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset, erityisesti kalsiumin, raudan, magnesiumin ja alumiinin kanssa. Suositellaan hammaslääkärin arviota ennen käytön aloitusta.	27.2.2018
Alendronaatti ja kolekalsiferoli M05BB03	alendronaatti	C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Ei vuodepotilaille. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Potilaan tulee pystyä ottamaan lääke riittävän vesimäärän kera ja olemaan puoli tuntia pystyasennossa lääkkeenoton jälkeen. Käyttöaikausitus 5 vuotta. Huomioi yhteisvaikutukset kalsiumin, raudan, magnesiumin ja alumiinin kanssa. Suositellaan hammaslääkärin arviota ennen käytön aloitusta.	27.2.2018
	kolekalsiferoli	A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Tarve vähintään 20 µg/vrk (800ky/vrk) ympärivuotisesti.	27.2.2018
Alfutsosiini G04CA01		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat ortostaattinen hypotensio, huimaus ja alttius kaatumisille. Huomioi yhteisvaikutukset verenpainelääkkeiden kanssa. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	3.6.2014
Algiinihappo A02BX13 (ei sisällä alumiinia)	algiinihappo kalsium natrium	A	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
		A	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
		A	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
Algiinihappo A02BX13 (sisältää alumiinia)	algiinihappo kalsium natrium alumiini	A	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
		A	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
		A	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
		D	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Ei sovi iäkkäiden antasidiksi. Vältä käyttöä jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Voi aiheuttaa neurologisia haittoja. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	13.5.2013
Allopurinoli M04AA01		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutukset.	30.11.2017
Alpratsolaami N05BA12		D	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, muistihäiriöt ja alttius liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.	22.5.2017
Alprostadiili G04BE01		A	<b>Sopii iäkkäille.</b>	3.6.2014
Ambrosoli R05CB06		B	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.</b>	23.2.2015

<b>Amiodaroni</b> C01BD01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Käyttö vain vakavien rytmihäiriöiden hoitoon perehtyneen lääkärin aloittamana. Poistuu elimistöstä erittäin hitaasti. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat pleuriitti, keuhkofibroosi, kilpirauhasen vajaa- tai liikatoiminta, maksan vajaatoiminta ja käännyvien kärkien takykardia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	13.5.2013
<b>Amitriptyliini</b> N06AA09		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Käyttö mahdollista pienellä annoksella neuropaattisen kivun hoitoon. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat sekavuus, muistihäiriöt, vapina, rytmihäiriöt, takykardia, ortostaattinen hypotensio ja serotoniinisyndrooma. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Amitriptyliini ja psyykenlääke</b> N06CA01	<i>amitriptyliini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Käyttö mahdollista pienellä annoksella neuropaattisen kivun hoitoon. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat sekavuus, muistihäiriöt, vapina, takykardia, ortostaattinen hypotensio, serotoniinisyndrooma. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	25.10.2017
	<i>kloori-diatsepoksidi</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, muistihäiriöt ja alttius liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.	25.10.2017
<b>Amitriptyliini ja psyykenlääke</b> N06CA01	<i>amitriptyliini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Käyttö mahdollista pienellä annoksella neuropaattisen kivun hoitoon. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat sekavuus, muistihäiriöt, vapina, takykardia, ortostaattinen hypotensio, serotoniinisyndrooma. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	25.10.2017
	<i>perfenatsiini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Dementiaan käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	25.10.2017
<b>Amlodipiini</b> C08CA01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	19.12.2014
<b>Amoksisilliini</b> J01CA04		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pidennä annosväliä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi voimistaa metotreksaatin vaikutusta. Huomioi mikrobilääkeresistenssi.	28.5.2018
<b>Amoksisilliini ja beetalaktamaasin estäjä</b> J01CR02	<i>amoksisilliini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille (suun kautta otettavat valmisteet).</b> Pidennä annosväliä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi voimistaa metotreksaatin vaikutusta. Huomioi mikrobilääkeresistenssi.	28.5.2018
	<i>klavulaani-happo</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pidennä annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Käytä varoen jo lievässä maksan vajaatoiminnassa.	28.5.2018

<b>Apiksabaani</b> B01AF02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä. Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittävä haittavaikutus verenvuotoriskin lisääntyminen. Huomioi yhteisvaikutukset. Ei tunnettua vastavaikuttajaa (antidoottia).	19.5.2014
<b>Aripipratsoli</b> N05AX12		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio, sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	22.5.2017
<b>Asebutololi</b> C07AB04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	19.12.2014
<b>Asenapiini</b> N05AH05		<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. QT-ajan pidentymisen riski. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Altistaa kaatumisille. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Asetyylikysteiniini</b> R05CB01		<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.</b>	23.2.2015
<b>Asetyyლისისყლი- happo</b> (ns. mini-ASA) B01AC06		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Merkittävä haittavaikutus verenvuotoriskin lisääntyminen. Soveltuu käytettäväksi pienellä annoksella (=100 mg/vrk) valtimotaudin sekundaaripreventiossa.	19.5.2014
<b>Asetyyლისისყლი- happo</b> (kipulääke) N02BA01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat verenvuodot ja mahan limakalvovauriot. Voi heikentää verenpainetautiin ja sydämen vajaatoimintaan käytettävien lääkkeiden vaikutusta. Lisää metotreksaatin toksisuutta. Huomioi itsehoito- ja yhdistelmävalmisteiden sisältämä asetyyლისისყლიhappo.	25.10.2017
<b>Asetyyლისისყლი- happo, C-vitamiini, kofeiini, quaifenesiini</b> N02BA51	<i>asetyyli- salisyylihappo</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Pienennä annosta keskivaikeassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat verenvuodot ja mahan limakalvovauriot. Voi heikentää verenpainetautiin ja sydämen vajaatoimintaan käytettävien lääkkeiden vaikutusta. Lisää metotreksaatin toksisuutta. Huomioi itsehoito- ja yhdistelmävalmisteiden sisältämä asetyyლისისყლიhappo.	25.10.2017
	<i>C-vitamiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	25.10.2017
	<i>kofeiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	25.10.2017
	<i>quaifenesiini</i>	<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.</b>	25.10.2017

<b>Asetyyilisalisyyli- happo ja dipyridamoni/ klopidogreeli B01AC30</b>	<i>asetyyilisali- syylihappo</i>	<b>D</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Merkittävä haittavaikutus verenvuotoriskin lisääntyminen. Soveltuu käytettäväksi pienellä annoksella (=100 mg/vrk) valtimotaudin sekundaaripreventiossa.	19.5.2014
	<i>dipyridamoli</i>	<b>C</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Huomioi haittavaikutukset, kuten angina pectoris -oireet ja huimaus. Lääkkeen teho yksinään (ilman asetyyilisalisyylihappoa) on vaatimaton.	19.5.2014
	<i>klopidogreeli</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Aihiolääke. Merkittävä haittavaikutus verenvuotoriskin lisääntyminen, erityisesti huonokuntoisilla ja munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavilla. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	19.5.2014
<b>Asikloviiri</b> (iholle) D06BB03		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
<b>Asikloviiri</b> (suun kautta) J05AB01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutus teofylliinin kanssa.	18.8.2014
<b>Asikloviiri</b> (silmaan) S01AD03		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Tilapäiseen käyttöön.	26.10.2017
<b>Asikloviiri ja hydrokortisoni</b>  (iholle) D06BB53	<i>asikloviiri</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
	<i>hydro- kortisoni</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
<b>Aspartinsuliini</b> (lyhytvaikutteinen) A10AB05		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hypoglykemian välttäminen keskeistä.	12.3.2014
<b>Aspartinsuliini</b> (insuliinisekoite) A10AD05		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hypoglykemian välttäminen keskeistä.	12.3.2014
<b>Atenololi</b> C07AB03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa. Omenamehu saattaa vähentää atenololin imeytymistä.	19.12.2014
<b>Atorvastatiini</b> C10AA05		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Lihaskivut ja lihasheikkous mahdollisia haittoja. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	8.1.2015
<b>Atselastiini</b> (silmaan) S01GX07		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	26.10.2017
<b>Atsitromysiini</b> J01FA10		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Koskee suun kautta otettavia valmisteita. QT-ajan pidentymisen riski. Huomioi mikrobilääkeresistenssi.	28.5.2018
<b>Avanafiili</b> G04BE10		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Vältä käyttöä vaikeassa maksan vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksia ovat hypotensio, ortostaattinen hypotensio, päänsärky ja näköhäiriöt. Huomioi yhteisvaikutus nitraattien ja alfa-salpaajien kanssa.	3.6.2014

<b>Baklofeeni</b> M03BX01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat väsymys, sekavuus, masennus, painajaisunet, lihasheikkous, matala verenpaine ja alttius kaatumisille. Voi lisätä muiden samanaikaisesti käytettävien keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden sedatiivista vaikutusta.	11.4.2018
<b>Beetametasoni</b> (iholle) D07AC01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset ja systeeminen imeytyminen.	7.4.2014
<b>Beetametasoni ja fusidiinihappo</b> (iholle) D07CC01	<i>beeta-metasoni</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset ja systeeminen imeytyminen.	7.4.2014
	<i>fusidiinihappo</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
<b>Beetametasoni ja antisepti</b> (iholle) D07BC01	<i>beeta-metasoni</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset ja systeeminen imeytyminen.	7.4.2014
	<i>kliokinoli</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset ja systeeminen imeytyminen.	7.4.2014
<b>Beetametasoni ja salisyylihappo</b> (iholle) D07XC01	<i>beeta-metasoni</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset ja systeeminen imeytyminen.	7.4.2014
	<i>salisyylihappo</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset ja systeeminen imeytyminen.	7.4.2014
<b>Beklometasoni</b> (nenään) R01AD01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	8.1.2015
<b>Beklometasoni</b> (keuhkoihin) R03BA01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pitkäaikainen, suuriannoksinen käyttö voi aiheuttaa systeemisiä vaikutuksia. Muistuta suun huuhtomisesta lääkkeenoton jälkeen.	23.2.2015
<b>Betahistiini</b> N07CA01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	28.5.2018
<b>Betaksololi</b> (silmään) S01ED02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Hoidon aloitus ja käyttö silmälääkärin valvonnassa. Vasta-aihe toinen beetasalpaaja. Huomioi yhteisvaikutukset.	26.10.2017
<b>Betaksololi</b> (suun kautta) C07AB05		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	19.12.2014
<b>Betsafibraatti</b> C10AB02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin statiinien ja varfariinin kanssa.	8.1.2015
<b>Bimatoprosti</b> (silmään) S01EE03		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hoidon aloitus ja käyttö silmälääkärin valvonnassa. Saattaa aiheuttaa silmän värikalvon pigmenttimuutoksia ja ripsien kasvua.	26.10.2017
<b>Biperideeni</b> N04AA02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	10.6.2013
<b>Bisakodyyli</b> A06AG02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa käytössä suolilaman riski.	13.5.2013

<b>Bisoprololi</b> C07AB07		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	19.12.2014
<b>Bisoprololi ja tiatsidit</b> C07BB07	<i>bisoprololi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	19.12.2014
	<i>hydro- klooritiatsisi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	19.12.2014
<b>Brimonidiini</b> (silmaan) S01EA05		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Hoidon aloitus ja käyttö silmälääkärin valvonnassa.	26.10.2017
<b>Brintsolamidi</b> (silmaan) S01EC04		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hoidon aloitus ja käyttö silmälääkärin valvonnassa. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.	26.10.2017
<b>Bromiheksiini</b> R05CB02		<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.</b>	23.2.2015
<b>Bromokriptiini</b> N04BC01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Serotonerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat psykoosi, ortostaattinen hypotensio, pleuriitti, fibroosi keuhkoissa/sydänläpissä/mahassa ja impulssikontrollihäiriöt kuten peliriippuvuus ja hyperseksuaalisuus. Huomioi yhteisvaikutukset dopamiiniantagonistien kuten antipsyykoottien kanssa.	10.6.2013
<b>Budesonidi</b> (keuhkoihin) R03BA02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pitkäaikainen, suuriannoksinen käyttö voi aiheuttaa systeemisiä vaikutuksia. Muistuta suun huuhtomisesta lääkkeenoton jälkeen. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin tiettyjen sienilääkkeiden kanssa.	23.2.2015
<b>Budesonidi</b> (nenään) R01AD05		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	8.1.2015
<b>Buprenorfiini</b> N02AE01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Kakektisilla potilailla laastarimuotoisen lääkkeen teho on heikko. Annosta ei yleensä tarvitse muuttaa iäkkäillä. Aloita laksatiivi ummetuksen ehkäisyyn.	25.10.2017
<b>Bupropioni</b> N06AX12		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi kouristusriski ja runsaat interaktiot. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa.	28.5.2018
<b>Buspironi</b> N05BE01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	28.5.2018
<b>Butyyli- skopolamiini</b> A03BB01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	13.5.2013
<b>Dabigatraani- eteksilaatti</b> B01AE07		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittävä haittavaikutus verenvuotoriskin lisääntyminen. Huomioi yhteisvaikutukset. Vastavaikuttajana (antidootti) voidaan käyttää idarusitsumabia.	20.2.2017

Daltepariini B01AB04		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Eliminaatio vähenee vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittävä haittavaikutus verenvuotoriskin lisääntyminen. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä. Huomioi mahdollinen kaatuilu.	19.5.2014
Darifenasiini G04BD10		D	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	13.5.2013
Deksametasoni H02AB02		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Glukokortikoidien haittavaikutukset korostuvat pitkäaikaiskäytössä. Huomioi yhteisvaikutukset.	19.5.2014
Deksametasoni, neomysiini ja polymyxini b (silmaan) S01CA01	<i>deksa- metasoni neomysiini</i>  <i>polymyxin b</i>	A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Tilapäiseen käyttöön. Hoidon aloitus silmälääkärin valvonnassa.	26.10.2017
		A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Tilapäiseen käyttöön. Hoidon aloitus silmälääkärin valvonnassa.	26.10.2017
		A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Tilapäiseen käyttöön. Hoidon aloitus silmälääkärin valvonnassa.	26.10.2017
Deksketoprofeeni M01AE17		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Voi heikentää munuaisten toimintaa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi nostaa verenpainetta ja pahentaa sydämen vajaatoimintaa sekä aiheuttaa sydän- ja verisuonitapahtumia. Lisää ruuansulatuskanavan vuotoriskiä. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenvuotoa lisäävien lääkkeiden kanssa. Tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	30.11.2017
Dekstrometorfaani R05DA09		D	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Serotonerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat vapina, palpitaatio, päänsärky, pahoinvointi, ummetus, väsymys, huimaus ja alttius kaatumisille. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin memantiinin ja MAO-estäjien kanssa.	15.9.2014
Denosumabi M05BX04		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Puutteellinen ravinnon kalsiumin saanti tai hypokalsemia on korjattava ennen hoidon aloittamista ja sen aikana. Hoidon optimaalinen kesto epäselvä. Muista epätyypillisten reisiluumurtumien ja leukaluun osteonekroosin mahdollisuus.	11.4.2018
Desloratadiini R06AX27		A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi aiheuttaa väsymystä.	23.2.2015
Desoksietasoni (iholle) D07AC03		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset ja systeeminen imeytyminen.	7.4.2014
Desonidi (iholle) D07AB08		A	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
Detemirinsuliini A10AE05		A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hypoglykemian välttäminen keskeistä.	12.3.2014
Diatsepaami N05BA01		D	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, muistihäiriöt ja alttius liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	22.5.2017
Digoksiini C01AA05		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Iäkkäiden vuorokausiannos enintään 0,125 mg. Seerumipitoisuuden enimmäisarvo iäkkäillä alle 1,0 nmol/l. Huomioi yhteisvaikutukset.	9.12.2015
Diklofenaakki (iholle) M02AA15		A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Käyttöohjeen mukaisesti iholle käytettynä systeeminen imeytyminen vähäistä.	11.4.2018

<b>Diklofenaakki</b> M01AB05		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Voi heikentää munuaisten toimintaa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi nostaa verenpainetta ja pahentaa sydämen vajaatoimintaa sekä aiheuttaa sydän- ja verisuonitapahtumia. Lisää ruuansulatuskanavan vuotoriskiä. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenvuotoa lisäävien lääkkeiden kanssa. Tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	30.11.2017
<b>Diklofenaakki ja misoprostoli</b> M01AB55		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Voi heikentää munuaisten toimintaa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi nostaa verenpainetta ja pahentaa sydämen vajaatoimintaa sekä aiheuttaa sydän- ja verisuonitapahtumia. Lisää ruuansulatuskanavan vuotoriskiä. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenvuotoa lisäävien lääkkeiden kanssa. Tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	30.11.2017
		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Voi vähentää diklofenaakin aiheuttamaa ruuansulatuskanavan vuotoriskiä.	30.11.2017
<b>Diltiatseemi</b> C08DB01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Käytä vain erityistapauksissa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat ummetus, bradykardia ja turvotus. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset, etenkin digoksiinin ja beetasalpaajien kanssa. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	13.5.2013
<b>Dinatrium-kromoglikaatti</b> (silmään) S01GX01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	26.10.2017
<b>Dipyridamoli</b> B01AC07		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Huomioi haittavaikutukset, kuten angina pectoris -oireet ja huimaus. Lääkkeen teho yksinään (ilman asetyylisalisyylihappoa) on vaatimaton.	3.6.2014
<b>Doksepiini</b> N06AA12		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat sekavuus, muistihäiriöt, vapina, rytmihäiriöt, takykardia, ortostaattinen hypotensio ja serotoniinisyndrooma. Altistaa kaatumisille. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Doksisykliini</b> J01AA02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Koskee suun kautta otettavia valmisteita. Rauta, magnesium, alumiini ja kalsium vähentävät imeytymistä. Huomioi mikrobilääkeresistenssi.	28.5.2018
<b>Donepetsiili</b> N06DA02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Voi vaikeuttaa ahtauttavaa keuhkosairautta. Altistaa sydämen johtumishäiriöille, kuten bradykardialle. Huomioi ruuansulatuskanavaan kohdistuvat haitat. Huomioi yhteisvaikutukset. Antikolinergiset lääkkeaineet heikentävät Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	25.10.2017
<b>Dortsolamidi</b> (silmään) S01EC03		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hoidon aloitus ja käyttö silmälääkärin valvonnassa. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.	26.10.2017
<b>Dronedaroni</b> C01BD07		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Hoidon aloitus ja käyttö erikoislääkärin valvonnassa. Älä käytä pysyvässä eteisvärinässä, sydämen vajaatoiminnassa tai vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittävä haittavaikutus kääntyvien kärkien takykardia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	20.6.2013



Drospirenoni ja estrogeeni G03FA17	<i>drospirenoni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä systeemistä käyttöä iäkkäillä.</b> Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.	3.6.2014
	<i>estrogeeni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.	3.6.2014
Duloksetiini N06AX21		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Serotonerginen. Käyttö aloitettava ja lopetettava asteittain. Altistaa kaatumisille. Huomioi yhteisvaikutukset.	25.10.2017
Dutasteridi G04CB02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	3.6.2014
Dydrogesteroni ja estrogeeni G03FA14 G03FB08	<i>dydro- gesteroni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.	3.6.2014
	<i>estrogeeni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.	3.6.2014
Ebastiini R06AX22		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Voi aiheuttaa väsymystä.	23.2.2015
Ekonatsoli ja triamsinoloni (iholle) D01AC20	<i>ekonatsoli</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Paikallisesti käytettynä imeytyy rikkoutuneelta iholta. Huomioi vakavat yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin tai fentanylin kanssa.	7.4.2014
	<i>triamsinoloni</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
Eksenatidi A10BJ01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Käyttökokemus pitkävaikutteisesta valmisteesta vähäistä. Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisen vajaatoiminnassa. Paino voi laskea.	7.4.2014
Emedastiini (silmiin) S01GX06		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	26.10.2017
Enalapriili C09AA02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Merkittävä haittavaikutus ortostaattinen hypotensio etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
Enalapriili ja hydroklooritiatsidi C09BA02	<i>enalapriili</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Merkittävä haittavaikutus ortostaattinen hypotensio etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	<i>hydro- klooritiatsidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	8.1.2015

Enalapriili ja lerkaniidipiini C09BB02	<i>enalapriili</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Merkittävä haittavaikutus ortostaattinen hypotensio etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	<i>lerkaniidipiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	8.1.2015
Enoksapariini B01AB05		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Eliminaatio vähenee vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittävä haittavaikutus verenvuotoriskin lisääntyminen. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä. Huomioi mahdollinen kaatuilu.	19.5.2014
Eprosartaani C09CA02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
Eprosartaani ja hydroklooritiatsidi C09DA02	<i>eprosartaani</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	<i>hydroklooritiatsidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	8.1.2015
Erdosteini R05CB15		<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.</b>	23.2.2015
Ergokalsiferoli (vitamiini D2) A11CC01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Tarve vähintään 20 µg/vrk (800 ky/vrk) ympärivuotisesti.	7.4.2014
Esomepratsoli A02BC05		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Käytön tarpeellisuus arvioitava säännöllisesti. Pitkäaikaiskäytössä voi heikentää kalsiumin ja B12-vitamiinin imeytymistä. Enterorakenteen rikkominen vie lääkkeen tehon.	12.3.2014
Essitalopraami N06AB10		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat hyponatremia ja verenvuotoriskin lisääntyminen. Altistaa kaatumisille. Huomioi yhteisvaikutukset.	25.10.2017
Estradioli G03CA03		<b>D</b>	<b>Vältä systeemistä käyttöä iäkkäillä (luokka D). Sopii iäkkäille naisille paikallishoitoon (luokka A).</b> Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.	3.6.2014
Estrioli G03CA04		<b>D</b>	<b>Vältä systeemistä käyttöä iäkkäillä (luokka D). Sopii iäkkäille naisille paikallishoitoon (luokka A).</b> Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.	3.6.2014
Etodolaakki M01AB08		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi lisääntynyt ruuansulatuskanavan vuotojen ja sydän- ja verisuonitapahtumien riski. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenhiyytymistä estävien valmisteiden kanssa. Muista, että tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	10.11.2014

<b>Etorikoksibi</b> M01AH05		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Voi heikentää munuaisten toimintaa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi nostaa verenpainetta ja pahentaa sydämen vajaatoimintaa sekä aiheuttaa sydän- ja verisuonitapahtumia. Lisää ruuansulatuskanavan vuotoriskiä epäselektiivisiä tulehduskipulääkkeitä vähemmän. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenvuotoa lisäävien lääkkeiden kanssa. Tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	30.11.2017
<b>Etsetimibi</b> C10AX09		<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.</b>	8.1.2015
<b>Etyylimorfiini</b> R05DA01	<i>etyylimorfiini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat ummetus, väsymys, pahoinvointi, virtsaamisvaikeus, sappiongelmia ja alttius kaatumisille. Huomioi yhteisvaikutukset, erityisesti antitussiivista tehoa heikentävien lääkkeiden kanssa.	23.2.2015
	<i>muut ainesosat</i>	<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.</b>	23.2.2015
<b>Famotidiini</b> A02BA03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Iäkkäät ovat alttiita harvinaisille haittavaikutuksille, kuten päänsärylle, huimaukselle, maha-suolikanavan oireille ja sekavuudelle.	12.3.2014
<b>Famotidiini, magnesium ja kalsium</b> A02BA53	<i>magnesium</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Ei sovi iäkkäiden antasidiksi. Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	12.3.2014
	<i>famotidiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Iäkkäät ovat alttiita harvinaisille haittavaikutuksille, kuten päänsärylle, huimaukselle, maha-suolikanavan oireille ja sekavuudelle.	12.3.2014
	<i>kalsium-karbonaatti</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
<b>Feksofenadiini</b> R06AX26		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi aiheuttaa väsymystä. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	23.2.2015
<b>Felodipiini</b> C08CA02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	19.12.2014
<b>Fenofibraatti</b> C10AB05		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin statiinien ja varfariinin kanssa.	8.1.2015
<b>Fenoksimetyyli-penisilliini</b> J01CE02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Huomioi mikrobilääkeresistenssi.	28.5.2018
<b>Fenoteroli ja ipratropium-bromidi</b> (keuhkoihin) R03AL01	<i>fenoteroli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Lisää sympatomioteettista vaikutusta. Voi aiheuttaa hypokalemiaa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sympatomioteettisten aineiden kanssa.	23.2.2015
	<i>ipratropium-bromidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Huomioi yhteisvaikutukset.	23.2.2015
<b>Fentanyl</b> N02AB03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Serotonerginen. Aloita kivun hoito suun kautta otettavalla opioidilla. Kakektisilla potilailla laastarimuotoisen lääkkeen teho on heikko. Aloita laksatiivi ummetuksen ehkäisyyn. Huomioi merkittävät yhteisvaikutukset.	25.10.2017

<b>Fenytoiini</b> N03AB02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Hoidon aloitus erikoislääkärin valvonnassa. Kapea terapeuttinen leveys. Pitoisuuden nousu vaikeasti ennakoitavissa. Seuraa lääkepitoisuutta. Matala seerumin albumiinipitoisuus voimistaa lääkevastetta. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat väsymys, huimaus, ienhyperplasia, osteomalasia, maksatoksisuus ja muutokset verenkuvassa. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	10.6.2013
<b>Fenyli-propanoliamiini</b> R01BA01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat hermostuneisuus, unettomuus, uneliaisuus, suun kuivuminen ja verenpaineen kohoaminen. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	23.2.2015
<b>Ferroglysiini-sulfaatti</b> B03AA01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	3.9.2014
<b>Ferrosulfaatti</b> B03AA07		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	3.9.2014
<b>Fesoterodiini</b> G04BD11		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	13.5.2013
<b>Finasteridi</b> G04CB01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	3.6.2014
<b>Flekainidi</b> C01BC04		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Hoidon aloitus erikoislääkärin valvonnassa. Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittävä haittavaikutus on kääntyvien kärkien takykardia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	20.6.2013
<b>Fludrokortisoni</b> H02AA02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Hormonikoraushoidon periaatteet samat nuorilla ja iäkkäillä. Huomioi voimakas mineralokortikoidivaikutus. Valmisteyhteenvedosta poikkeava (off-label) käyttö hypotonian hoidossa pienellä annoksella vain harkiten.	19.5.2014
<b>Flukonatsoli</b> J02AC01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Koskee suun kautta otettavia valmisteita. QT-ajan pidentymisen riski. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa maksa-arvoja. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset, muun muassa varfariinin kanssa.	28.5.2018
<b>Fluokortoloni</b> C05AA08	<i>fluoro-kortoloni lidokaiini</i>	<b>A</b> <b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> <b>Sopii iäkkäille.</b>	3.12.2013 3.12.2013
<b>Fluoksetiini</b> N06AB03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Hyvin pitkävaikutteinen SSRI-lääke, jonka vaikutus kestää viikkoja. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat unettomuus, päänsärky, huimaus, pahoinvointi, takykardia, näköhäiriöt ja hyponatremia. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset, etenkin verenvuotoriskiä lisäävien lääkkeiden kanssa.	22.5.2017
<b>Flupentiksoli</b> N05AF01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017

<b>Flutikasoni</b> (keuhkoihin) R03BA05		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pitkäaikainen, suuriannoksinen käyttö voi aiheuttaa systeemisiä vaikutuksia. Muistuta suun huuhtomisesta lääkkeenoton jälkeen. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin tiettyjen sienilääkkeiden kanssa.	23.2.2015
<b>Flutikasoni</b> (nenään) R01AD08		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	8.1.2015
<b>Flutikasoni ja atselastiini</b> (nenään) R01AD58	<i>flutikasoni</i> <i>atselastiini</i>	<b>A</b> <b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> <b>Sopii iäkkäille.</b>	8.1.2015 8.1.2015
<b>Flutikasoni-furoaatti</b> (nenään) R01AD12		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	8.1.2015
<b>Fluvastatiini</b> C10AA04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Lihaskivut ja lihasheikkous mahdollisia haittoja. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin kanssa.	8.1.2015
<b>Fluvoksamiini</b> N06AB08		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat unettomuus, päänsärky, huimaus, pahoinvointi, takykardia ja hyponatremia. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset, etenkin verenvuotoriskiä lisäävien lääkkeiden kanssa.	22.5.2017
<b>Foolihappo</b> B03BB01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Voi alentaa fenytoiinin pitoisuutta.	19.5.2014
<b>Formoteroli</b> (keuhkoihin) R03AC13		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Lisää sympatomiteettistä vaikutusta. Voi aiheuttaa hypokalemiaa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sympatomimeettisten aineiden kanssa.	23.2.2015
<b>Formoteroli ja budesonidi</b> (keuhkoihin) R03AK07	<i>formoteroli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Lisää sympatomiteettistä vaikutusta. Voi aiheuttaa hypokalemiaa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sympatomimeettisten aineiden kanssa.	23.2.2015
	<i>budesonidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pitkäaikainen, suuriannoksinen käyttö voi aiheuttaa systeemisiä vaikutuksia. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin tiettyjen sienilääkkeiden kanssa. Muistuta suun huuhtomisesta lääkkeenoton jälkeen.	23.2.2015
<b>Furosemidi</b> C03CA01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	19.12.2014
<b>Furosemidi ja triamtereeni</b> C03EB01	<i>furosemidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	19.12.2014
	<i>triamtereeni</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi hyperkalemian riski.	19.12.2014
<b>Fusidiinihappo</b> (iholle) D06AX01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
<b>Fusidiinihappo</b> (silmään) S01AA13		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Tilapäiseen käyttöön.	26.10.2017
<b>Gabapentiini</b> N03AX12		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi erityisesti keskushermostoon kohdistuvat haittavaikutukset. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	15.9.2014

<b>Galantamiini</b> N06DA04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Voi vaikeuttaa ahtauttavaa keuhkosairautta. QT-ajan pidentymisen riski. Altistaa sydämen johtumishäiriöille, kuten bradykardialle. Huomioi ruoansulatuskanavaan kohdistuvat haitat. Huomioi yhteisvaikutukset. Antikolinergiset lääkkeineet heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	25.10.2017
<b>Gemfibrotsiili</b> C10AB04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Alumiinin ja magnesiumin samanaikainen käyttö heikentää lääkkeen tehoa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin statiinien ja varfariinin kanssa.	8.1.2015
<b>Glargininsuliini</b> A10AE04		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hypoglykemian välttäminen keskeistä.	12.3.2014
<b>Glimepiridi</b> A10BB12		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Pitkävaikutteinen sulfonyyliurea. Munuaisten ja maksan toiminnan heikentyessä haittojen riski kasvaa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutukset. Huomioi pitkittyneen hypoglykemian vaara.	7.4.2014
<b>Glipitsidi</b> A10BB07		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Lyhytvaikutteisina sulfonyyliurea. Munuaisten ja maksan toiminnan heikentyessä haittojen riski kasvaa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutukset. Huomioi pitkittyneen hypoglykemian vaara.	12.3.2014
<b>Glukosamiini</b> M01AX05		<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.</b> Kliinisesti merkittävästä tehosta ei ole näyttöä.	30.11.2017
<b>Glulisinsuliini</b> A10AB06		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hypoglykemian välttäminen keskeistä.	12.3.2014
<b>Glyseryyli-trinitraatti</b> C01DA02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Huomioi verenpaineen aleneminen ja ortostaattisen hypotonian mahdollisuus.	19.12.2014
<b>Granisetroni</b> A04AA02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> QT-ajan pidentymisen riski.	12.3.2014
<b>Guaifenesiini</b> R05CA03		<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.</b>	23.2.2015
<b>Haloperidoli</b> N05AD01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia.	22.5.2017
<b>Hydroklooritiatsidi</b> C03AA03		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	19.12.2014
<b>Hydroklooritiatsidi ja amiloridi</b> C03EA01	<i>hydroklooritiatsidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	19.12.2014
	<i>amiloridi</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi hyperkalemian riski.	19.12.2014
<b>Hydrokortisoni</b> (suun kautta) H02AB09		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Glukokortikoidien haittavaikutukset korostuvat pitkäaikaiskäytössä. Huomioi yhteisvaikutukset.	19.5.2014
<b>Hydrokortisoni</b> (iholle) D07XA01	<i>hydrokortisoni</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
	<i>dekspantenoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014

Hydrokortisoni (rektaali) C05AA01	<i>hydro- kortisoni muut ainesosat</i>	A	Sopii iäkkäille.	13.5.2013
		A	Sopii iäkkäille.	13.5.2013
Hydrokortisoni ja antibiootti (iholle) D07CA01	<i>hydro- kortisoni muut ainesosat</i>	A	Sopii iäkkäille.	7.4.2014
		A	Sopii iäkkäille.	7.4.2014
Hydrokortisoni ja klooriheksidiini (iholle) D07BA04, D07BB04	<i>hydro- kortisoni kloori- heksidiini</i>	A	Sopii iäkkäille.	7.4.2014
		A	Sopii iäkkäille.	7.4.2014
Hydrokortisoni- butyraatti (iholle) D07AB02		A	Sopii iäkkäille.	7.4.2014
Hydroksiklorokiini P01BA02		C	Soveltuu varauksin iäkkäille. QT-ajan pidentymisen riski. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.	10.11.2014
Hydroksitsiini N05BB01		D	Vältä käyttöä iäkkäillä. Antikolinerginen. Sedatiivinen. QT-ajan pidentymisen riski. Pitkävaikutteinen. Älä käytä uni- tai rauhoittavana lääkkeenä. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat huimaus, takykardia, sekavuus ja muistihäiriöt. Altistaa kaatumisille. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
Hydrokso- kobalamiini B03BA03		A	Sopii iäkkäille.	19.5.2014
Hydromorfon N02AA03		C	Soveltuu varauksin iäkkäille. Sedatiivinen. Pienennä aloitusannosta keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Aloita laksatiivi ummetuksen ehkäisyyn.	25.10.2017
Ibandronaatti M05BA06		C	Soveltuu varauksin iäkkäille. Ei vuodepotilaille. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Potilaan tulee pystyä ottamaan lääke riittävän vesimäärän kera ja olemaan puoli tuntia pystyasennossa lääkkeenoton jälkeen. Käyttöaika-suositus 5 vuotta. Huomioi yhteisvaikutukset kalsiumin, raudan, magnesiumin ja alumiinin kanssa. Suositellaan hammaslääkärin arviota ennen käytön aloitusta.	27.2.2018
Ibuprofeeni M01AE01		C	Soveltuu varauksin iäkkäille. Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Voi heikentää munuaisten toimintaa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi nostaa verenpainetta ja pahentaa sydämen vajaatoimintaa sekä aiheuttaa sydän- ja verisuonitapahtumia. Lisää ruuansulatuskanavan vuotoriskiä. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenvuotoa lisäävien lääkkeiden kanssa. Tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	30.11.2017

Ibuprofeeni ja parasetamoli M01AE51	<i>ibuprofeeni</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Voi heikentää munuaisten toimintaa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi nostaa verenpainetta ja pahentaa sydämen vajaatoimintaa sekä aiheuttaa sydän- ja verisuonitapahtumia. Lisää ruuansulatuskanavan vuotoriskiä. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenvuotoa lisäävien lääkkeiden kanssa. Tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	30.11.2017
	<i>parasetamoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Säännöllisessä käytössä korkeintaan 3 grammaa vuorokaudessa. Huomioi itsehoito- ja yhdistelmävalmisteiden sisältämä parasetamoli. Yliannoksena maksatoksinen. Yhteiskäyttö varfariinin kanssa mahdollista seuraamalla INR-arvoja.	30.11.2017
Ibuprofeeni ja C-vitamiini M01AE51	<i>ibuprofeeni</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Voi heikentää munuaisten toimintaa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi nostaa verenpainetta ja pahentaa sydämen vajaatoimintaa sekä aiheuttaa sydän- ja verisuonitapahtumia. Lisää ruuansulatuskanavan vuotoriskiä. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenvuotoa lisäävien lääkkeiden kanssa. Tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	30.11.2017
	<i>C-vitamiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	30.11.2017
Ihmisinsuliini A10AB01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hypoglykemian välttäminen keskeistä.	12.3.2014
Ihmisinsuliini (pitkävaikutteinen) A10AC01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hypoglykemian välttäminen keskeistä.	12.3.2014
Ihmisinsuliini (insuliinisekoite) A10AD01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hypoglykemian välttäminen keskeistä.	12.3.2014
Indapamidi C03BA11		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Teho menetetään vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	19.12.2014
Indometasiini M01AB01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi keskushermostohaitat, kuten psykoosi. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat mahasuolikanavan verenvuodon riski, munuaisten vajaatoiminnan paheneminen, kohonnut verenpaine ja sydämen vajaatoiminta. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin muiden verenvuotoriskiä lisäävien lääkkeiden kanssa.	30.11.2017
Ipratropium-bromidi (keuhkoihin) R03BB01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Huomioi yhteisvaikutukset.	23.2.2015
Isosorbidi-dinitraatti C01DA08		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Huomioi verenpaineen aleneminen ja ortostaattisen hypotonian mahdollisuus.	19.12.2014
Isosorbidi-mononitraatti C01DA14		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Huomioi verenpaineen aleneminen ja ortostaattisen hypotonian mahdollisuus.	19.12.2014
Ispaghula (psylliumin siemenet) A06AC01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Sopii pitkäaikaiskäyttöön. Huolehdittava riittävästä nesteensaannista.	12.3.2014
Ispaghula, yhdistelmävalmisteet A06AC51		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Sopii pitkäaikaiskäyttöön. Huolehdittava riittävästä nesteensaannista.	12.3.2014



<b>Isradipiini</b> C08CA03		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	19.12.2014
<b>Itrakonatsoli</b> J02AC02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Mahan hapottomuus ja sitä aiheuttavat lääkkeet heikentävät imeytymistä.	28.5.2018
<b>Kabergoliini</b> N04BC06		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat psykoosi, ortostaattinen hypotensio, pleuriitti, fibroosi keuhkoissa/sydänläpissä sekä impulssikontrollihäiriöt kuten peliriippuvuus ja hyperseksuaalisuus. Huomioi yhteisvaikutukset dopamiiniantagonistien kuten antipsyykoottien kanssa.	10.6.2013
<b>Kaliumkloridi</b> A12BA01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi hyperkalemian riski munuaisten vajaatoimintatilailta. Seuraa kaliumpitoisuutta. Huomioi yhteisvaikutukset kaliumtasapainoon vaikuttavien verenpainelääkkeiden kanssa.	7.4.2014
<b>Kaliumkloridi ja magnesium</b> A12BA51	<i>kaliumkloridi</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi hyperkalemian riski munuaisten vajaatoimintatilailta. Seuraa kaliumpitoisuutta. Huomioi yhteisvaikutukset kaliumtasapainoon vaikuttavien verenpainelääkkeiden kanssa.	7.4.2014
	<i>magnesium</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	7.4.2014
<b>Kalsipotrioli</b> (iholle) D05AX02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
<b>Kalsipotrioli ja betametasoni</b> (iholle) D05AX52	<i>kalsipotrioli betametasoni</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
<b>Kalsitrioli</b> (iholle) D05AX03		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
<b>Kalsium ja D-vitamiini</b> A12AX	<i>kalsium</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Mahan happamuuden vähentyessä imeytyminen heikkenee. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	7.4.2014
	<i>D-vitamiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Tarve vähintään 20 µg/vrk (800 ky/vrk) ympärivuotisesti.	7.4.2014
<b>Kalsium-karbonaatti</b> A12AA04		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Mahan happamuuden vähentyessä imeytyminen heikkenee. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	7.4.2014
<b>Kalsiumlaktaatti-glukonaatti</b> A12AA06		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Mahan happamuuden vähentyessä imeytyminen heikkenee. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	7.4.2014
<b>Kandesartaani</b> C09CA06		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa lääkähoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015

Kandesartaani ja hydroklooritiatsidi C09DA06	<i>kandesartaani</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa lääkähoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	<i>hydroklooritiatsidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	8.1.2015
Karbamatsepiini N03AF01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Runsaasti haittavaikutuksia, kuten muutokset verenkuvassa, maksavaurion riski ja hyponatremia. Pitkäaikaisessa käytössä huomioitava D-vitamiinilisän tarve. Huomioi runsaat ja merkittävät yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	15.9.2014
Karbimatsoli H03BB01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Huomioi harvinaiset, mutta vakavat haittavaikutukset.	19.5.2014
Karbosisteiini R05CB03		<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.</b>	23.2.2015
Karvediloli C07AG02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	19.12.2014
Kefaleksiini J01DB01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pidennä annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi mikrobilääkeresistenssi.	28.5.2018
Kefuroksiimi J01DC02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille (suun kautta otettavat valmisteet).</b> Voi voimistaa metotreksaatin vaikutusta.	18.8.2014
Keinokyyneleet (silmään) S01XA20		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	26.10.2017
Ketiapiini N05AH04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. QT-ajan pidentymisen riski. Ei sovellu unilääkkeeksi. Arvioi lääkehoidon tarve säännöllisesti. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio ja sydän ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	22.5.2017
Ketokonatsoli D01AC08		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallisesti käytettynä imeytyy limakalvolta ja rikkoutuneelta iholta (yhteisvaikutusriski kasvaa).	7.4.2014
Ketoprofeeni (iholle) M02AA10		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Käyttöohjeen mukaisesti iholle käytettynä systeeminen imeytyminen vähäistä.	11.4.2018
Ketoprofeeni (suun kautta) M01AE03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Voi heikentää munuaisten toimintaa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi nostaa verenpainetta ja pahentaa sydämen vajaatoimintaa sekä aiheuttaa sydän- ja verisuonitapahtumia. Lisää ruuansulatuskanavan vuotoriskiä. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenvuotoa lisäävien lääkkeiden kanssa. Tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoitossa.	30.11.2017
Ketorolaakki (silmään) S01BC05		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Tilapäiseen käyttöön.	26.10.2017
Ketotifeeni (silmään) S01GX08		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	26.10.2017

Kinapriili C09AA06		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Merkittävä haittavaikutus ortostaattinen hypotensio etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
Kinapriili ja hydroklooritiatsidi C09BA06	<i>kinapriili</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Merkittävä haittavaikutus ortostaattinen hypotensio etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	<i>hydro- klooritiatsidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	8.1.2015
Klaritromysiini J01FA09		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Runsaasti potentiaalisesti vaarallisia yhteisvaikutuksia.	18.8.2014
Klidiini ja klooridiatsepoksidi A03CA02	<i>klinidiini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat kognition heikkeneminen ja ortostaattinen hypotensio. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	13.5.2013
	<i>klooridiatse- poksidi</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen bentsodiatsepiini, jolle kehittyy toleranssi. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, väsymys, muistihäiriöt sekä alttius kaatumisille ja liikenneonnettomuuksille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.	13.5.2013
Klindamysiini (suun kautta) J01FF01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille (suun kautta otettavat valmisteet).</b>	18.8.2014
Klindamysiini (emättimeen) G01AA10		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	3.6.2014
Klobatsaami N05BA09		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, muistihäiriöt ja alttius liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.	22.5.2017
Klobetasoli (iholle, vahva) D07AD01		<b>C</b>	Soveltuu varauksin iäkkäille. Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Harkitse ihotautilääkärin konsultaatiota. Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset ja systeeminen imeytyminen.	7.4.2014
Klobetasoni (iholle, keskivahva) D07AB01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
Klodronaatti M05BA02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Ei vuodepotilaille. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Potilaan tulee pystyä ottamaan lääke riittävän vesimäärän kera ja olemaan puoli tuntia pystyasennossa lääkkeenoton jälkeen. Käyttöaikausitus 5 vuotta. Huomioi yhteisvaikutukset kalsiumin, raudan, magnesiumin ja alumiinin kanssa.	10.11.2014

<b>Klomipramiini</b> N06AA04		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat sekavuus, muistihäiriöt, vapina, rytmihäiriöt, takykardia, ortostaattinen hypotensio ja serotoniinisyndrooma. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Klonatsepaami</b> N03AE01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen bentsodiatsepiini, jolle kehittyä toleranssi. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, väsymys, muistihäiriöt sekä alttius kaatumisille ja liikenneonnettomuuksille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.	10.6.2013
<b>Klonidiini</b> C02AC01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat päänsärky, huimaus, uneliaisuus, ortostaattinen hypotensio ja bradykardia. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin beetasalpaajien kanssa.	13.5.2013
<b>Klooridiatse-poksidi</b> N05BA02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, muistihäiriöt ja alttius liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.	22.5.2017
<b>Klooriprotikseeni</b> N05AF03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio, sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Klopidogreeli</b> B01AC04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Aihiolääke. Merkittävä haittavaikutus verenvuotoriskin lisääntyminen, erityisesti huonokuntoisilla ja munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavilla. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	19.5.2014
<b>Klopidogreeli</b> B01AC04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Aihiolääke. Merkittävä haittavaikutus verenvuotoriskin lisääntyminen, erityisesti huonokuntoisilla ja munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavilla. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	19.5.2014
<b>Klopidogreeli ja asetyylisalisyyli-happo</b> B01AC04	<i>klopidogreeli</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Aihiolääke. Merkittävä haittavaikutus verenvuotoriskin lisääntyminen, erityisesti huonokuntoisilla ja munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavilla. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	19.5.2014
	<i>asetyylisali-syylihappo</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Merkittävä haittavaikutus verenvuotoriskin lisääntyminen. Soveltuu käytettäväksi pienellä annoksella (=100 mg/vrk) valtimotaudin sekundaaripreventiossa.	19.5.2014
<b>Kloramfenikoli</b> (silmään) S01AA01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Tilapäiseen käyttöön.	26.10.2017
<b>Klotrimatsoli</b> (iholle) D01AC01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
<b>Klotrimatsoli</b> (emättimeen) G01AF02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	3.6.2014

<b>Klotsapiini</b> N05AH02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. QT-ajan pidentymisen riski. Vain psykoosin hoitoon. Noudata käytössä viranomaisten hyväksymiä turvallisuusohjeita. Huomioi erityisesti verenkuva seuranta. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio, sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Tupakointi heikentää lääkkeen vaikutusta. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Kodeiini ja ibuprofeeni</b> N02AJ08	<i>kodeiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Voi heikentää munuaisten toimintaa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi nostaa verenpainetta ja pahentaa sydämen vajaatoimintaa sekä aiheuttaa sydän- ja verisuonitapahtumia. Lisää ruuansulatuskanavan vuotoriskiä. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenvuotoa lisäävien lääkkeiden kanssa. Tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	25.10.2017
	<i>ibuprofeeni</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Perimä vaikuttaa vasteeseen. Huomioi yhteisvaikutukset, sillä useat lääkkeet heikentävät kodeiinin tehoa. Aloita laksatiivi ummetuksen ehkäisyyn.	25.10.2017
<b>Kodeiini ja parasetamoli</b> N02AJ06	<i>kodeiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Perimä vaikuttaa vasteeseen. Huomioi yhteisvaikutukset, sillä useat lääkkeet heikentävät kodeiinin tehoa. Aloita laksatiivi ummetuksen ehkäisyyn.	25.10.2017
	<i>parasetamoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Säännöllisessä käytössä korkeintaan 3 grammaa vuorokaudessa. Huomioi itsehoito- ja yhdistelmävalmisteiden sisältämä parasetamoli. Yliannoksena maksatoksinen. Yhteiskäyttö varfariinin kanssa mahdollista seuraamalla INR-arvoja.	25.10.2017
<b>Kolekalsiferoli</b> (vitamiini D3) A11CC05		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Tarve vähintään 20 µg/vrk (800 ky/vrk) ympärivuotisesti.	7.4.2014
<b>Kolestyramiini</b> C10AC01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi ummetuksen riski. Huomioi runsaat imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	8.1.2015
<b>Labetaloli</b> C07AG01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	19.12.2014
<b>Laktuloosi</b> A06AD11		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Sopii pitkäaikaiskäyttöön.	12.3.2014
<b>Lamotrigiini</b> N03AX09		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Runsaasti haittavaikutuksia. Ihohaitat yleisiä, joista osa vakavia.	15.9.2014
<b>Lansopratsoli</b> A02BC03		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Käytön tarpeellisuus arvioitava säännöllisesti. Pitkäaikaiskäytössä voi heikentää kalsiumin ja B12-vitamiinin imeytymistä. Enterorakenteen rikkominen vie lääkkeen tehon.	12.3.2014

<b>Lansopratsoli, amoksisilliini ja klaritromysiini</b> A02BD07	<i>lansopratsoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Käytön tarpeellisuus arvioitava säännöllisesti. Pitkäaikaiskäytössä voi heikentää kalsiumin ja B12-vitamiinin imeytymistä. Enterorakenteen rikkominen vie lääkkeen tehon.	12.3.2014
	<i>amoksisilliini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pidennä annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi voimistaa metotreksaatin vaikutusta.	12.3.2014
	<i>klaritromysiini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä (suun kautta otettavat valmisteet).</b> QT-ajan pidentymisen riski. Runsaasti potentiaalisesti vaarallisia yhteisvaikutuksia.	12.3.2014
<b>Lansopratsoli, metronidatsoli ja amoksisilliini</b> A02BD03	<i>lansopratsoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Käytön tarpeellisuus arvioitava säännöllisesti. Pitkäaikaiskäytössä voi heikentää kalsiumin ja B12-vitamiinin imeytymistä. Enterorakenteen rikkominen vie lääkkeen tehon.	12.3.2014
	<i>metronidatsoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Voi aiheuttaa makuhäiriöitä ja virtsan värjäytymistä. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin ja sulfonyyliureoiden kanssa. Ei alkoholinkäyttöä hoidon aikana.	12.3.2014
	<i>amoksisilliini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pidennä annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi voimistaa metotreksaatin vaikutusta.	12.3.2014
<b>Latanoprosti (silmään)</b> S01EE01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hoidon aloitus ja käyttö silmälääkärin valvonnassa. Saattaa aiheuttaa silmän värikalvon pigmenttimuutoksia ja ripsien kasvua.	26.10.2017
<b>Lauryylisulfaatti, sorbitoli ja natriumsitraatti</b> A06AG11	<i>natriumlauryylisulfaatti sorbitoli natriumsitraatti</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Tilapäiseen käyttöön.	13.5.2013
		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
<b>Lerkanidipiini</b> C08CA13		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	19.12.2014
<b>Levetirasetami</b> N03AX14		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi erityisesti keskushermostoon kohdistuvat haittavaikutukset. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	15.9.2014
<b>Levodopa ja dekarboksylaasin estäjä</b> N04BA02	<i>levodopa</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hoidon aloitus erikoislääkärin valvonnassa. Imeytyminen lisääntyy ikääntymisen myötä. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat sekavuus, kiihtyneisyys, ortostaattinen hypotensio ja dyskinesiat. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin psykoosilääkkeiden kanssa. Äkillinen hoidon lopettaminen voi aiheuttaa malignin neuroleptisyndrooman kaltaisia oireita.	20.10.2014
	<i>karbidopa/benseratsidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Serotonerginen. Hoidon aloitus erikoislääkärin valvonnassa. Imeytyminen lisääntyy ikääntymisen myötä. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat sekavuus, kiihtyneisyys, ortostaattinen hypotensio ja dyskinesiat. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin psykoosilääkkeiden kanssa. Äkillinen hoidon lopettaminen voi aiheuttaa malignin neuroleptisyndrooman kaltaisia oireita.	20.10.2014

Levodopa, dekarboksylaasin estäjä ja COMT-estäjä N04BA03	<i>levodopa</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hoidon aloitus erikoislääkärin valvonnassa. Imeytyminen lisääntyy ikääntymisen myötä. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat sekavuus, kiihtyneisyys, ortostaattinen hypotensio ja dyskinesiat. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin psykoosilääkkeiden kanssa. Äkillinen hoidon lopettaminen voi aiheuttaa malignin neuroleptisyndrooman kaltaisia oireita.	20.10.2014
	<i>karbidopa</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Serotonerginen. Hoidon aloitus erikoislääkärin valvonnassa. Imeytyminen lisääntyy ikääntymisen myötä. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat sekavuus, kiihtyneisyys, ortostaattinen hypotensio ja dyskinesiat. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin psykoosilääkkeiden kanssa. Äkillinen hoidon lopettaminen voi aiheuttaa malignin neuroleptisyndrooman kaltaisia oireita.	20.10.2014
	<i>entakaponi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Serotonerginen. Hoidon aloitus erikoislääkärin valvonnassa. Imeytyminen lisääntyy ikääntymisen myötä. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat sekavuus, kiihtyneisyys, ortostaattinen hypotensio ja dyskinesiat. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin psykoosilääkkeiden kanssa. Äkillinen hoidon lopettaminen voi aiheuttaa malignin neuroleptisyndrooman kaltaisia oireita.	20.10.2014
Levofloksasiini J01MA12		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi aiheuttaa huimausta hoidon alkuvaiheessa. Lisää riskiä jännetulehdukselle. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset. Huomioi muut yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin ja sulfonyyliureoiden kanssa.	15.9.2014
Levokabastiini (silmaan) S01GX02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	26.10.2017
Levomopro- matsiini N05AA02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeitömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
Levosetiritsiini R06AE09		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi aiheuttaa väsymystä.	23.2.2015
Levotyrokseeni- natrium H03AA01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset kalsiumin, raudan, magnesiumin ja alumiinin kanssa.	19.5.2014
Linagliptiini A10BH05		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosta ei tarvitse muuttaa munuaisten vajaatoiminnassa. Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä.	22.5.2017
Lisinopriili C09AA03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa lääkähoidon aikana. Merkittävä haittavaikutus ortostaattinen hypotensio etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015

Lisinopriili ja hydroklooritiatsidi C09BA03	<i>lisinopriili</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Merkittävä haittavaikutus ortostaattinen hypotensio etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	<i>hydroklooritiatsidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	8.1.2015
Lisproinsuliini (sekoite) A10AD04		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hypoglykemian välttäminen keskeistä.	12.3.2014
Lisproinsuliini (lyhytvaikutteinen) A10AD04		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hypoglykemian välttäminen keskeistä.	12.3.2014
Litium N05AN01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Kapea terapeuttilinen leveys. Seuraa lääke- ja natriumpitoisuutta plasmassa. Älä käytä munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat vapina, pahoinvointi, ripuli, lihasheikkous, ataksia ja häiriöt kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasen toiminnassa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin tulehduskipulääkkeiden, ACE-estäjien ja diureettien kanssa.	22.5.2017
Lodoksamidi (silmaan) S01GX05		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	26.10.2017
Loperamidi A07DA03		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Akuutin ripulin hoitoon korkeintaan kahden vuorokauden ajan. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	12.3.2014
Loperamidi ja simetikoni A07DA53	<i>loperamidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Akuutin ripulin hoitoon korkeintaan kahden vuorokauden ajan. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	12.3.2014
	<i>simetikoni</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	12.3.2014
Loratadiini R06AX13		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi aiheuttaa väsymystä.	23.2.2015
Loratsepaami N05BA06		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Aiheuttaa riippuvuutta. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt sekä alttius liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta. Unettomuuden ja käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia.	22.5.2017
Losartaani C09CA01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
Losartaani ja hydroklooritiatsidi C09DA01	<i>hydroklooritiatsidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	8.1.2015
	<i>losartaani</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
Lovastatiini C10AA02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Lihaskivut ja lihasheikkous mahdollisia haittoja. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	8.1.2015



<b>Lymesykliini</b> J01AA04		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Kalsium, rauta, magnesium ja alumiini vähentävät imeytymistä. Vältettävä altistusta auringonvalolle.	18.8.2014
<b>Magnesium</b> (suspensio) A02AA04		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Ei sovi iäkkäiden laksatiiviksi eikä antasidiksi, käytä turvallisempia vaihtoehtoja. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	13.1.2014
<b>Magnesium</b> (suun kautta) G04BX01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	3.6.2014
<b>Magnesium ja kalsium</b> A02AD01	<i>magnesium</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Ei sovi iäkkäiden antasidiksi. Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	13.5.2013
	<i>kalsium</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
<b>Maitohappobakteerit</b> A07FA01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	12.3.2014
<b>Makrogoli</b> A06AD15		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Sopii pitkäaikaiskäyttöön.	12.3.2014
<b>Makrogoli, yhdistelmävalmisteet</b> A06AD65	<i>makrogoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Sopii pitkäaikaiskäyttöön.	12.3.2014
	<i>muut ainesosat</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	12.3.2014
<b>Medroksi-progesteroni ja estrogeeni</b> G03FA12 G03FB06	<i>medroksi-progesteroni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.	3.6.2014
	<i>estrogeeni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä systeemistä käyttöä iäkkäillä.</b> Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.	3.6.2014
<b>Mefenaamihappo</b> M01AG01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Voi heikentää munuaisten toimintaa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi nostaa verenpainetta ja pahentaa sydämen vajaatoimintaa sekä aiheuttaa sydän- ja verisuonitapahtumia. Lisää ruuansulatuskanavan vuotoriskiä. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenvuotoa lisäävien lääkkeiden kanssa. Tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	30.11.2017
<b>Meklotsiini</b> R06AE05		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus, muistihäiriöt, väsymys, ortostaattinen hypotensio ja alttius kaatumisille. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	23.2.2015
<b>Melatonini</b> N05CH01		<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Bentsodiatsepiineihin tai niiden kaltaisiin lääkkeisiin verrattuna haitat vähäisempiä. Unettomuuden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia.	22.5.2017

<b>Meloksikaami</b> M01AC06		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Voi heikentää munuaisten toimintaa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi nostaa verenpainetta ja pahentaa sydämen vajaatoimintaa sekä aiheuttaa sydän- ja verisuonitapahtumia. Lisää ruuansulatuskanavan vuotoriskiä. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenvuotoa lisäävien lääkkeiden kanssa. Tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	30.11.2017
<b>Memantiini</b> N06DX01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi merkittävät yhteisvaikutukset fenytoiinin, ketamiinin ja itsehoidossa käytetyn dekstrometorfaania sisältävän yskänlääkkeen kanssa.	25.10.2017
<b>Mesalatsiini</b> A07EC02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.	7.4.2014
<b>Metadoni</b> N07BC02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Opioidi, jonka vaikutus iäkkäillä on erityisen pitkä. Huomioi yhteisvaikutukset.	25.10.2017
<b>Metenamiini</b> J01XX05		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vältä käyttöä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Hyödytön katetroiduilla potilailla.	18.8.2014
<b>Metformiini</b> A10BA02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa tai kudoshypoksiassa. Voi heikentää B12-vitamiinin imeytymistä. Huomioi maitohappoasidoosin riski. Tauota kuumeen, gastroenteriitin tai dehydraation yhteydessä sekä ennen leikkausta tai varjoainokuvausta.	7.4.2014
<b>Metformiini ja linagliptiini</b> A10BD11	<i>metformiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa tai kudoshypoksiassa. Voi heikentää B12-vitamiinin imeytymistä. Huomioi maitohappoasidoosin riski. Tauota kuumeen, gastroenteriitin tai dehydraation yhteydessä sekä ennen leikkausta tai varjoainokuvausta.	7.4.2014
	<i>linagliptiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosta ei tarvitse muuttaa munuaisten vajaatoiminnassa. Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä.	22.5.2017
<b>Metformiini ja pioglitatsoni</b> A10BD05	<i>metformiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa tai kudoshypoksiassa. Voi heikentää B12-vitamiinin imeytymistä. Huomioi maitohappoasidoosin riski. Tauota kuumeen, gastroenteriitin tai dehydraation yhteydessä sekä ennen leikkausta tai varjoainokuvausta.	7.4.2014
	<i>pioglitatsoni</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Ei sovellu osteoporoosia, sydämen tai maksan vajaatoimintaa sairastaville. Huomioi nesteretention ja anemian riski. Saattaa lisätä riskiä virtsarakkosyöpään.	7.4.2014
<b>Metformiini ja saksagliptiini</b> A10BD10	<i>metformiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa tai kudoshypoksiassa. Voi heikentää B12-vitamiinin imeytymistä. Huomioi maitohappoasidoosin riski. Tauota kuumeen, gastroenteriitin tai dehydraation yhteydessä sekä ennen leikkausta tai varjoainokuvausta.	7.4.2014
	<i>saksagliptiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Ei sovellu maksan vajaatoimintapotilaille. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi perifeerisen nesteretention vaara. Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä.	7.4.2014

<b>Metformiini ja sitagliptiini</b> A10BD07	<i>metformiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa tai kudoshypoksiassa. Voi heikentää B12-vitamiinin imeytymistä. Huomioi maitohapposidoosin riski. Tauota kuumeen, gastroenteriitin tai dehydraation yhteydessä sekä ennen leikkausta tai varjoainekuvausta.	7.4.2014
	<i>sitagliptiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Ei sovellu maksan vajaatoimintapotilaille. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä.	7.4.2014
<b>Metformiini ja vildagliptiini</b> A10BD08	<i>metformiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa tai kudoshypoksiassa. Voi heikentää B12-vitamiinin imeytymistä. Huomioi maitohapposidoosin riski. Tauota kuumeen, gastroenteriitin tai dehydraation yhteydessä sekä ennen leikkausta tai varjoainekuvausta.	7.4.2014
	<i>vildagliptiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Ei sovellu maksan vajaatoimintapotilaille. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä.	7.4.2014
<b>Metoklopramidi</b> A03FA01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat ekstrapyramidaalioireet ja sekavuus. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin antipsykoottien ja dopamiiniagonistien kuten levodopan kanssa.	13.5.2013
<b>Metoprololi</b> C07AB02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	19.12.2014
<b>Metoprololi ja felodipiini</b> C07FB02	<i>metoprololi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	19.12.2014
	<i>felodipiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	19.12.2014
<b>Metoprololi ja hydroklooritiatsidi</b> C07BB02	<i>metoprololi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	19.12.2014
	<i>hydroklooritiatsidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	19.12.2014
<b>Metotreksaatti</b> L04AX03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Muussa kuin syövän hoidossa annostelu vain kerran viikossa. Elintoksinen, kuten munuaiset, maksa ja luuydin. Muista turvakokeet. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	30.11.2017
<b>Metronidatsoli</b> (iholle) D06BX01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Huomioi mahdollinen yhteisvaikutus varfariinin kanssa.	7.4.2014
<b>Metronidatsoli</b> (suun kautta) P01AB01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin ja sulfonyyliureoiden kanssa. Voi aiheuttaa makuhäiriöitä ja värjätä virtsan tummaksi. Alkoholin käyttöä vältettävä hoidon aikana ja vuorokausi hoidon jälkeen.	10.11.2014

<b>Metronidatsoli/ metronidatsoli ja nystatiini</b> (emättimeen) G01AF01	<i>metroni- datsoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Huomioi mahdollinen yhteisvaikutus varfariinin kanssa. Ei alkoholin käyttöä hoidon aikana.	3.6.2014
	<i>nystatiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Ei kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia.	3.6.2014
<b>Metyyli- prednisoloni</b> H02AB04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Glukokortikoidien haittavaikutukset korostuvat pitkäaikaiskäytössä. Huomioi yhteisvaikutukset.	19.5.2014
<b>Metyyli- prednisoloni</b> (iholle) D07AC14		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset ja systeeminen imeytyminen.	7.4.2014
<b>Mianseriini</b> N06AX03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Altistaa kaatumisille.	25.10.2017
<b>Midatsolaami</b> N05CD08		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Lyhytvaikutteinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, rebound-unettomuus, amnesia, muistihäiriöt sekä alttius liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	22.5.2017
<b>Mikonatsoli</b> (iholle) D01AC02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Paikallisesti käytettynä imeytyy limakalvolta ja rikkoutuneelta iholta. Huomio yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin kanssa. Vaihtoehtona nystatiini.	7.4.2014
<b>Mikonatsoli</b> (emättimeen) G01AF04		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	3.6.2014
<b>Mikonatsoli</b> (oraaligeeli) A01AB09		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Imeytyminen elimistöön lisääntyy limakalvoilta ja rikkoutuneelta iholta. Huomioi yhteisvaikutukset varfariinin ja fentanyylin kanssa. Turvallisempi vaihtoehto nystatiini.	13.1.2014
<b>Mikonatsoli/ ekonatsoli ja hydrokortisoni</b> (iholle) D01AC20	<i>mikonatsoli/ ekonatsoli</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Paikallisesti käytettynä imeytyy rikkoutuneelta iholta. Huomioi vakavat yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin tai fentanyylin kanssa.	7.4.2014
	<i>hydro- kortisoni</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
<b>Milnasipraani</b> N06AX17		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Serotonerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat hyponatremia ja verenvuotoriskin lisääntyminen. Altistaa kaatumisille. Huomioi yhteisvaikutukset.	25.10.2017
<b>Mirabegroni</b> G04BD12		<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.</b> Virtsatiespasmolyytti, jolla ei ole antikolinergisia sivuvaikutuksia. Eliminaatio vähenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutukset.	20.10.2014
<b>Mirtatsapiini</b> N06AX11		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Sopii pienellä annoksella unettomuuden hoitoon. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Altistaa kaatumisille.	25.10.2017
<b>Moklobemidi</b> N06AG02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Serotonerginen. Harkitse ensisijaisesti muita masennuslääkkeitä. Altistaa kaatumisille. Huomioi yhteisvaikutukset. Pitkä siirtymäaika tarpeen masennuslääkettä vaihdettaessa.	25.10.2017

<b>Moksifloksasiini</b> J01MA14		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille (suun kautta otettavat valmisteet).</b> QT-ajan pidentymisen riski. Voi aiheuttaa huimausta hoidon alkuvaiheessa. Lisää riskiä jännetulehdukselle. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset. Huomioi muut yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin ja sulfonyyliureoiden kanssa.	15.9.2014
<b>Moksonidiini</b> C02AC05		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat päänsärky, uneliaisuus ja unihäiriöt. Vahvistaa keskushermoston toimintaa lamaavien lääkkeiden vaikutusta. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin beetasalpaajien kanssa.	13.5.2013
<b>Mometasoni</b> (keuhkoihin) R03BA07		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pitkäaikainen, suuriannoksinen käyttö voi aiheuttaa systeemisiä vaikutuksia. Muistuta suun huuhtomisesta lääkkeenoton jälkeen. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin tiettyjen sienilääkkeiden kanssa.	23.2.2015
<b>Mometasoni</b> (iholle) D07AC13		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset ja systeeminen imeytyminen.	7.4.2014
<b>Mometasoni</b> (nenään) R01AD09		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	8.1.2015
<b>Montelukasti</b> R03DC03		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	23.2.2015
<b>Morfiini</b> N02AA01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Aloita laksatiivi ummetuksen ehkäisyyn.	25.10.2017
<b>Nabumetoni</b> M01AX01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Voi heikentää munuaisten toimintaa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi nostaa verenpainetta ja pahentaa sydämen vajaatoimintaa sekä aiheuttaa sydän- ja verisuonitapahtumia. Lisää ruuansulatuskanavan vuotoriskiä. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenvuotoa lisäävien lääkkeiden kanssa. Tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	30.11.2017
<b>Naprokseeni</b> M01AE02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Voi heikentää munuaisten toimintaa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi nostaa verenpainetta ja pahentaa sydämen vajaatoimintaa sekä aiheuttaa sydän- ja verisuonitapahtumia. Lisää ruuansulatuskanavan vuotoriskiä. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenvuotoa lisäävien lääkkeiden kanssa. Tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	30.11.2017
<b>Natamysiini</b> (iholle) D01AA02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
<b>Natriumdokusaatti ja sorbitoli</b> A06AG10	<i>natrium-dokusaatti</i> <i>sorbitoli</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Tilapäiseen käyttöön.	13.5.2013
<b>Natrium-pikosulfaatti</b> A06AB08		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa käytössä suolilaman riski.	13.5.2013

Natrium-pikosulfaatti, magnesium ja sitruunahappo A06AB58	<i>natrium-pikosulfaatti</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa käytössä suolilaman riski.	13.5.2013
	<i>magnesium</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Ei sovi iäkkäiden antasidiksi. Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	13.5.2013
	<i>sitruunahappo</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
Nebivololi C07AB12		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	19.12.2014
Neomysiini (iholle) D06AX04		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen hoitoon rajoitetulle ihoalueelle. Paikallisesti käytettynä imeytyy limakalvolta ja rikkoutuneelta iholta.	7.4.2014
Nifedipiini C08CA05		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille (pitkävaikutteiset valmisteet).</b> Älä käytä lyhytvaikutteisia valmisteita. Haittavaikutuksena nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	19.12.2014
Nilvadipiini C08CA10		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	19.12.2014
Nisoldipiini C08CA07		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	19.12.2014
Nitratsepaami N05CD02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, muistihäiriöt ja alttius liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.	22.5.2017
Nitrofurantoiini J01XE01	<i>nitro-furantoiini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Älä käytä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat keuhkokuumeet ja perifeerinen neuropatia. Huomioi mikrobilääkeresistenssi.	28.5.2018
	<i>C-vitamiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	28.5.2018
Noretisteroni ja estrogeeni G03FA01, G03FB05	<i>noretisteroni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä systeemistä käyttöä iäkkäillä.</b> Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.	3.6.2014
	<i>estrogeeni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä systeemistä käyttöä iäkkäillä.</b> Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.	3.6.2014
Norfloksasiini J01MA06		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi aiheuttaa huimausta hoidon alkuvaiheessa. Lisää riskiä jännetulehdukselle. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset. Huomioi muut yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin ja sulfonyyliureoiden kanssa.	15.9.2014

<b>Nortriptyliini</b> N06AA10		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Käyttö mahdollista pienellä annoksella neuropaattisen kivun hoitoon. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat sekavuus, muistihäiriöt, vapina, rytmihäiriöt, takykardia, ortostaattinen hypotensio, serotoniinisyndrooma. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Nystatiini</b> A07AA02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Ei kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia.	12.3.2014
<b>Ofloksasiini</b> J01MA01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi aiheuttaa huimausta hoidon alkuvaiheessa. Lisää riskiä jännetulehdukselle. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset. Huomioi muut yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin ja sulfonyyliureoiden kanssa.	18.8.2014
<b>Oksatsepaami</b> N05BA04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Aiheuttaa riippuvuutta. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt sekä alttius liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta. Unettomuuden ja käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia.	22.5.2017
<b>Oksibutiniini</b> G04BD04		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	13.5.2013
<b>Oksikodoni</b> N02AA05		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. QT-ajan pidentymisen riski. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Aloita laksatiivi ummetuksen ehkäisyyn. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	25.10.2017
<b>Oksikodoni ja naloksoni</b> N02AA55	<i>oksikodoni</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. QT-ajan pidentymisen riski. Vahva opioidi. Titraa annos vasteen mukaan. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	11.4.2018
	<i>naloksoni</i>	<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.</b>	11.4.2018
<b>Okskarbatsepiini</b> N03AF02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Runsaasti haittavaikutuksia, kuten muutokset verenkuvassa, maksavaurion riski ja hyponatremia. Pitkäaikaisessa käytössä huomioitava D-vitamiinilisän tarve.	15.9.2014
<b>Olantsapiini</b> N05AH03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Arvioi lääkehoidon tarve säännöllisesti. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio, sydän ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia.	22.5.2017
<b>Olmesartaani-medoksomiiili</b> C09CA08		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015

Olmesartaani-medoksomiiili ja hydroklooritiatsidi C09DA08	<i>olmesartaani-medoksomiiili</i>  <i>hydroklooritiatsidi</i>	C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa lääkkehoidon aikana. Vältä tulehduskivonlääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
		A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	8.1.2015
Olopatadiini (silmään) S01GX09		A	<b>Sopii iäkkäille.</b>	26.10.2017
Omepratsoli A02BC01		A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Käytön tarpeellisuus arvioitava säännöllisesti. Pitkäaikaiskäytössä voi heikentää kalsiumin ja B12-vitamiinin imeytymistä. Enterorakenteen rikkominen vie lääkkeen tehon.	12.3.2014
Ondansetroni A04AA01		A	<b>Sopii iäkkäille.</b>	12.3.2014
Orfenadriini M03BC01		D	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	30.11.2017
Orfenadriini ja parasetamoli M03BC51	<i>orfenadriini</i>	D	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	30.11.2017
	<i>parasetamoli</i>	A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Säännöllisessä käytössä korkeintaan 3 grammaa vuorokaudessa. Huomioi itsehoito- ja yhdistelmävalmisteiden sisältämä parasetamoli. Yliannoksena maksatoksinen. Yhteiskäyttö varfariinin kanssa mahdollista seuraamalla INR-arvoja.	30.11.2017
Pamidronaatti M05BA03		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Ei vuodepotilaille. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Potilaan tulee pystyä ottamaan lääke riittävän vesimäärän kera ja olemaan puoli tuntia pystyasennossa lääkkeenoton jälkeen. Käyttöaikaosuus 5 vuotta. Huomioi yhteisvaikutukset kalsiumin, raudan, magnesiumin ja alumiinin kanssa.	10.11.2014
Pantopratsoli A02BC02		A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Käytön tarpeellisuus arvioitava säännöllisesti. Pitkäaikaiskäytössä voi heikentää kalsiumin ja B12-vitamiinin imeytymistä. Enterorakenteen rikkominen vie lääkkeen tehon.	12.3.2014
Parasetamoli N02BE01		A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Säännöllisessä käytössä korkeintaan 3 grammaa vuorokaudessa. Huomioi itsehoito- ja yhdistelmävalmisteiden sisältämä parasetamoli. Yliannoksena maksatoksinen. Yhteiskäyttö varfariinin kanssa mahdollista seuraamalla INR-arvoja.	25.10.2017
Parasetamoli, C-vitamiini ja kofeiini N02BE51	<i>parasetamoli</i>  <i>C-vitamiini</i> <i>kofeiini</i>	A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Säännöllisessä käytössä korkeintaan 3 grammaa vuorokaudessa. Huomioi itsehoito- ja yhdistelmävalmisteiden sisältämä parasetamoli. Yliannoksena maksatoksinen. Yhteiskäyttö varfariinin kanssa mahdollista seuraamalla INR-arvoja.	25.10.2017
		A	<b>Sopii iäkkäille.</b>	25.10.2017
		A	<b>Sopii iäkkäille.</b>	25.10.2017



<b>Paroksetiini</b> N06AB05		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Harkitse ensisijaisesti muita SSRI-ryhmän lääkkeitä. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat hyponatremia ja verenvuotoriskin lisääntyminen. Altistaa kaatumisille. Huomioi merkittävät yhteisvaikutukset.	25.10.2017
<b>Pensikloviiri</b> (iholle) D06BB06		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
<b>Pentoksifylliini</b> C04AD03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Pidennä annosväliä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Teho on vaatimaton ja lääkkeellä on paljon haittavaikutuksia.	13.5.2013
<b>Perfenatsiini</b> N05AB03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Perindopriili</b> C09AA04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Merkittävä haittavaikutus ortostaattinen hypotensio etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
<b>Perindopriili ja amlodipiini</b> C09BB04	<i>perindopriili</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Merkittävä haittavaikutus ortostaattinen hypotensio etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	<i>amlodipiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	8.1.2015
<b>Perindopriili ja hydroklooritiatsidi</b> C09BA04	<i>perindopriili</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Merkittävä haittavaikutus ortostaattinen hypotensio etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	<i>indapamidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho menetetään vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	8.1.2015
<b>Perisatsiini</b> N05AC01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Pilokarpiini</b> (ilmään) S01EB01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Hoidon aloitus ja käyttö silmälääkärin valvonnassa.	26.10.2017

<b>Pimekrolimuusi</b> (iholle) D11AH02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
<b>Pindololi</b> C07AA03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Epäselektiivinen beetasalpaaja. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat unihäiriöt, masennus ja lihasheikkous. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	13.5.2013
<b>Pioglitasoni</b> A10BG03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Ei sovellu osteoporoosia, sydämen tai maksan vajaatoimintaa sairastaville. Huomioi nesteretention ja anemian riski. Saattaa lisätä riskiä virtsarakkosyöpään.	7.4.2014
<b>Piroksikaami</b> (iholle) M02AA07		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Käyttöohjeen mukaisesti iholle käytettynä systeeminen imeytyminen vähäistä.	11.4.2018
<b>Pitofenoni ja metamitsoli</b> A03DA02	<i>pitofenoni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	13.5.2013
	<i>metamitsoli</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Epäselektiivinen tulehduskipulääke, jolla on havaittu tavanomaisten tulehduskipulääkkeiden haittavaikutusten lisäksi luuydinsuppressiota ja agranulosytoosia. Poistuminen hidastunut munuaisten vajaatoiminnassa.	13.5.2013
<b>Pivmesillinaami</b> J01CA08		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pidennä annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.	18.8.2014
<b>Pramipeksoli</b> N04BC05		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Hoidon aloitus erikoislääkärin valvonnassa. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Runsaasti haittavaikutuksia, kuten ortostaattinen hypotensio, ruuansulatuskanavan oireita ja psyykkisiä oireita (unihäiriö, hallusinaatiot, levottomuus ja äkillinen nukahtelu). Depotvalmisteilla vähemmän haittavaikutuksia kuin lyhytvaikutteisilla. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin psykoosilääkkeiden kanssa.	7.5.2015
<b>Pratsosiini</b> C02CA01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat ortostaattinen hypotensio, huimaus, väsymys ja näköhäiriöt.	13.5.2013
<b>Pravastatiini</b> C10AA03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Lihaskivut ja lihasheikkous mahdollisia haittoja.	8.1.2015
<b>Prednisoloni</b> H02AB06		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Glukokortikoidien haittavaikutukset korostuvat pitkäaikaiskäytössä. Huomioi yhteisvaikutukset.	19.5.2014
<b>Prednisoloni</b> (rektaalinen) C05AA04		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	3.12.2013
<b>Prednisoloni</b> (suun kautta) H02AB06		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Glukokortikoidien haittavaikutukset korostuvat pitkäaikaiskäytössä. Huomioi yhteisvaikutukset.	19.5.2014
<b>Prednisoni</b> H02AB07		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Glukokortikoidien haittavaikutukset korostuvat pitkäaikaiskäytössä. Huomioi yhteisvaikutukset.	19.5.2014
<b>Pregabaliini</b> N03AX16		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Voi pidentää QTc-aikaa. Huomioi erityisesti keskushermostoon kohdistuvat haittavaikutukset. Riippuvuuden kehittyminen mahdollista. Käyttö lopetettava asteittain.	15.9.2014

<b>Proklooriperatsiini</b> N05AB04		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Propranololi</b> C07AA05		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Epäselektiivinen beetasalpaaja. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat inihäiriöt, masennus ja lihasheikkous. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	13.5.2013
<b>Pseudoefedriini ja setiritsiini/akrivastiini/desloratadiini</b> R01BA52	<i>pseudo-efedriini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Tarvittaessa vain lyhytaikaiseen käyttöön (<10 vrk). Pidennä annosväliä jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Lisää sympatomiteettistä vaikutusta. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin MAO-estäjien ja sympatomimeettisten aineiden kanssa.	23.2.2015
	<i>setiritsiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.	23.2.2015
	<i>desloratadiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi aiheuttaa väsymystä.	23.2.2015
	<i>akrivastiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi aiheuttaa väsymystä.	23.2.2015
<b>Rabepratsoli</b> A02BC04		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Käytön tarpeellisuus arvioitava säännöllisesti. Pitkäaikaiskäytössä voi heikentää kalsiumin ja B12-vitamiinin imeytymistä. Enterorakenteen rikkominen vie lääkkeen tehon.	12.3.2014
<b>Ramipriili</b> C09AA05		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Merkittävä haittavaikutus ortostaattinen hypotensio etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
<b>Ramipriili ja hydroklooritiatsidi</b> C09BA05	<i>ramipriili</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Merkittävä haittavaikutus ortostaattinen hypotensio etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	<i>hydroklooritiatsidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	8.1.2015
<b>Ramipriili ja felodipiini</b> C09BB05	<i>ramipriili</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Merkittävä haittavaikutus ortostaattinen hypotensio etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	<i>felodipiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	8.1.2015

Ranitidiini A02BA02		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Iäkkäät ovat alttiita harvinaisille haittavaikutuksille, kuten päänsärylle, huimaukselle, mahasuolikanavan oireille ja sekavuudelle.	12.3.2014
Rasagiliini N04BD02		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Serotonerginen. Huomioi lääkkeen käytön vasta-aiheet. Haittavaikutuksena masennus, aistiharhat, päänsärky, huimaus, allergia, angina pectoris ja muskuloskeletaaliset kivut. Yhteiskäyttöön SSRI- ja SNRI-lääkkeiden, trisyklisten ja tetrasyklisten masennuslääkkeiden kanssa liittyy serotoniinsyndrooman riski, joka käytännössä on kuitenkin vähäinen.	7.5.2015
Rautavalmisteet B03AB05		A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	15.11.2016
Reboksetiini N06AX18		B	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.</b> Altistaa kaatumisille. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	25.10.2017
Repaglinidi A10BX02		D	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	7.4.2014
Retinoli (silmäin) S01XA02		A	<b>Sopii iäkkäille.</b>	26.10.2017
Risedronaatti M05BA07		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Ei vuodepotilaille. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Potilaan tulee pystyä ottamaan lääke riittävän vesimäärän kera ja olemaan puoli tuntia pystyasennossa lääkkeenoton jälkeen. Käyttöaikaosuus 5 vuotta. Huomioi yhteisvaikutukset kalsiumin, raudan, magnesiumin ja alumiinin kanssa. Suositellaan hammaslääkärin arviota ennen käytön aloitusta.	27.2.2018
Risperidoni N05AX08		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Arvioi lääkehoidon tarve säännöllisesti. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio, sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia.	22.5.2017
Rivaroksabaani B01AF01		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittävä haittavaikutus verenvuotoriskin lisääntyminen. Huomioi yhteisvaikutukset. Ei tunnettua vastavaikuttajaa (antidoottia).	19.5.2014
Rivastigmiini N06DA03		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Voi vaikeuttaa ahtauttavaa keuhkosairautta. QT-ajan pidentymisen riski. Altistaa sydämen johtumishäiriöille, kuten bradykardialle. Huomioi ruoansulatuskanavaan kohdistuvat haitat. Huomioi yhteisvaikutukset. Antikolinergiset lääkeaineet heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	25.10.2017
Roksitromysiini J01FA06		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Huomioi mikrobilääkeresistenssi.	28.5.2018
Ropiniroli N04BC04		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Hoidon aloitus erikoislääkärin valvonnassa. Pidennä annosväliä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Runsaasti haittavaikutuksia kuten ortostaattinen hypotensio, ruoansulatuskanavan oireet ja psyykkisiä oireita (unihäiriö, hallusinaatiot, levottomuus ja äkillinen nukahtelu). Pitkävaikutteisilla valmisteilla vähemmän haittavaikutuksia kuin lyhytvaikutteisilla. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin psykoosilääkkeiden kanssa.	7.5.2015

Rosuvastatiini C10AA07		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Lihaskivut ja lihasheikkous mahdollisia haittoja. Alumiinin ja magnesiumin samanaikainen käyttö heikentää lääkkeen tehoa. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	8.1.2015
Rotigotiini N04BC09		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Serotonerginen. Hoidon aloitus erikoislääkärin valvonnassa. Runsaasti haittavaikutuksia, kuten ortostaattinen hypotensio, ruuansulatuskanavan oireet ja psyykkisiä oireita (unihäiriö, hallusinaatiot, levottomuus ja äkillinen nukahtelu). Depotvalmisteilla vähemmän haittavaikutuksia kuin lyhytvaikutteisilla. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin psykoosilääkkeiden kanssa.	7.5.2015
Saccharomyces boulardii A07FA02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Lääke tuhoutuu yhteiskäytössä sienilääkkeiden kanssa.	12.3.2014
Saksagliptiini A10BH03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Ei sovellu maksan vajaatoimintapotilaille. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi perifeerisen nesteretention vaara. Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä.	7.4.2014
Salbutamoli (keuhkoihin) R03AC02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Lisää sympatomiteettistä vaikutusta. Voi aiheuttaa hypokalemiaa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sympatomimeettisten aineiden kanssa.	23.2.2015
Salbutamoli ja ipratropium- bromidi (keuhkoihin) R03AL02	<i>salbutamoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Lisää sympatomiteettistä vaikutusta. Voi aiheuttaa hypokalemiaa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sympatomimeettisten aineiden kanssa.	23.2.2015
	<i>ipratropium- bromidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Huomioi yhteisvaikutukset.	23.2.2015
Salisyylihappo (iholle) M02AC		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Käyttöohjeen mukaisesti iholle käytettynä systeeminen imeytyminen vähäistä.	11.4.2018
Salmeteroli (keuhkoihin) R03AC12		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Lisää sympatomiteettistä vaikutusta. Voi aiheuttaa hypokalemiaa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sympatomimeettisten aineiden kanssa.	23.2.2015
Salmeteroli ja flutikasoni (keuhkoihin) R03AK06	<i>salmeteroli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Lisää sympatomiteettistä vaikutusta. Voi aiheuttaa hypokalemiaa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sympatomimeettisten aineiden kanssa.	23.2.2015
	<i>flutikasoni</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pitkäaikainen, suuriannoksinen käyttö voi aiheuttaa systeemisiä vaikutuksia. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin tiettyjen sienilääkkeiden kanssa. Muistuta suun huuhtomisesta lääkkeenoton jälkeen.	23.2.2015
Selegiliini N04BD01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Serotonerginen. Huomioi lääkkeen käytön vasta-aiheet. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksena masennus, aistiharhat, päänsärky, huimaus, allergia, angina pectoris ja muskuloskeletaaliset kivut. Yhteiskäyttöön SSRI- ja SNRI-lääkkeiden, trisyklisten ja tetrasyklisten masennuslääkkeiden kanssa liittyy serotoniinsyndrooman riski, joka käytännössä on kuitenkin vähäinen.	7.5.2015

<b>Selekoksibi</b> M01AH01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Voi heikentää munuaisten toimintaa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi nostaa verenpainetta ja pahentaa sydämen vajaatoimintaa sekä aiheuttaa sydän- ja verisuonitapahtumia. Lisää ruuansulatuskanavan vuotoriskiä epäselektiivisiä tulehduskipulääkkeitä vähemmän. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenvuotoa lisäävien lääkkeiden kanssa. Tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	30.11.2017
<b>Seliprololi</b> C07AB08		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sydämen johtorasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	19.12.2014
<b>Sennaglykosidit</b> A06AB06		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa käytössä suolilaman riski.	13.5.2013
<b>Sennaglykosidin yhdistelmävalmisteet</b> A06AB56	<i>senna</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa käytössä suolilaman riski.	12.3.2014
	<i>muut ainesosat</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	12.3.2014
<b>Sertindoli</b> N05AE03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	22.5.2017
<b>Sertraliini</b> N06AB06		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat hyponatremia ja verenvuotoriskin lisääntyminen. Altistaa kaatumisille. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	22.5.2017
<b>Setiritsiini</b> R06AE07		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi aiheuttaa väsymystä.	23.2.2015
<b>Siklesonidi</b> (keuhkoihin) R03BA08		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pitkäaikainen, suuriannoksinen käyttö voi aiheuttaa systeemisiä vaikutuksia. Muistuta suun huuhtomisesta lääkkeenoton jälkeen. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin tiettyjen sienilääkkeiden kanssa.	23.2.2015
<b>Sildenafilii</b> G04BE03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Pienennä annosta jo lievässä maksan vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat hypotensio, ortostaattinen hypotensio, päänsärky ja näköhäiriöt. Huomioi yhteisvaikutus nitraattien ja alfa-salpaajien kanssa.	3.6.2014
<b>Silikonit</b> A03AX13		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	12.3.2014
<b>Simvastatiini</b> C10AA01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Lihaskivut ja lihasheikkous mahdollisia haittoja. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	8.1.2015

Simvastatiini ja etsetimibi C10BA02	<i>simvastatiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Lihaskivut ja lihasheikkous mahdollisia haittoja. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	8.1.2015
	<i>etsetimibi</i>	<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.</b>	8.1.2015
Siprofloksasiini J01MA02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi aiheuttaa huimausta hoidon alkuvaiheessa. Lisää riskiä jännetulehdukselle. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset. Huomioi muut yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin ja sulfonyyliureoiden kanssa.	15.9.2014
Sitagliptiini A10BH01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Ei sovellu maksan vajaatoimintapotilaille. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä.	7.4.2014
Sitalopraami N06AB04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat hyponatremia ja verenvuotoriskin lisääntyminen. Altistaa kaatumisille. Huomioi yhteisvaikutukset.	25.10.2017
Skopolamiini A04AD01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	13.5.2013
Solifenasiini G04BD08		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	13.5.2013
Sotaloli C07AA07		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Epäselektiivinen beetasalpaaja. Käyttö edellyttää erikoislääkärin arviota. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	19.12.2014
Spironolaktoni C03DA01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi hyperkalemian riski.	19.12.2014
Strontium- ranelaatti M05BX03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Huomioi sydän- ja verisuonitapahtumien lisääntynyt riski, erityisesti valtimo- ja laskimotukokset. Vakavat, harvinaiset ihoreaktiot mahdollisia.	27.2.2018
Sukralfaatti A02BX02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Vältä käyttöä munuaisten vajaatoiminnassa. Voi aiheuttaa neurologisia haittoja. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	13.5.2013

Sulfadiatsiini ja trimetopriimi J01EE02	<i>sulfadiatsiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille (suun kautta otettavat valmisteet).</b> QT-ajan pidentymisen riski. Pidennä annosväliä kolmen käyttöpäivän jälkeen keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutus varfariinin ja sulfonyyliureoiden kanssa. Voi voimistaa metotreksaatin vaikutusta.	18.8.2014
	<i>trimetopriimi</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille (suun kautta otettavat valmisteet).</b> QT-ajan pidentymisen riski. Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutus varfariinin kanssa.	18.8.2014
Sulfametoksatsoli ja trimetopriimi J01EE01	<i>sulfa- metoksatsoli</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille (suun kautta otettavat valmisteet).</b> QT-ajan pidentymisen riski. Pidennä annosväliä kolmen käyttöpäivän jälkeen keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutus varfariinin ja sulfonyyliureoiden kanssa. Voi voimistaa metotreksaatin vaikutusta.	18.8.2014
	<i>trimetopriimi</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille (suun kautta otettavat valmisteet).</b> QT-ajan pidentymisen riski. Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutus varfariinin kanssa.	18.8.2014
Sulfasalatsiini A07EC01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.	7.4.2014
Sulpiridi N05AL01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Arvioi lääkehoidon tarve säännöllisesti. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio ja sydän ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia.	22.5.2017
Sumatriptaani N02CC01		<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.</b> Huomioi sydämeen ja verenkiertoelimistöön kohdistuvat haitat. Ei tietoa munuaisten vajaatoiminnan vaikutuksista annostukseen.	28.5.2018
Syanokobalamiini B03BA01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	19.5.2014
Syklitsiini R06AE03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat sekavuus, väsymys, suun kuivuminen, ummetus, huimaus, palpitaatio, virtsaamisvaikeudet ja alttius kaatumisille. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	23.2.2015
Tadalafiili G04BE08		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Pienennä annostajo lievässä maksan vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat hypotensio, ortostaattinen hypotensio, päänsärky ja näköhäiriöt. Huomioi yhteisvaikutus nitraattien ja alfa-salpaajien kanssa. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	3.6.2014
Tafluprosti (silmään) S01EE05		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hoidon aloitus ja käyttö silmälääkärin valvonnassa. Saattaa aiheuttaa silmän värikalvon pigmenttimuutoksia ja ripsien kasvua.	26.10.2017
Tamsulosiini G04CA02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat ortostaattinen hypotensio, huimaus ja alttius kaatumisille. Huomioi yhteisvaikutukset verenpainelääkkeiden kanssa.	3.6.2014



<b>Telitromysiini</b> J01FA15		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Runsaasti potentiaalisesti vaarallisia yhteisvaikutuksia.	18.8.2014
<b>Telmisartaani</b> C09CA07		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
<b>Telmisartaani ja hydroklooritiatsidi</b> C09DA07	<i>telmisartaani</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	<i>hydroklooritiatsidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	8.1.2015
<b>Tematsepaami</b> N05CD07		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, muistihäiriöt ja alttius liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta. Unettomuuden ja käytöshäiriöiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia.	22.5.2017
<b>Teofylliini</b> R03DA04		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Kapea terapeuttinen leveys. Seuraa lääkepitoisuutta. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat mahasuolikanavan oireet, levottomuus, takykardia ja huimaus. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Tupakointi heikentää lääkkeen vaikutusta.	23.2.2015
<b>Teofylliini ja quaifenesiini</b> R03DA54	<i>teofylliini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Kapea terapeuttinen leveys. Seuraa lääkepitoisuutta. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat mahasuolikanavan oireet, levottomuus, takykardia ja huimaus. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Tupakointi heikentää lääkkeen vaikutusta.	25.2.2015
	<i>quaifenesiini</i>	<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.</b>	25.2.2015
<b>Terbinafiini</b> (suun kautta) D01BA02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Heikentää kodeiinin vaikutusta ja nostaa CYP2D6:n kautta metaboloituvien psykelääkkeiden pitoisuuksia.	7.4.2014
<b>Terbinafiini</b> (iholle) D01AE15		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Käyttöohjeen mukaisesti iholle käytettynä systeeminen imeytyminen vähäistä.	7.4.2014
<b>Terbutaliini</b> (keuhkoihin) R03AC03		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Lisää sympatomiteettistä vaikutusta. Voi aiheuttaa hypokalemiaa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sympatomimeettisten aineiden kanssa.	23.2.2015
<b>Testosteroni</b> G03BA03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Käyttöä voi harkita kohtalaisessa tai vaikeassa hypogonadismissa. Älä käytä eturauhassyövässä. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat kohonnut verenpaine ja psyykkiset häiriöt. Huomioi yhteisvaikutukset.	20.6.2013
<b>Tetrasykliini</b> J01AA07		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vältä käyttöä jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Kalsium, rauta, magnesium ja alumiini vähentävät imeytymistä. Vältettävä altistusta auringonvalolle.	18.8.2014
<b>Tiboloni</b> G03CX01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.	3.6.2014

<b>Tikagrelori</b> B01AC24		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Merkittävä haittavaikutus verenvuotoriskin lisääntyminen. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	20.10.2014
<b>Timololi</b> (silmään) S01ED01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Hoidon aloitus ja käyttö silmälääkärin valvonnassa. Vasta-aihe toinen beetasalpaaja. Huomioi yhteisvaikutukset.	26.10.2017
<b>Timololi ja brintsolamidi/ bimatoprosti/ brimonidiini/ dortsolamidi/ travoprosti/ pilokarpiini/ latanoprosti/ tafluprosti</b> (silmään) S01ED51	<i>timololi</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Hoidon aloitus ja käyttö silmälääkärin valvonnassa. Vasta-aihe toinen beetasalpaaja. Huomioi yhteisvaikutukset.	26.10.2017
	<i>brintsolamidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hoidon aloitus ja käyttö silmälääkärin valvonnassa. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.	26.10.2017
	<i>bimatoprosti</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hoidon aloitus ja käyttö silmälääkärin valvonnassa. Saattaa aiheuttaa silmän värikalvon pigmenttimuutoksia ja ripsien kasvua.	26.10.2017
	<i>brimonidiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Hoidon aloitus ja käyttö silmälääkärin valvonnassa.	26.10.2017
	<i>dortsolamidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hoidon aloitus ja käyttö silmälääkärin valvonnassa. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.	26.10.2017
	<i>travoprosti</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hoidon aloitus ja käyttö silmälääkärin valvonnassa. Saattaa aiheuttaa silmän värikalvon pigmenttimuutoksia ja ripsien kasvua.	26.10.2017
	<i>pilokarpiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Hoidon aloitus ja käyttö silmälääkärin valvonnassa.	26.10.2017
	<i>latanoprosti</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hoidon aloitus ja käyttö silmälääkärin valvonnassa. Saattaa aiheuttaa silmän värikalvon pigmenttimuutoksia ja ripsien kasvua.	26.10.2017
<i>tafluprosti</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hoidon aloitus ja käyttö silmälääkärin valvonnassa. Saattaa aiheuttaa silmän värikalvon pigmenttimuutoksia ja ripsien kasvua.	26.10.2017	
<b>Tiokonatsoli</b> (iholle) D01AC07		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
<b>Tiokonatsoli</b> G01AF08		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	3.6.2014
<b>Tiotropiumbromidi</b> (keuhkoihin) R03BB04		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Huomioi yhteisvaikutukset.	23.2.2015
<b>Titsanidiini</b> M03BX02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Annostelee vain kerran vuorokaudessa vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat matala verenpaine, väsymys ja kääntyvien kärkien takykardia. Huomioi yhteisvaikutukset.	11.4.2018
<b>Tolfenaamihappo</b> M01AG02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Voi heikentää munuaisten toimintaa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi nostaa verenpainetta ja pahentaa sydämen vajaatoimintaa sekä aiheuttaa sydän- ja verisuonitapahtumia. Lisää ruuansulatuskanavan vuotoriskiä. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenvuotoa lisäävien lääkkeiden kanssa. Tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	30.11.2017

<b>Tolterodiini</b> G04BD07		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, virtsaamisvaikeudet, sekavuus, muistihäiriöt ja QTc-ajan pidentyminen ja kääntyvien kärkien takykardia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	13.5.2013
<b>Topiramaatti</b> N03AX11		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Hoidon aloitus ja käyttö erikoislääkärin valvonnassa. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Käytettävä varoen potilaille, joilla on maksan toiminnan häiriöitä. Runsaasti keskushermostoon kohdistuvia haittavaikutuksia.	15.9.2014
<b>Tramadoli</b> N02AX02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Serotonerginen. Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi haittavaikutukset, kuten sekavuus ja painajaisunet. Lisää vuotoriskiä. Huomioi yhteisvaikutukset, kuten serotoniinisyndrooman riski ja tehon väheneminen. Aloita laksatiivi ummetuksen ehkäisyyn.	25.10.2017
<b>Tramadoli ja parasetamoli</b> N02AJ13	<i>tramadoli</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Serotonerginen. Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi haittavaikutukset, kuten sekavuus ja painajaisunet. Lisää vuotoriskiä. Huomioi yhteisvaikutukset, kuten serotoniinisyndrooman riski ja tehon väheneminen. Aloita laksatiivi ummetuksen ehkäisyyn.	25.10.2017
	<i>parasetamoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Säännöllisessä käytössä korkeintaan 3 grammaa vuorokaudessa. Huomioi itsehoito- ja yhdistelmävalmisteiden sisältämä parasetamoli. Yliannoksena maksatoksinen. Yhteiskäyttö varfariinin kanssa mahdollista seuraamalla INR-arvoja.	25.10.2017
<b>Traneksaamihappo</b> B02AA02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Eliminaatio vähenee jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa.	19.5.2014
<b>Tratsodoni</b> N06AX05		<b>D</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Harkitse ensisijaisesti muuta masennuslääkettä. Altistaa kaatumisille. Huomioi merkittävät yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	25.10.2017
<b>Travoprosti</b> (silmään) S01EE04		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hoidon aloitus ja käyttö silmälääkärin valvonnassa. Saattaa aiheuttaa silmän värikalvon pigmenttimuutoksia ja ripsien kasvua.	26.10.2017
<b>Triamsinoloni</b> R01AD11		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	8.1.2015
<b>Triatsolaami</b> N05CD05		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Lyhytvaikutteinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, rebound-unettomuus, amnesia, muistihäiriöt sekä alttius liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	22.5.2017
<b>Trimetopriimi</b> J01EA01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Vasta-aiheinen vaikeassa maksan vajaatoiminnassa. Huomioi virtsatieinfektioiden hoitosuosituksen linjaukset. Huomioi mikrobilääkeresistenssi.	28.5.2018

<b>Trimipramiini</b> N06AA06		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat sekavuus, muistihäiriöt, vapina, rytmihäiriöt, takykardia, ortostaattinen hypotensio, serotoniinisyndrooma. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Trospium</b> G04BD09		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, virtsaamisvaikeudet, sekavuus, muistihäiriöt ja QTc-ajan pidentyminen ja kääntyvien kärkien takykardia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	13.5.2013
<b>Tsafirlukasti</b> R03DC01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin ja fenytoidin kanssa.	23.2.2015
<b>Tsiprasidoni</b> N05AE04		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Tsofenopriili</b> C09AA15		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Merkittävä haittavaikutus ortostaattinen hypotensio etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
<b>Tsolpideemi</b> N05CF02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, muistihäiriöt ja alttius liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Unettomuuden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia.	22.5.2017
<b>Tsopikloni</b> N05CF01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, muistihäiriöt ja alttius liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi aiheuttaa metallinmakua suuhun. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta. Unettomuuden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia.	22.5.2017
<b>Tsuklopentiksoli</b> N05AF05		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio, sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Ursodeoksikooli-happo</b> A05AA02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset. Seuraa maksa-arvoja.	12.3.2014
<b>Valasikloviiri</b> J05AB11		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutus teofylliinin kanssa.	18.8.2014

<b>Valasikloviiri</b> J05AB11		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutus teofylliinin kanssa.	18.8.2014
<b>Valeriaana</b> N05CM09		<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.</b>	22.5.2017
<b>Valproiinihappo</b> N03AG01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Matala seerumin albumiinipitoisuus voimistaa lääkevastetta. Runsaasti haittavaikutuksia kuten muutokset verenkuvassa ja maksavaurion riski.	15.9.2014
<b>Valsartaani</b> C09CA03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
<b>Valsartaani ja amlodipiini</b> C09DB01	<i>valsartaani</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	<i>amlodipiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	8.1.2015
<b>Valsartaani ja hydroklooritiatsidi</b> C09DA03	<i>valsartaani</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	<i>hydroklooritiatsidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	8.1.2015
<b>Valsartaani, amlodipiini ja hydroklooritiatsidi</b> C09DX01	<i>valsartaani</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	<i>amlodipiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	8.1.2015
	<i>hydroklooritiatsidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	8.1.2015
<b>Vardenafiili</b> G04BE09		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Vältä käyttöä vaikeassa maksan vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat hypotensio, ortostaattinen hypotensio, päänsärky ja näköhäiriöt. Huomioi yhteisvaikutus nitraattien ja alfa-salpaajien kanssa. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	3.6.2014
<b>Varfariini</b> B01AA03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Merkittävä haittavaikutus verenvuotoriskin lisääntyminen. Huomioi yhteisvaikutukset itsehoitolääkkeiden ja luontaistuotteiden kanssa. Yhteiskäyttö muiden verenhyytymiseen vaikuttavien valmisteiden kanssa vain erityistapauksissa. Huomioi mahdollinen kaatuilu ja pitkälle edennyt dementia.	19.5.2014
<b>Venlafaksiini</b> N06AX16		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Serotonerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat hyponatremia ja serotoniinisyndrooman riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset, etenkin verenvuotoriskiä lisäävien lääkkeiden kanssa. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutukset.	22.5.2017

Verapamiili C08DA01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat bradykardia, ummetus, sydämen vajaatoiminta ja turvotus. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin digoksiinin ja beetasalpaajien kanssa. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	13.5.2013
Vigabatriini N03AG04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat näkökenttäpuutokset, painon nousu, muistihäiriöt, masennus ja kiihtyneisyys.	15.9.2014
Vildagliptiini A10BH02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Ei sovellu maksan vajaatoimintapotilaille. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä.	7.4.2014
Vortioksetiini N06AX26		<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.</b> Voi aiheuttaa hyponatremiaa.	28.5.2018
Yskänlääke (sis. dekstro- metorfaani, efedriini, kodeiini + muut ainesosat R05FA02	<i>difen- hydramiini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat ummetus, virtsaretentio, muistihäiriöt ja sydämen rytmihäiriöt. Huomioi yhteisvaikutukset.	15.9.2014
	<i>efedriini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Älä käytä iskeemistä sydänsairautta sairastavilla. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat unettomuus, vapina, palpitaatio, verenpaineen kohoaminen ja virtsaretentio. Huomioi yhteisvaikutukset.	15.9.2014
	<i>dekstro- metorfaani</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Serotonerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat vapina, palpitaatio, päänsärky, pahoinvointi, ummetus, väsymys, huimaus ja alttius kaatumisille. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin memantiinin ja MAO-estäjien kanssa.	15.9.2014
	<i>kodeiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Heikko opioidi, jolle kehittyy toleranssi. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Osalla vaste normaalia heikompi tai voimakkaampi perinnöllisistä eroista johtuen. Huomioi yhteisvaikutukset, sillä useat lääkkeet heikentävät kodeiinin tehoa. Aloita laksatiivi ummetuksen ehkäisyyn.	15.9.2014
	<i>muut ainesosat</i>	<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.</b>	15.9.2014