

Lääkeaine ATC-koodi	Yhdistelmä- valmisteiden lääkeaineet	Luokittelu		Hyväksytty
<b>Algiinihappo</b> A02BX13 (sisältää alumiinia)	<i>algiinihappo</i> <i>kalsium</i> <i>natrium</i> <i>alumiini</i>	A	Sopii iäkkäille.	13.5.2013
		A	Sopii iäkkäille.	13.5.2013
		A	Sopii iäkkäille	13.5.2013
		D	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Ei sovi iäkkäiden antasidiksi. Vältä käyttöä jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Voi aiheuttaa neurologisia haittoja. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	13.5.2013
<b>Alpratsolaami</b> N05BA12		D	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, muistihäiriöt ja alttius liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.	22.5.2017
<b>Amiodaroni</b> C01BD01		D	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Käyttö vain vakavien rytmihäiriöiden hoitoon perehtyneen lääkärin aloittamana. Poistuu elimistöstä erittäin hitaasti. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat pleuriitti, keuhkofibroosi, kilpirauhasen vaja- tai liikatoiminta, maksan vajaatoiminta ja kääntyvien kärkien takykardia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	13.5.2013
<b>Amitriptyliini</b> N06AA09		D	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Käyttö mahdollista pienellä annoksella neuropaattisen kivun hoitoon. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat sekavuus, muistihäiriöt, vapina, rytmihäiriöt, takykardia, ortostaattinen hypotensio ja serotoniinisyndrooma. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Amitriptyliini ja psykykenlääke</b> N06CA01	<i>amitriptyliini</i>          <i>kloori-</i> <i>diatsepoksidi</i>	D	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Käyttö mahdollista pienellä annoksella neuropaattisen kivun hoitoon. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat sekavuus, muistihäiriöt, vapina, takykardia, ortostaattinen hypotensio, serotoniinisyndrooma. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	25.10.2017
		D	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, muistihäiriöt ja alttius liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.	25.10.2017

<b>Amitriptyliini ja psykykenlääke</b> N06CA01	<i>amitriptyliini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Käyttö mahdollista pienellä annoksella neuropaattisen kivun hoitoon. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat sekavuus, muistihäiriöt, vapina, takykardia, ortostaattinen hypotensio, serotoniinisyndrooma. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	25.10.2017
	<i>perfenatsiini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	25.10.2017
<b>Asetyyლისისყილი- happo</b> (kipulääke) N02BA01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat verenvuodot ja mahan limakalvovauriot. Voi heikentää verenpainetautiin ja sydämen vajaatoimintaan käytettävien lääkkeiden vaikutusta. Lisää metotreksaatin toksisuutta. Huomioi itsehoito- ja yhdistelmävalmisteiden sisältämä asetyylisalisyylihappo.	25.10.2017
<b>Asetyyლისისყილი- happo, C-vitamiini, kofiini, quaifenesiini</b> N02BA51	<i>asetyyli- salisyylihappo</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Pienennä annosta keskivaikeassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat verenvuodot ja mahan limakalvovauriot. Voi heikentää verenpainetautiin ja sydämen vajaatoimintaan käytettävien lääkkeiden vaikutusta. Lisää metotreksaatin toksisuutta. Huomioi itsehoito- ja yhdistelmävalmisteiden sisältämä asetyylisalisyylihappo.	25.10.2017
	<i>C-vitamiini kofiini quaifenesiini</i>	<b>A</b> <b>A</b> <b>B</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> <b>Sopii iäkkäille.</b> <b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.</b>	25.10.2017 25.10.2017 25.10.2017
<b>Asetyyლისისყილი- happo ja dipyridamoni/ klopidogreeli</b> B01AC30	<i>asetyyლისისყილი- syylihappo</i>	<b>D</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Merkittävä haittavaikutus verenvuotoriskin lisääntyminen. Soveltuu käytettäväksi pienellä annoksella (=100 mg/vrk) valtimotaudin sekundaaripreventiossa.	19.5.2014
	<i>dipyridamoli</i>	<b>C</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Huomioi haittavaikutukset, kuten angina pectoris -oireet ja huimaus. Lääkkeen teho yksinään (ilman asetyylisalisyylihappoa) on vaatimaton.	19.5.2014
	<i>klopidogreeli</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Aihiolääke. Merkittävä haittavaikutus verenvuotoriskin lisääntyminen, erityisesti huonokuntoisilla ja munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavilla. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	19.5.2014
<b>Baklofeeni</b> M03BX01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat väsymys, sekavuus, masennus, painajaisunet, lihasheikkous, matala verenpaine ja alttius kaatumisille. Voi lisätä muiden samanaikaisesti käytettävien keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden sedatiivista vaikutusta.	11.4.2018
<b>Biperideeni</b> N04AA02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	10.6.2013

<b>Bisakodyyli</b> A06AG02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa käytössä suolilaman riski.	13.5.2013
<b>Bromokriptiini</b> N04BC01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Serotonerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat psykoosi, ortostaattinen hypotensio, pleuriitti, fibroosi keuhkoissa/sydänlöpissä/mahassa ja impulssikontrollihäiriöt kuten peliriippuvuus ja hyperseksuaalisuus. Huomioi yhteisvaikutukset dopamiinantagonistien kuten antipsyykoottien kanssa.	10.6.2013
<b>Butyyli- skopolamiini</b> A03BB01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	13.5.2013
<b>Darifenasiini</b> G04BD10		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	13.5.2013
<b>Dekstrometorfaani</b> R05DA09		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Serotonerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat vapina, palpitaatio, päänsärky, pahoinvointi, ummetus, väsymys, huimaus ja alttius kaatumisille. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin memantiinin ja MAO-estäjien kanssa.	15.9.2014
<b>Diatsepaami</b> N05BA01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, muistihäiriöt ja alttius liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	22.5.2017
<b>Diltiatseemi</b> C08DB01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Käytä vain erityistapauksissa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat ummetus, bradykardia ja turvotus. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset, etenkin digoksiinin ja beetasalpaajien kanssa. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	13.5.2013
<b>Dipyridamoli</b> B01AC07		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Huomioi haittavaikutukset, kuten angina pectoris -oireet ja huimaus. Lääkkeen teho yksinään (ilman asetyylisalisyylihappoa) on vaatimaton.	3.6.2014
<b>Doksepiini</b> N06AA12		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat sekavuus, muistihäiriöt, vapina, rytmihäiriöt, takykardia, ortostaattinen hypotensio ja serotoniinisyndrooma. Altistaa kaatumisille. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Dronedaroni</b> C01BD07		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Hoidon aloitus ja käyttö erikoislääkärin valvonnassa. Älä käytä pysyvässä eteisvärinässä, sydämen vajaatoiminnassa tai vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittävä haittavaikutus käänntyvien kärkien takykardia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	20.6.2013

<b>Drospirenoni ja estrogeeni</b> G03FA17	<i>drospirenoni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä systeemistä käyttöä iäkkäillä.</b> Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.	3.6.2014
	<i>estrogeeni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.	3.6.2014
<b>Dydrogesteroni ja estrogeeni</b> G03FA14 G03FB08	<i>dydrogesteroni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.	3.6.2014
	<i>estrogeeni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.	3.6.2014
<b>Estradioli</b> G03CA03		<b>D</b>	<b>Vältä systeemistä käyttöä iäkkäillä (luokka D).</b> <b>Sopii iäkkäille naisille paikallishoitoon (luokka A).</b> Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.	3.6.2014
<b>Estrioli</b> G03CA04		<b>D</b>	<b>Vältä systeemistä käyttöä iäkkäillä (luokka D).</b> <b>Sopii iäkkäille naisille paikallishoitoon (luokka A).</b> Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.	3.6.2014
<b>Etyylimorfiini</b> R05DA01	<i>etyylimorfiini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat ummetus, väsymys, pahoinvointi, virtsaamisvaikeus, sappiongelmia ja alttius kaatumisille. Huomioi yhteisvaikutukset, erityisesti antitussiivista tehoa heikentävien lääkkeiden kanssa.	23.2.2015
	<i>muut ainesosat</i>	<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.</b>	23.2.2015
<b>Famotidiini, magnesium ja kalsium</b> A02BA53	<i>magnesium</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Ei sovi iäkkäiden antasidiksi. Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	12.3.2014
	<i>famotidiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Iäkkäät ovat alttiita harvinaisille haittavaikutuksille, kuten päänsärylle, huimaukselle, mahasuolikanavan oireille ja sekavuudelle.	12.3.2014
	<i>kalsiumkarbonaatti</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013

<b>Fenytioini</b> N03AB02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Hoidon aloitus erikoislääkärin valvonnassa. Kapea terapeuttilinen leveys. Pitoisuuden nousu vaikeasti ennakoitavissa. Seuraa lääkepitoisuutta. Matala seerumin albumiinipitoisuus voimistaa lääkevastetta. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat väsymys, huimaus, ienhyperplasia, osteomalasia, maksatoksisuus ja muutokset verenkuvassa. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	10.6.2013
<b>Fenyyli-propanoliamiini</b> R01BA01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat hermostuneisuus, unettomuus, uneliaisuus, suun kuivuminen ja verenpaineen kohoaminen. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	23.2.2015
<b>Fesoterodiini</b> G04BD11		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	13.5.2013
<b>Flekainidi</b> C01BC04		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Hoidon aloitus erikoislääkärin valvonnassa. Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittävä haittavaikutus on kääntyvien kärkien takykardia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	20.6.2013
<b>Fluoksetiini</b> N06AB03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Hyvin pitkävaikutteinen SSRI-lääke, jonka vaikutus kestää viikkoja. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat unettomuus, päänsärky, huimaus, pahoinvointi, takykardia, näköhäiriöt ja hyponatremia. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset, etenkin verenvuotoriskiä lisäävien lääkkeiden kanssa.	22.5.2017
<b>Flupentiksoli</b> N05AF01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Fluvoksamiini</b> N06AB08		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat unettomuus, päänsärky, huimaus, pahoinvointi, takykardia ja hyponatremia. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset, etenkin verenvuotoriskiä lisäävien lääkkeiden kanssa.	22.5.2017
<b>Glimepiridi</b> A10BB12		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Pitkävaikutteinen sulfonyyliurea. Munuaisten ja maksan toiminnan heikentyessä haittojen riski kasvaa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutukset. Huomioi pitkittyneen hypoglykemian vaara.	7.4.2014
<b>Haloperidoli</b> N05AD01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia.	22.5.2017

<b>Hydroksitsiini</b> N05BB01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. QT-ajan pidentymisen riski. Pitkävaikutteinen. Älä käytä uni- tai rauhoittavana lääkkeenä. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat huimaus, takykardia, sekavuus ja muistihäiriöt. Altistaa kaatumisille. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Indometasiini</b> M01AB01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi keskushermostohaitat, kuten psykoosi. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat maha-suolikanavan verenvuodon riski, munuaisten vajaatoiminnan paheneminen, kohonnut verenpaine ja sydämen vajaatoiminta. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin muiden verenvuotoriskiä lisäävien lääkkeiden kanssa.	30.11.2017
<b>Kabergoliini</b> N04BC06		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat psykoosi, ortostaattinen hypotensio, pleuriitti, fibroosi keuhkoissa/sydänläpissä sekä impulssikontrollihäiriöt kuten peliriippuvuus ja hyperseksuaalisuus. Huomioi yhteisvaikutukset dopamiiniantagonistien kuten antipsyykoottien kanssa.	10.6.2013
<b>Kaliumkloridi ja magnesium</b> A12BA51	<i>kaliumkloridi</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi hyperkalemian riski munuaisten vajaatoimintapotilailla. Seuraa kaliumpitoisuutta. Huomioi yhteisvaikutukset kaliumtasapainoon vaikuttavien verenpainelääkkeiden kanssa.	7.4.2014
	<i>magnesium</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	7.4.2014
<b>Klaritromysiini</b> J01FA09		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Runsaasti potentiaalisesti vaarallisia yhteisvaikutuksia.	18.8.2014
<b>Klidiini ja klooridiatsepoksiidi</b> A03CA02	<i>klidiini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat kognition heikkeneminen ja ortostaattinen hypotensio. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	13.5.2013
	<i>klooridiatsepoksiidi</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen bentsodiatsepiini, jolle kehittyä toleranssi. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, väsymys, muistihäiriöt sekä alttius kaatumisille ja liikenneonnettomuuksille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.	13.5.2013
<b>Klobatsaami</b> N05BA09		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, muistihäiriöt ja alttius liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.	22.5.2017
<b>Klomipramiini</b> N06AA04		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat sekavuus, muistihäiriöt, vapina, rytmihäiriöt, takykardia, ortostaattinen hypotensio ja serotoniinisyndrooma. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017

<b>Klonatsepaami</b> N03AE01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen bentsodiatsepiini, jolle kehittyä toleranssi. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, väsymys, muistihäiriöt sekä alttius kaatumisille ja liikenneonnettomuuksille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.	10.6.2013
<b>Klonidiini</b> C02AC01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat päänsärky, huimaus, uneliaisuus, ortostaattinen hypotensio ja bradykardia. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin beetasalpaajien kanssa.	13.5.2013
<b>Klooridiatse-poksidi</b> N05BA02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, muistihäiriöt ja alttius liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.	22.5.2017
<b>Klooriprotikseeni</b> N05AF03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio, sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Klotsapiini</b> N05AH02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. QT-ajan pidentymisen riski. Vain psykoosin hoitoon. Noudata käytössä viranomaisten hyväksymiä turvallisuusohjeita. Huomioi erityisesti verenkuvan seuranta. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio, sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Tupakointi heikentää lääkkeen vaikutusta. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Lansopratsoli, amoksisilliini ja klaritromysiini</b> A02BD07	<i>lansopratsoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Käytön tarpeellisuus arvioitava säännöllisesti. Pitkäaikaiskäytössä voi heikentää kalsiumin ja B12-vitamiinin imeytymistä. Enterorakenteen rikkominen vie lääkkeen tehon.	12.3.2014
	<i>amoksisilliini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pidennä annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi voimistaa metotreksaatin vaikutusta.	12.3.2014
	<i>klaritromysiini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä (suun kautta otettavat valmisteet).</b> QT-ajan pidentymisen riski. Runsaasti potentiaalisesti vaarallisia yhteisvaikutuksia.	12.3.2014
<b>Levomepromatsiini</b> N05AA02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Litium</b> N05AN01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Kapea terapeutinen leveys. Seuraa lääke- ja natriumpitoisuutta plasmassa. Älä käytä munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat vapina, pahoinvointi, ripuli, lihasheikkous, ataksia ja häiriöt kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasen toiminnassa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin tulehduskipulääkkeiden, ACE-estäjien ja diureettien kanssa.	22.5.2017

<b>Magnesium</b> (suspensio) A02AA04		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Ei sovi iäkkäiden laksatiiviksi eikä antasidiksi, käytä turvallisempia vaihtoehtoja. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	13.1.2014
<b>Magnesium</b> (suun kautta) G04BX01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	3.6.2014
<b>Magnesium ja kalsium</b> A02AD01	<i>magnesium</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Ei sovi iäkkäiden antasidiksi. Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	13.5.2013
	<i>kalsium</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
<b>Medroksi-progesteroni ja estrogeeni</b> G03FA12 G03FB06	<i>medroksi-progesteroni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.	3.6.2014
	<i>estrogeeni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä systeemistä käyttöä iäkkäillä.</b> Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.	3.6.2014
<b>Meklotsiini</b> R06AE05		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus, muistihäiriöt, väsymys, ortostaattinen hypotensio ja alttius kaatumisille. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	23.2.2015
<b>Metadoni</b> N07BC02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Opioidi, jonka vaikutus iäkkäillä on erityisen pitkä. Huomioi yhteisvaikutukset.	25.10.2017
<b>Metoklopramidi</b> A03FA01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat ekstrapyramidaalioireet ja sekavuus. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin antipsykoottien ja dopamiiniagonistien kuten levodopan kanssa.	13.5.2013
<b>Midatsolaami</b> N05CD08		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Lyhytvaikutteinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, rebound-unettomuus, amnesia, muistihäiriöt sekä alttius liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	22.5.2017
<b>Moklobemidi</b> N06AG02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Serotonerginen. Harkitse ensisijaisesti muita masennuslääkkeitä. Altistaa kaatumisille. Huomioi yhteisvaikutukset. Pitkä siirtymäaika tarpeen masennuslääkettä vaihdettaessa.	25.10.2017
<b>Moksonidiini</b> C02AC05		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat päänsärky, uneliaisuus ja unihäiriöt. Vahvistaa keskushermoston toimintaa lamaavien lääkkeiden vaikutusta. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin beetasalpaajien kanssa.	13.5.2013
<b>Natrium-pikosulfaatti</b> A06AB08		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa käytössä suolilaman riski.	13.5.2013



Natrium-pikosulfaatti, magnesium ja sitruunahappo A06AB58	<i>natrium-pikosulfaatti</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa käytössä suolilaman riski.	13.5.2013
	<i>magnesium</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Ei sovi iäkkäiden antasidiksi. Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	13.5.2013
	<i>sitruunahappo</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
Nitratsepaami N05CD02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, muistihäiriöt ja alttius liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.	22.5.2017
Nitrofurantoiini J01XE01	<i>nitrofurantoiini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Älä käytä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat keuhkomuutokset ja perifeerinen neuropatia. Huomioi mikrobilääkeresistenssi.	28.5.2018
	<i>C-vitamiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	28.5.2018
Noretisteroni ja estrogeeni G03FA01, G03FB05	<i>noretisteroni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä systeemistä käyttöä iäkkäillä.</b> Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.	3.6.2014
	<i>estrogeeni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä systeemistä käyttöä iäkkäillä.</b> Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.	3.6.2014
Nortriptyliini N06AA10		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Käyttö mahdollista pienellä annoksella neuropaattisen kivun hoitoon. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat sekavuus, muistihäiriöt, vapina, rytmihäiriöt, takykardia, ortostaattinen hypotensio, serotoniinisyndrooma. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
Oksibutiini G04BD04		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	13.5.2013
Orfenadriini M03BC01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	30.11.2017
Orfenadriini ja parasetamoli M03BC51	<i>orfenadriini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	30.11.2017
	<i>parasetamoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Säännöllisessä käytössä korkeintaan 3 grammaa vuorokaudessa. Huomioi itsehoito- ja yhdistelmävalmisteiden sisältämä parasetamoli. Yliannoksena maksatoksinen. Yhteiskäyttö varfariinin kanssa mahdollista seuraamalla INR-arvoja.	30.11.2017

<b>Paroksetiini</b> N06AB05		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Harkitse ensisijaisesti muita SSRI-ryhmän lääkkeitä. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat hyponatremia ja verenvuotoriskin lisääntyminen. Altistaa kaatumisille. Huomioi merkittävät yhteisvaikutukset.	25.10.2017
<b>Pentoksifylliini</b> C04AD03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Pidennä annosväliä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Teho on vaatimaton ja lääkkeellä on paljon haittavaikutuksia.	13.5.2013
<b>Perfenatsiini</b> N05AB03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Perisiatsiini</b> N05AC01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Pindololi</b> C07AA03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Epäselektiivinen beetasalpaaja. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat unihäiriöt, masennus ja lihasheikkous. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	13.5.2013
<b>Pitofenoni ja metamitsoli</b> A03DA02	<i>pitofenoni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	13.5.2013
	<i>metamitsoli</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Epäselektiivinen tulehduskipulääke, jolla on havaittu tavanomaisten tulehduskipulääkkeiden haittavaikutusten lisäksi luuydinsuppressiota ja agranulosytoosia. Poistuminen hidastunut munuaisten vajaatoiminnassa.	13.5.2013
<b>Pratsosiini</b> C02CA01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat ortostaattinen hypotensio, huimaus, väsymys ja näköhäiriöt.	13.5.2013
<b>Pregabaliini</b> N03AX16		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Voi pidentää QTc-aikaa. Huomioi erityisesti keskushermostoon kohdistuvat haittavaikutukset. Riippuvuuden kehittyminen mahdollista. Käyttö lopetettava asteittain.	15.9.2014
<b>Proklooriperatsiini</b> N05AB04		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Propranololi</b> C07AA05		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Epäselektiivinen beetasalpaaja. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat unihäiriöt, masennus ja lihasheikkous. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	13.5.2013

Pseudoefedriini ja setiritsiini/ akrivastiini/ desloratadiini R01BA52	<i>pseudo-efedriini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Tarvittaessa vain lyhytaikaiseen käyttöön (<10 vrk). Pidentää annosväliä jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Lisää sympatomeettista vaikutusta. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin MAO-estäjien ja sympatomeettisten aineiden kanssa.	23.2.2015
	<i>setiritsiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.	23.2.2015
	<i>desloratadiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi aiheuttaa väsymystä.	23.2.2015
	<i>akrivastiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi aiheuttaa väsymystä.	23.2.2015
Repaglinidi A10BX02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	7.4.2014
Sennaglykosidit A06AB06		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa käytössä suolilaman riski.	13.5.2013
Sennaglykosidin yhdistelmävalmisteet A06AB56	<i>senna</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa käytössä suolilaman riski.	12.3.2014
	<i>muut ainesosat</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	12.3.2014
Sertindoli N05AE03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käyttöoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	22.5.2017
Skopolamiini A04AD01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	13.5.2013
Solifenasiini G04BD08		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	13.5.2013
Sotaloli C07AA07		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Epäselektiivinen beetasalpaaja. Käyttö edellyttää erikoislääkärin arviota. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	19.12.2014
Strontium-ranelatti M05BX03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Huomioi sydän- ja verisuonitapahtumien lisääntynyt riski, erityisesti valtimo- ja laskimotukokset. Vakavat, harvinaiset ihoreaktiot mahdollisia.	27.2.2018
Sukralfaatti A02BX02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Vältä käyttöä munuaisten vajaatoiminnassa. Voi aiheuttaa neurologisia haittoja. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	13.5.2013

<b>Syklitsiini</b> R06AE03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat sekavuus, väsymys, suun kuivuminen, ummetus, huimaus, palpitaatio, virtsaamisvaikeudet ja alttius kaatumisille. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	23.2.2015
<b>Telitromysiini</b> J01FA15		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Runsaasti potentiaalisesti vaarallisia yhteisvaikutuksia.	18.8.2014
<b>Teofylliini</b> R03DA04		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Kapea terapeuttinen leveys. Seuraa lääkepitoisuutta. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat mahasuolikanavan oireet, levottomuus, takykardia ja huimaus. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Tupakointi heikentää lääkkeen vaikutusta.	23.2.2015
<b>Teofylliini ja quaifenesiini</b> R03DA54	<i>teofylliini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Kapea terapeuttinen leveys. Seuraa lääkepitoisuutta. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat mahasuolikanavan oireet, levottomuus, takykardia ja huimaus. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Tupakointi heikentää lääkkeen vaikutusta.	25.2.2015
	<i>quaifenesiini</i>	<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.</b>	25.2.2015
<b>Testosteroni</b> G03BA03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Käyttöä voi harkita kohtalaisessa tai vaikeassa hypogonadismissa. Älä käytä eturauhassyövässä. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat kohonnut verenpaine ja psyykkiset häiriöt. Huomioi yhteisvaikutukset.	20.6.2013
<b>Tiboloni</b> G03CX01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä. Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset.	3.6.2014
<b>Titsanidiini</b> M03BX02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> QT-ajan pidentymisen riski. Annostele vain kerran vuorokaudessa vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat matala verenpaine, väsymys ja kääntyvien kärkien takykardia. Huomioi yhteisvaikutukset.	11.4.2018
<b>Tolterodiini</b> G04BD07		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, virtsaamisvaikeudet, sekavuus, muistihäiriöt ja QTc-ajan pidentyminen ja kääntyvien kärkien takykardia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	13.5.2013
<b>Topiramaatti</b> N03AX11		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Hoidon aloitus ja käyttö erikoislääkärin valvonnassa. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Käytettävä varoen potilaille, joilla on maksan toiminnan häiriöitä. Runsaasti keskushermostoon kohdistuvia haittavaikutuksia.	15.9.2014
<b>Tratsodoni</b> N06AX05		<b>D</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Harkitse ensisijaisesti muuta masennuslääkettä. Altistaa kaatumisille. Huomioi merkittävät yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	25.10.2017
<b>Triatsolaami</b> N05CD05		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Lyhytvaikutteinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, rebound-unettomuus, amnesia, muistihäiriöt sekä alttius liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	22.5.2017

<b>Trimipramiini</b> N06AA06		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat sekavuus, muistihäiriöt, vapina, rytmihäiriöt, takykardia, ortostaattinen hypotensio, serotoniinisyndrooma. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Trospium</b> G04BD09		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, virtsaamisvaikeudet, sekavuus, muistihäiriöt ja QTc-ajan pidentyminen ja kääntyvien kärkien takykardia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	13.5.2013
<b>Tsiprasidoni</b> N05AE04		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Serotonerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio ja sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Tsolpideemi</b> N05CF02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, muistihäiriöt ja alttius liikenneonnettomuuksille. Altistaa kaatumisille. Unettomuuden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia.	22.5.2017
<b>Tsuklopentiksolii</b> N05AF05		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat muistihäiriöt, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, ortostaattinen hypotensio, sydän- ja verenkiertotapahtumien riski. Altistaa kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	22.5.2017
<b>Verapamiili</b> C08DA01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Pienennä annosta keskivaikeassa ja vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat bradykardia, ummetus, sydämen vajaatoiminta ja turvotus. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin digoksiinin ja beetasalpaajien kanssa. Vältä greippimehun käyttöä hoidon aikana.	13.5.2013

<b>Yskänlääke (sis. dekstro- metorfaani, efedriini, kodeiini + muut ainesosat R05FA02</b>	<i>difen- hydramiini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. QT-ajan pidentymisen riski. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat ummetus, virtsaretentio, muistihäiriöt ja sydämen rytmihäiriöt. Huomioi yhteisvaikutukset.	15.9.2014
	<i>efedriini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Älä käytä iskeemistä sydänsairautta sairastavilla. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat unettomuus, vapina, palpitaatio, verenpaineen kohoaminen ja virtsaretentio. Huomioi yhteisvaikutukset.	15.9.2014
	<i>dekstro- metorfaani</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Serotonerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat vapina, palpitaatio, päänsärky, pahoinvointi, ummetus, väsymys, huimaus ja alttius kaatumisille. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin memantiinin ja MAO-estäjien kanssa.	15.9.2014
	<i>kodeiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Heikko opioidi, jolle kehittyy toleranssi. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Osalla vaste normaalia heikompi tai voimakkaampi perinnöllisistä eroista johtuen. Huomioi yhteisvaikutukset, sillä useat lääkkeet heikentävät kodeiinin tehoa. Aloita laksatiivi ummetuksen ehkäisyyn.	15.9.2014
	<i>muut ainesosat</i>	<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä iäkkäillä.</b>	15.9.2014