

Lääkeaine ATC-koodi	Yhdistelmä- valmisteiden lääkeaineet	Luokittelu		Hyväksytty
Akrivastiini R06AX18		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Voi aiheuttaa väsymystä. Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.	23.2.2015
Alendronaatti M05BA04		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Ei vuodepotilaille. Potilaan tulee pystyä ottamaan lääke riittävän vesimäärän kera ja olemaan puoli tuntia pystyasennossa lääkkeenoton jälkeen. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Käyttöaikausitus 5 vuotta. Huomioi yhteisvaikutukset kalsiumin, raudan, magnesiumin ja alumiinin kanssa.	10.11.2014
Alendronaatti ja kolekalsiferoli M05BB03	Alendronaatti	C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Ei vuodepotilaille. Potilaan tulee pystyä ottamaan lääke riittävän vesimäärän kera ja olemaan puoli tuntia pystyasennossa lääkkeenoton jälkeen. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Käyttöaikausitus 5 vuotta. Huomioi yhteisvaikutukset kalsiumin, raudan, magnesiumin ja alumiinin kanssa.	10.11.2014
	Kolekalsiferoli	A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Tarve vähintään 20 µg/vrk (800ky/vrk) ympärivuotisesti.	10.11.2014
Alfakalsidoli A11CC03		A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Tarve vähintään 20 µg/vrk (800 ky/vrk) ympärivuotisesti.	7.4.2014
Alfutsosiini G04CA01		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi haittavaikutukset, kuten huimaus, ortostaattinen hypotensio ja kaatumisriski. Huomioi yhteisvaikutukset verenpainetta alentavien lääkkeiden kanssa.	3.6.2014
Algiinihappo A02BX13 (ei sisällä alumiinia)	Algiinihappo	A	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
	Kalsium	A	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
	Natrium	A	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
Algiinihappo A02BX13 (sisältää alumiinia)	Algiinihappo	A	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
	Kalsium	A	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
	Natrium	A	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
	Alumiini	D	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Voi aiheuttaa neurologisia haittoja. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	13.5.2013
Allopurinoli M04AA01		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi vaarallinen yhteisvaikutus atsatiopriinin kanssa.	10.11.2014

<b>Alpratsolaami</b> N05BA12		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen bentsodiatsepiini, jolle kehittyä toleranssi. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, väsymys, muistihäiriöt sekä alttius kaatumisille ja liikenneonnettomuuksille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.	13.3.2015
<b>Alprostadiili</b> G04BE01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	3.6.2014
<b>Ambroksoli</b> R05CB06		<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.</b>	23.2.2015
<b>Amiodaroni</b> C01BD01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Käyttö vain vakavien rytmihäiriöiden hoitoon perehtyneen lääkärin aloittamana. Poistuu elimistöstä erittäin hitaasti. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat pleuriitti, keuhkofibroosi, kilpirauhasen vaja- tai liikatoiminta, maksan vajaatoiminta, QTc-ajan pidentyminen ja sen myötä kääntyvien kärkien takykardia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	13.5.2013
<b>Amitriptyliini</b> N06AA09		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, virtsaamisvaikeudet, sekavuus, muistihäiriöt, väsymys, vapina, takykardia, ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan pidentyminen, serotoniinisyndrooma ja alttius kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa. Käyttö mahdollista pienellä annoksella neuropaattisen kivun hoidossa.	10.6.2013
<b>Amitriptyliini ja kloridiatsepoksidi</b> N06CA01	<i>Amitriptyliini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, virtsaamisvaikeudet, sekavuus, muistihäiriöt, väsymys, vapina, takykardia, ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan pidentyminen, serotoniinisyndrooma ja alttius kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa. Käyttö mahdollista pienellä annoksella neuropaattisen kivun hoidossa.	10.6.2013
	<i>Klooridiatsepoksidi</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, väsymys, muistihäiriöt sekä alttius kaatumisille ja liikenneonnettomuuksille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.	10.6.2013

<b>Amitriptyliini ja perfenatsiini</b> N06CA01	<i>Amitriptyliini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, virtsaamisvaikeudet, sekavuus, muistihäiriöt, väsymys, vapina, takykardia, ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan pidentyminen, serotoniinisyndrooma ja alttius kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa. Käyttö mahdollista pienellä annoksella neuropaattisen kivun hoidossa.	10.6.2013
	<i>Perfenatsiini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, virtsaamisvaikeudet, muistihäiriöt, väsymys, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, takykardia, ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan pidentyminen, riski sydän- ja verenkiertotapahtumille ja alttius kaatumisille. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	10.6.2013
<b>Amlodipiini</b> C08CA01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	19.12.2014
<b>Amoksisilliini</b> J01CA04		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Annosväliä pidennettävä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi voimistaa metotreksaatin vaikutusta.	18.8.2014
<b>Amoksisilliini ja klavulaanihappo</b> J01CR02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Annosväliä pidennettävä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi voimistaa metotreksaatin vaikutusta.	18.8.2014
<b>Apiksabaani</b> B01AF02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä. Annosta pienennettävä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittävin haittavaikutus verenvuotoriskin lisääntyminen. Huomioi yhteisvaikutukset. Ei tunnettua vastavaikuttajaa (antidoottia).	19.5.2014
<b>Aripipratsoli</b> N05AX12		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. Älä käytä dementiaan liittyvien käytöshäiriöiden hoidossa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, virtsaamisvaikeudet, muistihäiriöt, väsymys, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, takykardia, ortostaattinen hypotensio ja alttius kaatumisille. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana	20.6.2013

<b>Asebutololi</b> C07AB04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksena bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset, erityisesti sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	19.12.2014
<b>Asenapiini</b> N05AH05		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Älä käytä dementiaan liittyvien käytöshäiriöiden hoidossa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, virtsaamisvaikeudet, muistihäiriöt, väsymys, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, takykardia, ortostaattinen hypotensio ja alttius kaatumisille. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	20.6.2013
<b>Asetyylikysteiniini</b> R05CB01		<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.</b>	23.2.2015
<b>Asetyyლისისყილი- happo</b> (ns. mini-ASA) B01AC06		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Merkittävin haittavaikutus on verenvuotoriskin lisääntyminen. Soveltuu käytettäväksi pienellä annoksella (=100 mg/vrk) valtimotaudin sekundaaripreventiossa.	19.5.2014
<b>Asetyyლისისყილი- happo</b> (kipulääke) N02BA01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Älä käytä kipu-, kuume- tai flunssalääkkeenä. Soveltuu käytettäväksi pienellä annoksella antitromboottina. Pienennä annosta keskivaikessa munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat verenvuodot ja mahan limakalvovauriot. Voi heikentää verenpainetautiin ja sydämen vajaatoimintaan käytettävien lääkkeiden vaikutusta. Lisää metotreksaatin toksisuutta. Huomioi, että tulehduskipulääkkeitä käytetään runsaasti itsehoidossa.	10.6.2013
<b>Asetyyლისისყილი- happo, C-vitamiini, kofiini, quaifenesiini</b> N02BA51	<i>Asetyyლისისყილი- syylihappo</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Älä käytä kipu-, kuume- tai flunssalääkkeenä. Soveltuu käytettäväksi pienellä annoksella antitromboottina. Pienennä annosta keskivaikessa munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat verenvuodot ja mahan limakalvovauriot. Voi heikentää verenpainetautiin ja sydämen vajaatoimintaan käytettävien lääkkeiden vaikutusta. Lisää metotreksaatin toksisuutta. Huomioi, että tulehduskipulääkkeitä käytetään runsaasti itsehoidossa.	10.6.2013
	<i>C-vitamiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	10.6.2013
	<i>Kofiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	10.6.2013
	<i>Quaifenesiini</i>	<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.</b>	10.6.2013
<b>Asikloviiri</b> (iholle) D06BB03		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014

<b>Asikloviiri</b> (silmaan) S01AD03		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä. Tilapäiseen käyttöön. Hoidon aloitus silmälääkärin valvonnassa.	20.10.2014
<b>Asikloviiri</b> (suun kautta) J05AB01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Suun kautta otettavat valmisteet: Annosta pienennettävä ja annosväliä pidennettävä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutus teofylliinin kanssa.	18.8.2014
<b>Asikloviiri ja hydrokortisoni</b> (iholle) D06BB53	<i>Asikloviiri</i> <i>Hydrokortisoni</i>	<b>A</b> <b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> <b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014 7.4.2014
<b>Aspartinsuliini</b> (lyhytvaikutteinen) A10AB05		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hypoglykemian välttäminen keskeistä.	12.3.2014
<b>Aspartinsuliini</b> (insuliinisekoite) A10AD05		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hypoglykemian välttäminen keskeistä.	12.3.2014
<b>Atenololi</b> C07AB03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksena bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Omenamehu saattaa vähentää atenololin imeytymistä. Huomioi yhteisvaikutukset, erityisesti sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	19.12.2014
<b>Atorvastatiini</b> C10AA05		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Lihaskivut ja lihasheikkous mahdollisia haittoja. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	8.1.2015
<b>Atselastiini</b> (silmaan) S01GX07		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä.	20.10.2014
<b>Atsitromysiini</b> J01FA10		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Suun kautta otettavat valmisteet: Voi pidentää QTc-aikaa. Runsaasti potentiaalisesti vaarallisia yhteisvaikutuksia.	18.8.2014
<b>Avanafiili</b> G04BE10		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten tai maksan vajaatoiminnassa. Huomioi haittavaikutukset, kuten huimaus, hypotensio, ortostaattinen hypotensio, päänsärky ja näköhäiriöt. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin nitraattien ja alfasalpaajien kanssa. Greippi tehostaa hoidon vaikutusta. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	3.6.2014
<b>Baklofeeni</b> M03BX01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat väsymys, sekavuus, masennus, painajaisunet, lihasheikkous, matala verenpaine ja alttius kaatumisille. Voi lisätä muiden samanaikaisesti käytettävien keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden sedatiivista vaikutusta.	13.5.2013
<b>Beetametasoni</b> (iholle) D07AC01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset sekä systeeminen imeytyminen.	7.4.2014

<b>Beetametasoni ja fusidiinihappo</b> (iholle) D07CC01	<i>Beetametasoni</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset sekä systeeminen imeytyminen.	7.4.2014
	<i>Fusidiinihappo</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset sekä systeeminen imeytyminen.	7.4.2014
<b>Beetametasoni ja gentamisiini</b> (iholle) D07CC01	<i>Beetametasoni</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset sekä systeeminen imeytyminen.	7.4.2014
	<i>Gentamisiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset sekä systeeminen imeytyminen.	7.4.2014
<b>Beetametasoni ja antisepti</b> (iholle) D07BC01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset sekä systeeminen imeytyminen.	7.4.2014
<b>Beetametasoni ja salisyylihappo</b> (iholle) D07XC01	<i>Beetametasoni</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset sekä systeeminen imeytyminen.	7.4.2014
	<i>Salisyylihappo</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset sekä systeeminen imeytyminen.	7.4.2014
<b>Beklometasoni</b> (nenään) R01AD01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	8.1.2015
<b>Beklometasoni</b> (keuhkoihin) R03BA01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pitkäaikainen, suuriannoksen käyttö voi aiheuttaa systeemisiä vaikutuksia. Muistuta suun huuhtomisesta lääkkeenoton jälkeen.	23.2.2015
<b>Betahistiini</b> N07CA01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Ei kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia. Haittavaikutuksena mm. päänsärkyä ja lieviä mahasuolikanavan oireita.	15.9.2014
<b>Betaksololi</b> (suun kautta) C07AB05		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksena bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset, erityisesti sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	19.12.2014
<b>Betaksololi</b> (silmään) S01ED02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä. Hoidon aloitus vain silmälääkärin valvonnassa. Huomioi mahdolliset systeemiset haittavaikutukset erityisesti annosteluvirheen yhteydessä.	20.10.2014
<b>Betsafibraatti</b> C10AB02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin statiinien ja varfariinin kanssa.	8.1.2015
<b>Bimatoprosti</b> (silmään) S01EE03		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä. Saattaa aiheuttaa silmän värikalvon pigmenttimuutoksia ja ripsien kasvua.	20.10.2014

<b>Biperideeni</b> N04AA02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	10.6.2013
<b>Bisakodyyli</b> (tabletti/peräpuikko) A06AB02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa käytössä suolilaman riski.	13.5.2013
<b>Bisakodyyli</b> (peräruiske) A06AG02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa käytössä suolilaman riski.	13.5.2013
<b>Bisoprololi</b> C07AB07		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksena bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset, erityisesti sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	19.12.2014
<b>Bisoprololi ja tiatsidit</b> C07BB07	<i>Bisoprololi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksena bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset, erityisesti sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	19.12.2014
	<i>Hydroklooritiatsidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	19.12.2014
<b>Brintsolamidi</b> (silmään) S01EC04		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Ei sovellu maksan vajaatoimintapotilaille.	20.10.2014
<b>Bromiheksiini</b> R05CB02		<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.</b>	23.2.2015
<b>Bromokriptiini</b> N04BC01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Serotonerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat psykoosi, ortostaattinen hypotensio, pleuriitti, fibroosi keuhkoissa, sydänlöpissä ja mahassa sekä impulssikontrollihäiriöt kuten peliriippuvuus ja hyperseksuaalisuus. Huomioi yhteisvaikutukset dopamiiniantagonistien kuten antipsyykoottien kanssa.	10.6.2013
<b>Budesonidi</b> (keuhkoihin) R03BA02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pitkäaikainen, suuriannoksinen käyttö voi aiheuttaa systeemisiä vaikutuksia. Muistuta suun huuhtomisesta lääkkeenoton jälkeen. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin tiettyjen sienilääkkeiden kanssa.	23.2.2015
<b>Budesonidi</b> (nenään) R01AD05		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	8.1.2015
<b>Buprenorfiini</b> N02AE01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Heikko opioidi. Annosta ei yleensä tarvitse muuttaa iäkkäillä. Aloita laksatiivi ummetuksen ehkäisyyn.	15.9.2014

<b>Buspironi</b> N05BE01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Serotonerginen. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi serotonergiset yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	13.3.2015
<b>Butyyli- skopolamiini</b> A03BB01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	13.5.2013
<b>Dabigatraani</b> B01AE07		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä. Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittävin haittavaikutus verenvuotoriskin lisääntyminen. Huomioi yhteisvaikutukset. Ei tunnettua vastavaikuttajaa (antidoottia).	19.5.2014
<b>Daltepariini</b> B01AB04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Eliminaatio vähenee vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittävin haittavaikutus on verenvuotoriskin lisääntyminen. Huomioi mahdollinen kaatuilu. Vältä yhteiskäyttöä tulehduskipulääkkeiden kanssa.	19.5.2014
<b>Darifenasiini</b> G04BD10		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	13.5.2013
<b>Deksametasoni</b> H02AB02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Glukokortikoidien haittavaikutukset korostuvat pitkäaikaiskäytössä. Huomioi yhteisvaikutukset.	19.5.2014
<b>Deksametasoni, neomysiini ja polymyxini b sulfas</b> (silmaan) S01CA01	<i>Deksametasoni</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä. Tilapäiseen käyttöön. Huomioi vasta-aiheet ennen lääkkeen aloitusta.	20.10.2014
	<i>Neomysiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä. Tilapäiseen käyttöön. Huomioi vasta-aiheet ennen lääkkeen aloitusta.	20.10.2014
	<i>Polymyxini b sulfas</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä. Tilapäiseen käyttöön. Huomioi vasta-aiheet ennen lääkkeen aloitusta.	20.10.2014
<b>Deksketoprofeeni</b> M01AE17		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi lisääntynyt ruansulatuskanavan vuotojen ja sydän- ja verisuonitapahtumien riski. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenhiyytymistä estävien valmisteiden kanssa. Muista, että tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	10.11.2014



<b>Dekstrometorfaani</b> R05DA09		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Serotonerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat vapina, palpitaatio, päänsärky, pahoinvointi, ummetus, väsymys, huimaus ja alttius kaatumisille. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin memantiinin ja MAO-estäjien kanssa.	10.6.2013
<b>Denosumabi</b> M05BX04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Puutteellinen ravinnon kalsiumin saanti tai hypokalsemia on korjattava ennen hoidon aloittamista ja sen aikana. Hoidon optimaalinen kesto epäselvä. Muista epätavallisten reisiluumurtumien ja leukaluun osteonekroosin mahdollisuus.	10.11.2014
<b>Desloratadiini</b> R06AX27		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Voi aiheuttaa väsymystä. Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.	23.2.2015
<b>Desoksimetasoni</b> (iholle) D07AC03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset sekä systeeminen imeytyminen.	7.4.2014
<b>Desonidi</b> (iholle) D07AB08		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
<b>Detemirinsuliini</b> A10AE05		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hypoglykemian välttäminen keskeistä.	12.3.2014
<b>Diatsepaami</b> N05BA01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen bentsodiatsepiini, jolle kehittyy toleranssi. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, väsymys, muistihäiriöt sekä alttius kaatumisille ja liikenneonnettomuuksille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	10.6.2013
<b>Digoksiini</b> C01AA05		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Soveltuu varauksin iäkkäille. Iäkkäiden vuorokausiannos enintään 0,125 mg. Seerumipitoisuuden enimmäisarvo iäkkäillä alle 1.0 nmol/l. Huomioi yhteisvaikutukset.	9.12.2015
<b>Dihydrotakysteroli</b> A11CC02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Tarve vähintään 20 µg/vrk (800 ky/vrk) ympärivuotisesti.	7.4.2014
<b>Diklofenaakki</b> (iholle) M02AA15		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Käyttöohjeen mukaisesti iholle käytettynä systeeminen imeytyminen vähäistä.	10.11.2014
<b>Diklofenaakki</b> (suun kautta) M01AB05		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi lisääntynyt ruansulatuskanavan vuotojen ja sydän- ja verisuonitapahtumien riski. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenhiyytymistä estävien valmisteiden kanssa. Muista, että tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	10.11.2014

<b>Diklofenaakki ja misoprostoli</b> M01AB55	<i>Diklofenaakki</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi lisääntynyt ruuansulatuskanavan vuotojen ja sydän- ja verisuonitapahtumien riski. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenhiyytymistä estävien valmisteiden kanssa. Muista, että tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	10.11.2014
	<i>Misoprostoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	10.11.2014
<b>Diltiatseemi</b> C08DB01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Käytä vain erityistapauksissa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat ummetus, bradykardia ja turvotus. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset erityisesti digoksiinin ja beetasalpaajien kanssa. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	13.5.2013
<b>Dinatrium-kromoglikaatti</b> (silmään) S01GX01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä.	20.10.2014
<b>Dipyridamoli</b> B01AC07		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Huomioi haittavaikutukset, kuten angina pectoris -oireet ja huimaus. Dipyridamolien teho yksinään (ilman asetyylisalisyylihappoa) on vaatimaton.	3.6.2014
<b>Dipyridamoli ja asetyylisalisyylihappo</b> B01AC30	<i>Dipyridamoli</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Huomioi haittavaikutukset, kuten angina pectoris -oireet ja huimaus. Dipyridamolien teho yksinään (ilman asetyylisalisyylihappoa) on vaatimaton.	3.6.2014
	<i>Asetyylisalisyylihappo</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Merkittävin haittavaikutus on verenvuotoriskin lisääntyminen. Soveltuu käytettäväksi pienellä annoksella (=100 mg/vrk) valtimotaudin sekundaaripreventiossa.	19.5.2014
<b>Doksepiini</b> N06AA12		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, virtsaamisvaikeudet, muistihäiriöt, väsymys, takykardia, ortostaattinen hypotensio ja alttius kaatumisille. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	20.6.2013
<b>Doksisykliini</b> J01AA02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Suun kautta otettavat valmisteet: Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	18.8.2014
<b>Donepetsiili</b> N06DA02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Altistaa sydämen johtumishäiriöille. Huomioi seuranta erityisesti sairas sinus -oireyhtymässä ja sydämen harvavyöntisyydessä. Voi vaikeuttaa ahtauttavaa keuhkosairautta. Huomioi ruuansulatuskanavaan kohdistuvat haitat. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin syketaajuutta laskevien lääkkeiden kanssa. Antikolinergiset lääkeaineet heikentävät Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	10.11.2014
<b>Dorsolamidi</b> (silmään) S01EC03		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä. Älä käytä vaikeassa tai loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminnassa. Varoen maksan vajaatoimintapotilaille.	20.10.2014

<b>Dronedaroni</b> C01BD07		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Hoidon aloitus ja käyttö erikoislääkärin valvonnassa. Älä käytä pysyvässä eteisvärinässä, sydämen vajaatoiminnassa tai vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittävä haittavaikutus on QTc-ajan pidentyminen ja sen myötä kääntyvien kärkien takykardia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	20.6.2013
<b>Drospirenoni ja estrogeeni</b> G03FA17	<i>Drospirenoni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset. Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.	3.6.2014
	<i>Estrogeeni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä systeemisesti.</b> Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset. Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.	3.6.2014
<b>Duloksetiini</b> N06AX21		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. Käytössä masennuksen ja virtsankarkailun hoidossa. Huomioi yhteisvaikutukset.	13.3.2015
<b>Dutasteridi</b> G04CB02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	3.6.2014
<b>Dydrogesteroni ja estrogeeni</b> G03FA14	<i>Dydrogesteroni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Vältä käyttöä iäkkäillä. Huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset. Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.	3.6.2014
	<i>Estrogeeni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä systeemisesti.</b> Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset. Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.	3.6.2014
<b>Dydrogesteroni ja estrogeeni</b> G03FB08	<i>Dydrogesteroni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset. Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.	3.6.2014
	<i>Estrogeeni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä systeemisesti.</b> Huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset. Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.	3.6.2014
<b>Ebastiini</b> R06AX22		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Voi aiheuttaa väsymystä.	23.2.2015
<b>Eksenatidi</b> A10BX04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Paino voi laskea. Käyttökokemus pitkävaikutteisesta valmisteesta vähäistä.	7.4.2014
<b>Emedastiini</b> (silmaan) S01GX06		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä.	20.10.2014

<b>Enalapriili</b> C09AA02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa. Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio, etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
<b>Enalapriili ja diureetit</b> C09BA02	<i>Enalapriili</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa. Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio, etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	<i>Hydroklooritiatsidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	8.1.2015
<b>Enalapriili ja lerkanidipiini</b> C09BB02	<i>Enalapriili</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa. Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio, etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	<i>Lerkanidipiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	8.1.2015
<b>Enoksapariini</b> B01AB05		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Eliminaatio heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittävin haittavaikutus on verenvuotoriskin lisääntyminen. Huomioi mahdollinen kaatuilu. Vältä yhteiskäyttöä tulehduskipulääkkeiden kanssa.	19.5.2014
<b>Eprosartaani</b> C09CA02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa lääkeshoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
<b>Eprosartaani ja diureetit</b> C09DA02	<i>Eprosartaani</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa lääkeshoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	<i>Hydroklooritiatsidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	8.1.2015
<b>Erdosteini</b> R05CB15		<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.</b>	23.2.2015
<b>Ergokalsiferoli (vitamiini D2)</b> A11CC01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Tarve vähintään 20 µg/vrk (800 ky/vrk) ympärivuotisesti.	7.4.2014

<b>Esomepratsoli</b> A02BC05		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Käytön tarpeellisuus arvioitava säännöllisesti. Pitkäaikaiskäytössä voi heikentää kalsiumin ja B12-vitamiinin imeytymistä. Enterorakenteen rikkominen vie lääkkeen tehon.	12.3.2014
<b>Essitalopraami</b> N06AB10		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Serotonerginen. Haittavaikutuksena ovat mm. hyponatremia ja verenvuotoriskin lisääntyminen. Huomioi yhteisvaikutukset.	13.3.2015
<b>Estradioli</b> G03CA03		<b>D</b>	<b>Sopii iäkkäille naisille paikallishoitoon (luokka A). Vältä käyttöä iäkkäillä systeemisesti (luokka D).</b> Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset. Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.	3.6.2014
<b>Estrioli</b> G03CA04		<b>D</b>	<b>Sopii iäkkäille naisille paikallishoitoon (luokka A). Vältä käyttöä iäkkäillä systeemisesti (luokka D).</b> Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset. Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.	3.6.2014
<b>Etodolaakki</b> M01AB08		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi lisääntynyt ruansulatuskanavan vuotojen ja sydän- ja verisuonitapahtumien riski. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenhiyytymistä estävien valmisteiden kanssa. Muista, että tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	10.11.2014
<b>Etorikoksibi</b> M01AH05		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi lisääntynyt ruansulatuskanavan vuotojen ja sydän- ja verisuonitapahtumien riski. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenhiyytymistä estävien valmisteiden kanssa. Muista, että tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	10.11.2014
<b>Etsetimibi</b> C10AX09		<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.</b>	8.1.2015
<b>Etyylimorfiini</b> R05DA01	<i>Etyylimorfiini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat ummetus, väsymys, pahoinvointi, virtsaamisvaikeus, sappiongelmien ja alttius kaatumisille. Huomioi yhteisvaikutukset, erityisesti antitussiiivista tehoa heikentävien lääkkeiden kanssa.	10.6.2013
	<i>Muut aineosat</i>	<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.</b>	10.6.2013
<b>Famotidiini</b> A02BA03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Iäkkäät ovat alttiita harvinaisille haittavaikutuksille, kuten päänsärylle, huimaukselle, mahasuolikanavan oireille ja sekavuudelle.	12.3.2014

Famotidiini, magnesium ja kalsiumkarbonaati A02BA53	Magnesium	D	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Annosta pienennettävä munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset. Ei sovi iäkkäiden antasidiksi.	12.3.2014
	Famotidiini	C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Iäkkäät ovat alttiita harvinaisille haittavaikutuksille, kuten päänsärylle, huimaukselle, mahasuolikanavan oireille ja sekavuudelle.	12.3.2014
	Kalsium- karbonaati	A	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
Feksofenadiini R06AX26		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Voi aiheuttaa väsymystä. Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutukset.	23.2.2015
Felodipiini C08CA02		A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	19.12.2014
Fenofibraatti C10AB05		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin statiinien ja varfariinin kanssa.	8.1.2015
Fenoksimetyyli- penisilliini J01CE02		A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Voi voimistaa metotreksaatin vaikutusta.	18.8.2014
Fenoteroli ja ipratropiumbromidi R03AL01	Fenoteroli	A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Lisää sympatomiteettistä vaikutusta. Voi aiheuttaa hypokalemiaa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sympatomimeettisten aineiden kanssa.	23.2.2015
	Ipratropium- bromidi	A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Suurilla annoksilla antikolinergiset haittavaikutukset mahdollisia. Huomioi yhteisvaikutukset muiden antikolinergisten lääkkeiden kanssa.	23.2.2015
Fentanyl N02AB03		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. Vahva opioidi. Aloita laksatiivi ummetuksen ehkäisyyn. Huomioi merkittävät yhteisvaikutukset erityisesti eräiden sienilääkkeiden ja makrolidien kanssa.	15.9.2014
Fenytoiini N03AB02		D	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Hoidon aloitus erikoislääkärin valvonnassa. Seuraa lääkepitoisuutta. Terapeuttinen leveys on kapea ja pitoisuuden nousu vaikeasti ennakoitavissa. Matala albumiinipitoisuus voimistaa lääkevastetta. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat väsymys, huimaus, ienhyperplasia, osteomalasia, maksatoksisuus ja muutokset verenkuvassa. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	10.6.2013
Fenyylipropanoli- amiini R01BA01		D	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat hermostuneisuus, unettomuus, uneliaisuus, suun kuivuminen ja verenpaineen kohoaminen. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	10.6.2013

Fenyylipropanoli- amiini ja sinnaritsiini R01BA51	<i>Fenyylipropanoliamiini</i>	D	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat hermostuneisuus, unettomuus, uneliaisuus, suun kuivuminen ja verenpaineen kohoaminen.	20.6.2013
	<i>Sinnaritsiini</i>		<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat ekstrapyramidaalioireet.	20.6.2013
Fesoterodiini G04BD11		D	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	13.5.2013
Finasteridi G04CB01		A	<b>Sopii iäkkäille.</b>	3.6.2014
Flekainidi C01BC04		D	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Hoidon aloitus erikoislääkärin määräyksellä. Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittävä haittavaikutus on QTc-ajan pidentyminen ja sen myötä kääntyvien kärkien takykardia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	20.6.2013
Fludrokortisoni H02AA02		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi voimakas mineralokortikoidivaikutus. Hormonikorauhoidon periaatteet samat nuorilla ja iäkkäillä. Valmisteyhteenvedosta poikkeava (off-label) käyttö hypotonian hoidossa pienellä annoksella vain harkiten.	19.5.2014
Flukonatsoli J02AC01		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Suun kautta otettavat valmisteet: Annosta pienennettävä munuaisten vajaatoiminnassa. Maksan toimintaa seurattava hoidon aikana. Runsaasti haittavaikutuksia, kuten ruuansulatuskanavan oireet, Qt-ajan pidentymisen riski sekä huimaus. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	18.8.2014
Fluokortoloni C05AA08	<i>Fluorokortoloni Lidokaiini</i>	A	<b>Sopii iäkkäille.</b>	3.12.2013
		A	<b>Sopii iäkkäille.</b>	3.12.2013
Fluoksetiini N06AB03		D	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Serotonerginen. Hyvin pitkävaikutteinen SSRI-lääke, jonka vaikutus kestää viikkoja. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat unettomuus, päänsärky, huimaus, pahoinvointi, takykardia, näköhäiriöt, virtsaamisvaikeudet ja hyponatremia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset erityisesti verenvuotoriskiä lisäävien ja muiden serotonergisten valmisteiden kanssa.	10.6.2013

<b>Flupentiksoli</b> N05AF01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, virtsaamisvaikeudet, muistihäiriöt, väsymys, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, takykardia, ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan pidentyminen, riski sydän- ja verenkiertotapah- tumille ja alttius kaatumisille. Dementian käytös- oireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	10.6.2013
<b>Flutikasoni</b> (inhalaatio) R03BA05		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pitkäaikainen, suuriannoksen käyttö voi aiheuttaa systeemisiä vaikutuksia. Muistuta suun huuhtomisesta lääkkeenoton jälkeen. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin tiettyjen sienilääkkeiden kanssa.	23.2.2015
<b>Flutikasoni</b> (nenään) R01AD08		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	8.1.2015
<b>Flutikasoni ja</b> <b>atselastiini</b> R01AD58	<i>Flutikasoni</i> <i>Atselastiini</i>	<b>A</b> <b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> <b>Sopii iäkkäille.</b>	8.1.2015 8.1.2015
<b>Flutikasonifuroaatti</b> (nenään) R01AD12		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	8.1.2015
<b>Fluvastatiini</b> C10AA04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Lihaskivut ja lihasheikkous mahdollisia haittoja. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin kanssa.	8.1.2015
<b>Fluvoksamiini</b> N06AB08		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Serotonerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat unettomuus, päänsärky, huimaus, pahoinvointi, takykardia, näköhäiriöt, virtsaamisvaikeudet ja hyponatremia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset erityisesti verenvuotoriskiä lisäävien ja muiden serotonergisten valmisteiden kanssa.	13.3.2015
<b>Foolihappo</b> B03BB01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Foolihappo voi alentaa fenytaiinin pitoisuutta.	19.5.2014
<b>Formoteroli</b> R03AC13		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Lisää sympatomiteettistä vaikutusta. Voi aiheuttaa hypokalemiaa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sympatomimeettisten aineiden kanssa.	23.2.2015
<b>Formoteroli ja</b> <b>budesonidi</b> R03AK07	<i>Formoteroli</i>  <i>Budesonidi</i>	<b>A</b>  <b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Lisää sympatomiteettistä vaikutusta. Voi aiheuttaa hypokalemiaa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sympatomimeettisten aineiden kanssa. <b>Sopii iäkkäille.</b> Pitkäaikainen, suuriannoksen käyttö voi aiheuttaa systeemisiä vaikutuksia. Muistuta suun huuhtomisesta lääkkeenoton jälkeen. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin tiettyjen sienilääkkeiden kanssa.	23.2.2015  23.2.2015



<b>Furosemidi</b> C03CA01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	19.12.2014
<b>Furosemidi ja kaliumia säästävät diureetit</b> C03EB01	<i>Furosemidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	19.12.2014
	<i>Triamtereeni</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi hyperkalemian riski.	19.12.2014
<b>Fusidiinihappo</b> (silmiin) S01AA13		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä. Tilapäiseen käyttöön. Huomioi vasta-aiheet ennen lääkkeen aloitusta.	20.4.2015
<b>Fusidiinihappo</b> (iholle) D06AX01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
<b>Gabapentiini</b> N03AX12		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi erityisesti keskushermostoon kohdistuvat haittavaikutukset. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	15.9.2014
<b>Galantamiini</b> N06DA04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Altistaa sydämen johtumishäiriöille. Huomioi seuranta erityisesti sairas sinus -oireyhtymässä ja sydämen harvalyöntisyydessä. Voi vaikeuttaa ahtauttavaa keuhkosairautta. Huomioi ruoansulatuskanavaan kohdistuvat haitat. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin syketaajuutta laskevien lääkkeiden kanssa. Antikolinergiset lääkkeet heikentävät Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	10.11.2014
<b>Gemfibrotsiili</b> C10AB04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Alumiinin ja magnesiumin samanaikainen käyttö heikentää lääkkeen tehoa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin statiinien ja varfariinin kanssa.	8.1.2015
<b>Glargininsuliini</b> A10AE04		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hypoglykemian välttäminen keskeistä.	12.3.2014
<b>Glimepiridi</b> A10BB12		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Munuaisten ja maksan toiminnan heikentyessä haittojen riski kasvaa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutukset. Pitkävaikutteinen sulfonyyliurea. Huomioi pitkittyneen hypoglykemian vaara.	7.4.2014
<b>Glipitsidi</b> A10BB07		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Munuaisten ja maksan toiminnan heikentyessä haittojen riski kasvaa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutukset. Lyhytvaikutteisin sulfonyyliurea. Huomioi pitkittyneen hypoglykemian vaara.	12.3.2014
<b>Glukosamiini</b> M01AX05		<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.</b> Kliinisesti merkittävästä tehosta ei ole näyttöä.	10.11.2014

<b>Glyseryyliitrinitraatti</b> C01DA02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Huomioi verenpaineen aleneminen ja ortostaattisen hypotonian mahdollisuus.	19.12.2014
<b>Granisetroni</b> A04AA02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	12.3.2014
<b>Guaifenesiini</b> R05CA03		<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.</b>	23.2.2015
<b>Haloperidoli</b> N05AD01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Käyttö altistaa ekstrapyramidaalioireille, kaatumisille ja sydän- ja verenkiertotapahtumille. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Käytä pientä annosta ja arvioi säännöllisesti läikehoidon tarve.	13.3.2015
<b>Hydroklooritiatsidi</b> C03AA03		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	19.12.2014
<b>Hydroklooritiatsidi ja kaliumia säästävät diureetit</b> C03EA01	<i>Hydroklooritiatsidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	19.12.2014
	<i>Amiloridi</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi hyperkalemian riski.	19.12.2014
<b>Hydrokortisoni</b> (rektaalivoide) C05AA01	<i>Hydrokortisoni</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
	<i>Muut aineosat</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
<b>Hydrokortisoni</b> (iholle) D07XA01	<i>Hydrokortisoni</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
	<i>Dekspantenoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
<b>Hydrokortisoni</b> D07AA02 (iholle)		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
<b>Hydrokortisoni</b> (suun kautta) H02AB09		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Glukokortikoidien haittavaikutukset korostuvat pitkäaikaiskäytössä. Huomioi yhteisvaikutukset.	19.5.2014
<b>Hydrokortisoni ja antibiootti</b> (iholle) D07CA01	<i>Hydrokortisoni</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
	<i>Muut aineosat</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
<b>Hydrokortisoni ja antisepti</b> (iholle) D07BA04	<i>Hydrokortisoni</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
	<i>Klooriheksidiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
<b>Hydrokortisoni-butyyraatti</b> (iholle) D07AB02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
<b>Hydrokortisoni-butyyraatti ja antisepti</b> (iholle) D07BB04	<i>Hydrokortisoni</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
	<i>Klooriheksidiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014

<b>Hydroksiklorokiini</b> P01BA02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosta pienennettävä jo keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Ei tule käyttää loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminnassa.	10.11.2014
<b>Hydroksitsiini</b> N05BB01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen ja väsyttävä epäselektiivinen antihistamiini. Älä käytä uni- tai rauhoittavana lääkkeenä. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	10.6.2013
<b>Hydroksokobalamiini</b> B03BA03		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	19.5.2014
<b>Hydromorfon</b> N02AA03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Vahva opioidi. Titraa annos vasteen mukaan. Pienennä aloitusannosta keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Aloita laksatiivi ummetuksen ehkäisyyn.	15.9.2014
<b>Ibandronaatti</b> M05BA06		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Ei vuodepotilaille. Potilaan tulee pystyä ottamaan lääke riittävän vesimäärän kera ja olemaan puoli tuntia pystyasennossa lääkkeenoton jälkeen. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Käyttöaikausitus 5 vuotta. Huomioi yhteisvaikutukset kalsiumin, raudan, magnesiumin ja alumiinin kanssa.	10.11.2014
<b>Ibuprofeeni</b> M01AE01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi lisääntynyt ruansulatuskanavan vuotojen ja sydän- ja verisuonitapahtumien riski. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenhiyttymistä estävien valmisteiden kanssa. Huomioi, että tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	10.11.2014
<b>Ibuprofeeni ja C-vitamiini</b> M01AE51	<i>Ibuprofeeni</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi lisääntynyt ruansulatuskanavan vuotojen ja sydän- ja verisuonitapahtumien riski. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenhiyttymistä estävien valmisteiden kanssa. Muista, että tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	10.11.2014
	<i>C-vitamiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	10.11.2014
<b>Ihmisinsuliini</b> (pitkävaikutteinen) A10AC01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hypoglykemian välttäminen keskeistä.	12.3.2014
<b>Ihmisinsuliini</b> (insuliinisekoite) A10AD01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hypoglykemian välttäminen keskeistä.	12.3.2014

<b>Indapamidi</b> C03BA11		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho menetään vaikeassa munuaisten vajaatoimissa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	19.12.2014
<b>Indometasiini</b> M01AB01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat maha-suolikanavan verenvuoto, munuaisten vajaatoiminta ja sen paheneminen, kohonnut verenpaine, sydämen vajaatoiminta, huimaus ja psykoosi. Huomioi yhteisvaikutukset erityisesti muiden verenvuotoriskiä lisäävien lääkkeiden ja verenpainelääkkeiden kanssa.	13.5.2013
<b>Indometasiini ja etyylimorfiini</b> M01AB51	<i>Indometasiini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat maha-suolikanavan verenvuoto, munuaisten vajaatoiminta ja sen paheneminen, kohonnut verenpaine, sydämen vajaatoiminta, huimaus ja psykoosi. Huomioi yhteisvaikutukset erityisesti muiden verenvuotoriskiä lisäävien lääkkeiden ja verenpainelääkkeiden kanssa.	13.5.2013
	<i>Etyylimorfiini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat ummetus, väsymys, pahoinvointi, ortostatismi, virtsaamisvaikeus, sappiongelmat ja alttius kaatumisille.	13.5.2013
<b>Ipratropiumbromidi</b> R03BB01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Suurilla annoksilla antikolinergiset haittavaikutukset mahdollisia. Huomioi yhteisvaikutukset muiden antikolinergisten lääkkeiden kanssa.	23.2.2015
<b>Isosorbididi-nitraatti</b> C01DA08		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Huomioi verenpaineen aleneminen ja ortostaattisen hypotonian mahdollisuus.	19.12.2014
<b>Isosorbidimono-nitraatti</b> C01DA14		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Huomioi verenpaineen aleneminen ja ortostaattisen hypotonian mahdollisuus.	19.12.2014
<b>Ispaghula, yhdistelmävalmisteet</b> A06AC51		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Sopii pitkäaikaiskäyttöön. Huolehdittava riittävästä nesteensaannista.	12.3.2014
<b>Isradipiini</b> C08CA03		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	19.12.2014
<b>Itrakonatsoli</b> J02AC02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Voi pidentää QTc-aikaa. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Voimakas CYP3A4-estäjä. Happosalpaajat heikentävät imeytymistä.	18.8.2014

<b>Kabergoliini</b> N04BC06		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat psykoosi, ortostaattinen hypotensio, pleuriitti, fibroosi keuhkoissa ja sydänlöpissä sekä impulssikontrollihäiriöt kuten peliriippuvuus ja hyperseksuaalisuus. Huomioi yhteisvaikutukset dopamiiniantagonistien kuten antipsyykoottien kanssa.	10.6.2013
<b>Kaliumkloridi</b> A12BA01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi hyperkalemian riski munuaisten vajaatoimintapotilailla. Seuraa kaliumpitoisuutta. Huomioi yhteisvaikutukset kaliumtasapainoon vaikuttavien verenpainelääkkeiden kanssa.	7.4.2014
<b>Kaliumkloridi, yhdistelmävalmisteet</b> A12BA51	<i>Kaliumkloridi</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi hyperkalemian riski munuaisten vajaatoimintapotilailla. Seuraa kaliumpitoisuutta. Huomioi yhteisvaikutukset kaliumtasapainoon vaikuttavien verenpainelääkkeiden kanssa.	7.4.2014
	<i>Magnesium</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Annosta pienennettävä munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	7.4.2014
<b>Kalsipotrioli</b> (iholle) D05AX02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
<b>Kalsipotrioli ja betametasoni</b> (iholle) D05AX52	<i>Kalsipotrioli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
	<i>Betametasoni</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
<b>Kalsitrioli</b> (iholle) D05AX03		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
<b>Kalsium ja D-vitamiini</b> A12AX	<i>Kalsium</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Mahan happamuuden vähentyessä imeytyminen heikkenee. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	7.4.2014
	<i>D-vitamiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Tarve vähintään 20 µg/vrk (800ky/vrk) ympärivuotisesti.	7.4.2014
<b>Kalsiumkarbonaatti</b> A12AA04		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Mahan happamuuden vähentyessä imeytyminen heikkenee. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	7.4.2014
<b>Kalsiumlaktaattiglukonaatti</b> A12AA06		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Mahan happamuuden vähentyessä imeytyminen heikkenee. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	7.4.2014
<b>Kandesartaani</b> C09CA06		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015

Kandesartaani ja hydroklooritiatsidi C09DA06	Kandesartaani	C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	Hydroklooritiatsidi	A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	8.1.2015
Kaptopriili C09AA01		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa. Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio, etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
Karbamatsepiini N03AF01		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Runsaasti haittavaikutuksia, kuten muutokset verenkuvassa, maksavaurio ja hyponatremia. Pitkäaikaisessa käytössä huomioitava D-vitamiinilisän tarve. Huomioi runsaat ja merkittävät yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	15.9.2014
Karbimatsoli H03BB01		A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Huomioi harvinaiset, mutta vakavat haittavaikutukset.	19.5.2014
Karbosisteiini R05CB03		B	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.</b>	23.2.2015
Karvediloli C07AG02		A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksena bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset, erityisesti sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	19.12.2014
Kefaleksiini J01DB01		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Eliminaatio vähenee jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Voi voimistaa metotreksaatin vaikutusta.	18.8.2014
Kefuroksiimi J01DC02		A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Suun kautta otettavat valmisteet: Voi voimistaa metotreksaatin vaikutusta.	18.8.2014
Keinokyyneleet (silmiin) S01XA20		A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä.	20.10.2014
Ketiapiini N05AH04		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. Käyttö altistaa ekstrapyramidaalioireille, kaatumisille ja sydän- ja verenkiertotapahtumille. Dementian käyttöoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Ei sovellu unilääkkeeksi. Käytä pientä annosta ja arvioi säännöllisesti lääkehoidon tarve. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	13.3.2015

<b>Ketokonatsoli</b> (iholle) D01AC08		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallisesti käytettynä imeytyy limakalvolta ja rikkoutuneelta iholta (huomioi yhteisvaikutusriski).	2.10.2014
<b>Ketoprofeeni</b> (iholle) M02AA10		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Käyttöohjeen mukaisesti iholle käytettynä systeeminen imeytyminen vähäistä.	10.11.2014
<b>Ketoprofeeni</b> M01AE03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi lisääntynyt ruuansulatuskanavan vuotojen ja sydän- ja verisuonitapahtumien riski. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenhiyytymistä estävien valmisteiden kanssa. Muista, että tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	10.11.2014
<b>Ketotifeeni</b> (silmään) S01GX08		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä.	20.10.2014
<b>Kinapriili</b> C09AA06		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa. Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio, etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
<b>Kinapriili ja hydroklooritiatsidi</b> C09BA06	<i>Kinapriili</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa. Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio, etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	<i>Hydroklooritiatsidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	8.1.2015
<b>Klaritromysiini</b> J01FA09		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Suun kautta otettavat valmisteet: Voi pidentää QTc-aikaa. Runsaasti potentiaalisesti vaarallisia yhteisvaikutuksia.	18.8.2014
<b>Klidiini ja psyykenlääke</b> A03CA02	<i>Klinidiini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat mm. kognition heikkeneminen ja ortostaattinen hypotensio. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	13.5.2013
	<i>Klooridiatsepoksiidi</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen bentsodiatsepiini, jolle kehittyy toleranssi. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, väsymys, muistihäiriöt sekä alttius kaatumisille ja liikenneonnettomuuksille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.	13.5.2013
<b>Klindamysiini</b> (suun kautta) J01FF01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Suun kautta otettavat valmisteet.	18.8.2014

<b>Klindamysiini</b> (emättimeen) G01AA10		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	2.10.2014
<b>Klobatsaami</b> N05BA09		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen bentsodiatsepiini, jolle kehittyä toleranssi. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, väsymys, muistihäiriöt sekä alttius kaatumisille ja liikenneonnettomuuksille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.	10.6.2013
<b>Klobetasoli</b> (iholle, vahva) D07AD01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset sekä systeeminen imeytyminen. Tilapäiseen käyttöön. Harkitse ihotautilääkärin konsultaatiota.	7.4.2014
<b>Klobetasoni</b> (iholle, keskivahva) D07AB01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
<b>Klodronaatti</b> M05BA02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Ei vuodepotilaille. Potilaan tulee pystyä ottamaan lääke riittävän vesimäärän kera ja olemaan puoli tuntia pystyasennossa lääkkeenoton jälkeen. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Käyttöaikausitus 5 vuotta. Huomioi yhteisvaikutukset kalsiumin, raudan, magnesiumin ja alumiinin kanssa.	10.11.2014
<b>Klomipramiini</b> N06AA04		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, virtsaamisvaikeudet, sekavuus, muistihäiriöt, väsymys, vapina, takykardia, ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan pidentyminen, serotoniinisyndrooma ja alttius kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	10.6.2013
<b>Klonatsepaami</b> N03AE01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen bentsodiatsepiini, jolle kehittyä toleranssi. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, väsymys, muistihäiriöt sekä alttius kaatumisille ja liikenneonnettomuuksille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.	10.6.2013
<b>Klonidiini</b> C02AC01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat päänsärky, huimaus, uneliaisuus, ortostaattinen hypotensio ja bradykardia. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin beetasalpaajien kanssa.	13.5.2013



<b>Klooridiatsepoksidi</b> N05BA02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen bentsodiatsepiini, jolle kehittyä toleranssi. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, väsymys, muistihäiriöt sekä alttius kaatumisille ja liikenneonnettomuuksille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.	10.6.2013
<b>Klooriprotikseeni</b> N05AF03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, virtsaamisvaikeudet, muistihäiriöt, väsymys, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, takykardia, ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan pidentyminen, riski sydän- ja verenkiertotapahtumille ja alttius kaatumisille. Dementian käyttöoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	10.6.2013
<b>Klopidogreeli</b> B01AC04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Aihiolääke. Merkittävien haittavaikutus on verenvuotoriskin lisääntyminen, erityisesti huonokuntoisilla ja munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavilla. Huomioi yhteisvaikutukset. Greippi heikentää hoidon vaikutusta. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	19.5.2014
<b>Klopidogreeli ja asetyylisalisyylihappo</b> B01AC30	<i>Klopidogreeli</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Aihiolääke. Merkittävien haittavaikutus on verenvuotoriskin lisääntyminen, erityisesti huonokuntoisilla ja munuaisten tai maksan vajaatoimintaa sairastavilla. Huomioi yhteisvaikutukset. Greippi heikentää hoidon vaikutusta. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	19.5.2014
	<i>Asetyylisalisyylihappo</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Merkittävien haittavaikutus on verenvuotoriskin lisääntyminen. Soveltuu käytettäväksi pienellä annoksella (=100 mg/vrk) valtimotaudin sekundaaripreventiossa.	19.5.2014
<b>Kloramfenikoli</b> (silmään) S01AA01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä. Tilapäiseen käyttöön. Huomioi vasta-aiheet ennen lääkkeen aloitusta.	20.4.2015
<b>Klotrimatsoli</b> (iholle) D01AC01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	2.10.2014
<b>Klotrimatsoli</b> (emättimeen) G01AF02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	2.10.2014

<b>Klotsapiini</b> N05AH02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Noudata käytössä viranomaisten hyväksymiä turvallisuusohjeita. Käyttö altistaa ekstrapyramidaalioireille, kaatumisille ja sydän- ja verenkiertotapahtumille. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa. Tupakointi heikentää lääkkeen vaikutusta.	10.6.2013
<b>Kodeiini ja parasetamoli</b> N02AA59	<i>Kodeiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Heikko opioidi, jolle kehittyy toleranssi. Pienennä aloitusannosta lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Osalla henkilöistä vaste normaalia heikompi tai voimakkaampi perinnöllisistä eroista johtuen. Aloita laksatiivi ummetuksen ehkäisyyn. Huomioi yhteisvaikutukset, sillä useat lääkkeet heikentävät kodeiinin tehoa.	15.9.2014
	<i>Parasetamoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Säännöllisessä käytössä korkeintaan 3 grammaa vuorokaudessa. Yliannos maksatoksen. Huomioi verenvuotoriski yhteiskäytössä varfariinin kanssa, kun parasetamoliannos säännöllisessä käytössä yli 2 grammaa vuorokaudessa. Yhteiskäyttö varfariinin kanssa mahdollista seuraamalla INR-arvoja. Huomioi itsehoito- ja yhdistelmävalmisteiden sisältämä parasetamoli.	15.9.2014
<b>Kodeiini ja ibuprofeeni</b> N02AA59	<i>Kodeiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Heikko opioidi, jolle kehittyy toleranssi. Pienennä aloitusannosta lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Osalla henkilöistä vaste normaalia heikompi tai voimakkaampi perinnöllisistä eroista johtuen. Aloita laksatiivi ummetuksen ehkäisyyn. Huomioi yhteisvaikutukset, sillä useat lääkkeet heikentävät kodeiinin tehoa.	15.9.2014
	<i>Ibuprofeeni</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi lisääntynyt ruuansulatuskanavan vuotojen ja sydän- ja verisuonitapahtumien riski. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenhiyytymistä estävien valmisteiden kanssa. Muista, että tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	15.9.2014
<b>Kolekalsiferoli</b> (vitamiini D3) A11CC05		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Tarve vähintään 20 µg/vrk (800 ky/vrk) ympärivuotisesti.	7.4.2014
<b>Kolestyramiini</b> C10AC01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi ummetuksen riski. Huomioi runsaat imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	8.1.2015

<b>Labetaloli</b> C07AG01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksena bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset, erityisesti sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	19.12.2014
<b>Laktuloosi</b> A06AD11		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Sopii pitkäaikaiskäyttöön.	12.3.2014
<b>Lamotrigiini</b> N03AX09		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Runsaasti haittavaikutuksia. Ihohaitat yleisiä, joista osa vakavia.	15.9.2014
<b>Lansopratsoli</b> A02BC03		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Käytön tarpeellisuus arvioitava säännöllisesti. Pitkäaikaiskäytössä voi heikentää kalsiumin ja B12-vitamiinin imeytymistä. Enterorakenteen rikkominen vie lääkkeen tehon.	12.3.2014
<b>Lansopratsoli, amoksisilliini ja klaritromysiini</b> A02BD07	<i>Amoksisilliini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Annosväliä pidennettävä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi voimistaa metotreksaatin vaikutusta.	18.8.2014
	<i>Klaritromysiini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Suun kautta otettavat valmisteet: Voi pidentää QTc-aikaa. Runsaasti potentiaalisesti vaarallisia yhteisvaikutuksia.	18.8.2014
	<i>Lansopratsoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Käytön tarpeellisuus arvioitava säännöllisesti. Pitkäaikaiskäytössä voi heikentää kalsiumin ja B12-vitamiinin imeytymistä. Enterorakenteen rikkominen vie lääkkeen tehon.	12.3.2014
<b>Lansopratsoli, metronidatsoli ja amoksisilliini</b> A02BD03	<i>Amoksisilliini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Annosväliä pidennettävä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi voimistaa metotreksaatin vaikutusta.	18.8.2014
	<i>Metronidatsoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Voi aiheuttaa makuhäiriöitä ja virtsan värjäytymistä tummaksi. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin varfariinin ja sulfonyyliureoiden kanssa. Ei alkoholinkäyttöä hoidon aikana.	18.8.2014
	<i>Lansopratsoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Käytön tarpeellisuus arvioitava säännöllisesti. Pitkäaikaiskäytössä voi heikentää kalsiumin ja B12-vitamiinin imeytymistä. Enterorakenteen rikkominen vie lääkkeen tehon.	12.3.2014
<b>Latanoprosti</b> (silmaan) S01EE01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä. Saattaa aiheuttaa silmän värikalvon pigmenttimuutoksia ja ripsien kasvua.	20.10.2014
<b>Lauryylisulfaatti ja yhdistelmävalmisteet</b> A06AG11	<i>Natrium-lauryylisulfaatti</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Tilapäiseen käyttöön.	13.5.2013
	<i>Sorbitoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
	<i>Natriumsitraatti</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
<b>Lerkanidipiini</b> C08CA13		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	19.12.2014

Levetirasetaami N03AX14		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annos jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksia ovat mm. väsymys, huimaus, masennus, kiihtymys, unettomuus ja aggressiivisuus.	15.9.2014
Levodopa ja dekarboksyylaasin estäjä N04BA02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Serotonerginen. Hoidon aloitus erikoislääkärin valvonnassa. Imeytyminen lisääntyy ikääntymisen myötä. Äkillinen hoidon lopettaminen voi aiheuttaa malignin neuroleptisyndrooman kaltaisia oireita. Haittavaikutuksia ovat mm. sekavuus, kiihtyneisyys, ortostaattinen hypotensio ja dyskinesiat. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin psykoosilääkkeiden kanssa.	15.9.2014
Levodopa, dekarboksyylaasin estäjä ja COMT-estäjä N04BA03		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Serotonerginen. Hoidon aloitus erikoislääkärin valvonnassa. Imeytyminen lisääntyy ikääntymisen myötä. Äkillinen hoidon lopettaminen voi aiheuttaa malignin neuroleptisyndrooman kaltaisia oireita. Haittavaikutuksia ovat mm. sekavuus, kiihtyneisyys, ortostaattinen hypotensio ja dyskinesiat. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin psykoosilääkkeiden kanssa.	15.9.2014
Levofloksasiini J01MA12		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi pidentää QTc-aikaa. Voi aiheuttaa huimausta hoidon alkuvaiheessa. Lisää riskiä jännetulehdukselle. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset sekä muut yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin ja sulfonyyliureoiden kanssa.	15.9.2014
Levokabastiini (silmaan) S01GX02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä.	20.10.2014
Levomepromatsiini N05AA02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, virtsaamisvaikeudet, muistihäiriöt, väsymys, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, takykardia, ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan pidentyminen, riski sydän ja verenkiertotapahtumille ja alttius kaatumisille. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	10.6.2013
Levosetiriitsiini R06AE09		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Voi aiheuttaa väsymystä. Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä jo keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.	23.2.2015
Levotyroksiini H03AA01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset alumiinin, magnesiumin, kalsiumin ja raudan kanssa.	19.5.2014
Linagliptiini A10BH05		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä.	7.4.2014

<b>Lisinopriili</b> C09AA03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa. Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio, etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
<b>Lisinopriili ja diureetit</b> C09BA03	<i>Lisinopriili</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa. Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio, etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	<i>Hydroklooritiatsidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	8.1.2015
<b>Lisproinsuliini</b> (lyhytvaikutteinen) A10AB04		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hypoglykemian välttäminen keskeistä.	12.3.2014
<b>Lisproinsuliini</b> (pitkävaikutteinen) A10AC04		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hypoglykemian välttäminen keskeistä.	12.3.2014
<b>Lisproinsuliini</b> (sekoite) A10AD04		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Hypoglykemian välttäminen keskeistä.	12.3.2014
<b>Litium</b> N05AN01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Serotonerginen. Kapea terapeuttilinen leveys. Seuraa lääkepitoisuutta. Älä käytä munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat uneliaisuus, vapina, pahoinvointi, oksentelu, ripuli, lihasheikkous, ataksia ja kouristukset sekä häiriöt kilpirauhasen ja lisäkilpirauhasen toiminnassa. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Huomioi yhteisvaikutukset erityisesti tulehduskipulääkkeiden, ACE-estäjien ja diureettien kanssa.	10.6.2013
<b>Lodoksamidi</b> (silmiin) S01GX05		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä.	20.10.2014
<b>Loperamidi</b> A07DA03		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Akuutin ripulin hoitoon korkeintaan kahden vuorokauden ajan. Greippi voi tehostaa hoidon vaikutusta. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	12.3.2014
<b>Loperamidi, yhdistelmävalmisteet</b> A07DA53	<i>Loperamidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Akuutin ripulin hoitoon korkeintaan kahden vuorokauden ajan. Greippi voi tehostaa hoidon vaikutusta. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	12.3.2014
	<i>Simetikoni</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	12.3.2014
<b>Loratadiini</b> R06AX13		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Voi aiheuttaa väsymystä. Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.	23.2.2015

<b>Loratsepaami</b> N05BA06		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Aiheuttaa riippuvuutta. Soveltuu vain lyhytaikaiseen käyttöön. Unettomuuden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Altistaa kaatumisille, liikenneonnettomuuksille ja muistihäiriöille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.	13.3.2015
<b>Losartaani</b> C09CA01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa lääkeshoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
<b>Losartaani ja diureetit</b> C09DA01	<i>Losartaani</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa lääkeshoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	<i>Hydroklooritiatsidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	8.1.2015
<b>Lovastatiini</b> C10AA02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Lihaskivut ja lihasheikkous mahdollisia haittoja. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	8.1.2015
<b>Lymesykliini</b> J01AA04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosväliä pidennettävä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset. Vältettävä altistumista auringonvalolle.	18.8.2014
<b>Magnesium</b> A02AA04		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Annosta pienennettävä munuaisten vajaatoiminnassa. Ei sovi iäkkäiden laksatiiviksi eikä antasidiksi, käytä turvallisempia vaihtoehtoja. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	13.1.2014
<b>Magnesium</b> G04BX01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Annosta pienennettävä munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	20.10.2014
<b>Maitohappobakteerit</b> A07FA01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	12.3.2014
<b>Makrogoli</b> A06AD15	<i>Makrogoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Sopii pitkäaikaiskäyttöön.	12.3.2014
<b>Makrogoli, yhdistelmävalmisteet</b> A06AD65	<i>Makrogoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Sopii pitkäaikaiskäyttöön.	12.3.2014
	<i>Muut aineosat</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	3.12.2013

<b>Medroksi-progesteroni ja estrogeeni</b> G03FA12	<i>Medroksi-progesteroni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset. Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.	3.6.2014
	<i>Estrogeeni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä systeemisesti.</b> Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset. Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.	3.6.2014
<b>Medroksi-progesteroni ja estrogeeni</b> G03FB06	<i>Medroksi-progesteroni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset. Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.	3.6.2014
	<i>Estrogeeni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä systeemisesti.</b> Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset. Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.	3.6.2014
<b>Mefenaamihappo</b> M01AG01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi lisääntynyt ruuansulatuskanavan vuotojen ja sydän- ja verisuonitapahtumien riski. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenhiyytymistä estävien valmisteiden kanssa. Muista, että tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	10.11.2014
<b>Meklotsiini</b> R06AE05		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus, muistihäiriöt, väsymys, uneliaisuus, ortostaattinen hypotensio ja alttius kaatumisille. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	10.6.2013
<b>Melatoniini</b> N05CH01		<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Unettomuuden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Bentsodiatsepiineihin tai niiden kaltaisiin lääkkeisiin verrattuna haitat vähäisempiä.	13.3.2015
<b>Meloksikaami</b> M01AC06		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi lisääntynyt ruuansulatuskanavan vuotojen ja sydän- ja verisuonitapahtumien riski. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenhiyytymistä estävien valmisteiden kanssa. Muista, että tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	10.11.2014
<b>Melperoni</b> N05AD03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Käyttö altistaa ekstrapyramidaalioireille, kaatumisille ja sydän- ja verenkiertotapahtumille. Dementian käyttöoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensi-sijaisia. Käytä pientä annosta ja arvioi säännöllisesti lääkeshoidon tarve.	13.3.2015

<b>Memantiini</b> N06DX01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutukset. Antikolinergiset lääkeaineet heikentävät Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	10.11.2014
<b>Mesalatsiini</b> A07EC02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.	12.3.2014
<b>Metadoni</b> N07BC02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Opioidi, jonka vaikutus iäkkäillä on erityisen pitkä. Huomioi yhteisvaikutukset.	15.09.2014
<b>Metenamiini</b> J01XX05		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Älä käytä keskivaikeassa tai vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Hyödytön katetroiduilla potilailla.	18.8.2014
<b>Metformiini</b> A10BA02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosta pienennettävä jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa tai kudoshypoksiassa. Huomioi maitohappoasidoosin riski. Tauota kuumeen, gastroenteriitin tai dehydraation yhteydessä sekä ennen leikkausta tai varjoainekuvausta. Voi heikentää B12-vitamiinin imeytymistä.	12.3.2014
<b>Metformiini ja linagliptiini</b> A10BD11	<i>Metformiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosta pienennettävä jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa tai kudoshypoksiassa. Huomioi maitohappoasidoosin riski. Tauota kuumeen, gastroenteriitin tai dehydraation yhteydessä sekä ennen leikkausta tai varjoainekuvausta. Voi heikentää B12-vitamiinin imeytymistä.	12.3.2014
	<i>Linagliptiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä.	7.4.2014
<b>Metformiini ja pioglitatsoni</b> A10BD05	<i>Metformiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosta pienennettävä jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa tai kudoshypoksiassa. Huomioi maitohappoasidoosin riski. Tauota kuumeen, gastroenteriitin tai dehydraation yhteydessä sekä ennen leikkausta tai varjoainekuvausta. Voi heikentää B12-vitamiinin imeytymistä.	12.3.2014
	<i>Pioglitatsoni</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Ei sovellu osteoporoosia, sydämen tai maksan vajaatoimintaa sairastaville. Huomioi nesteretention ja anemian riski. Saattaa lisätä riskiä virtsarakkosyöpään.	7.4.2014



<b>Metformiini ja saksagliptiini</b> A10BD10	<i>Metformiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosta pienennettävä jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa tai kudoshypoksiassa. Huomioi maitohapposidoosin riski. Tauota kuumeen, gastroenteriitin tai dehydraation yhteydessä sekä ennen leikkausta tai varjoainekuvausta. Voi heikentää B12-vitamiinin imeytymistä.	12.3.2014
	<i>Saksagliptiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä maksan vajaatoiminnassa. Huomioi perifeerisen nesteretention vaara. Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä.	7.4.2014
<b>Metformiini ja sitagliptiini</b> A10BD07	<i>Metformiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosta pienennettävä jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa tai kudoshypoksiassa. Huomioi maitohapposidoosin riski. Tauota kuumeen, gastroenteriitin tai dehydraation yhteydessä sekä ennen leikkausta tai varjoainekuvausta. Voi heikentää B12-vitamiinin imeytymistä.	12.3.2014
	<i>Sitagliptiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä maksan vajaatoiminnassa. Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä.	7.4.2014
<b>Metformiini ja vildagliptiini</b> A10BD08	<i>Metformiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosta pienennettävä jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa tai kudoshypoksiassa. Huomioi maitohapposidoosin riski. Tauota kuumeen, gastroenteriitin tai dehydraation yhteydessä sekä ennen leikkausta tai varjoainekuvausta. Voi heikentää B12-vitamiinin imeytymistä.	12.3.2014
	<i>Vildagliptiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä maksan vajaatoiminnassa. Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä.	7.4.2014
<b>Metoklopramidi</b> A03FA01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Serotonerginen. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat ekstrapyramidaalioireet ja sekavuus. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin antipsykoottien ja dopamiiniagonistien kuten levodopan kanssa.	13.5.2013
<b>Metoprololi</b> C07AB02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Haittavaikutuksena bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset, erityisesti sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	19.12.2014

<b>Metoprololi ja tiatsidit</b> C07BB02	<i>Metoprololi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Haittavaikutuksena bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset, erityisesti sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	19.12.2014
	<i>Hydroklooritiatsidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	19.12.2014
<b>Metotreksaatti</b> L04AX03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Munuaistoksinen aine, joten annosta pienennettävä jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa ja käyttöä tulee välttää vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	15.9.2014
<b>Metronidatsoli</b> (emättimeen) G01AF01	<i>Metronidatsoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Huomioi mahdollinen yhteisvaikutus varfariinin kanssa. Ei alkoholin käyttöä hoidon aikana.	12.3.2014
	<i>Nystatiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Ei kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia.	2.10.2014
<b>Metronidatsoli</b> (iholle) D06BX01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Huomioi mahdollinen yhteisvaikutus varfariinin kanssa.	7.4.2014
<b>Metronidatsoli</b> (suun kautta) P01AB01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Alkoholinkäyttöä vältettävä hoidon aikana ja vuorokausi hoidon jälkeen. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin varfariinin ja sulfonyyliureoiden kanssa. Voi aiheuttaa makuhäiriöitä ja värjätä virtsan tummaksi.	10.11.2014
<b>Metyyliprednisoloni</b> H02AB04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Glukokortikoidien haittavaikutukset korostuvat pitkäaikaiskäytössä. Huomioi yhteisvaikutukset.	19.5.2014
<b>Metyyliprednisoloni</b> (iholle) D07AC14		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset sekä systeeminen imeytyminen.	7.4.2014
<b>Mianseriini</b> N06AX03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. Huomioi yhteisvaikutukset.	13.3.2015
<b>Midatsolaami</b> N05CD08		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Lyhytvaikutteinen bentsodiatsepiini, jolle kehittyy toleranssi. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, väsymys, rebound-unettomuus, muistihäiriöt sekä alttius kaatumisille ja liikenneonnettomuuksille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	10.6.2013
<b>Mikonatsoli</b> (emättimeen) G01AF04		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Huomioi mahdolliset yhteisvaikutukset erityisesti varfariinin kanssa.	3.6.2014
<b>Mikonatsoli</b> (iholle) D01AC02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Paikallisesti käytettynä imeytyy limakalvolta ja rikkoutuneelta iholta. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin varfariinin kanssa. Vaihtoehto nystatiini.	7.4.2014

<b>Mikonatsoli</b> (oraaligeeli) A01AB09		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Imeytyminen elimistöön lisääntyy limakalvoilta ja rikkoutuneelta iholta. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin varfariinin ja fentanyylin kanssa. Turvallisempi vaihtoehto nystatiini.	13.1.2014
<b>Mikonatsoli/ tiokonatsoli/ ekonatsoli ja hydrokortisoni</b> (iholle) D01AC20	<i>Mikonatsoli</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Paikallisesti käytettynä imeytyy limakalvolta ja rikkoutuneelta iholta. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin varfariinin ja fentanyylin kanssa.	7.4.2014
	<i>Tiokonatsoli/ Ekonatsoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
	<i>Hydrokortisoni/ Triamsinoloni</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014
<b>Milnasipraani</b> N06AX17		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Serotonerginen. Huomioi yhteisvaikutukset.	13.3.2015
<b>Mirabegroni</b> G04BD12		<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.</b> Virtsatiespasmolyytti, jolla ei ole antikolinergisia sivuvaikutuksia. Käyttökokemus iäkkäillä kuitenkin vähäistä. Eliminaatio heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutukset.	20.10.2014
<b>Mirtatsapiini</b> N06AX11		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. Huomioi yhteisvaikutukset. Sopii pienellä annoksella unettomuuden hoitoon.	13.3.2013
<b>Moklobemidi</b> N06AG02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Serotonerginen. Huomioi masennuksen lääkkeettömät hoitomuodot. Huomioi yhteisvaikutukset. Pitkä siirtymäaika on tarpeen masennuslääkettä vaihdettaessa.	13.3.2015
<b>Moksifloksasiini</b> J01MA14		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Voi pidentää QTc-aikaa. Voi aiheuttaa huimausta hoidon alkuvaiheessa. Lisää riskiä jännetulehdukselle. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset sekä muut yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin ja sulfonyyliureoiden kanssa.	15.9.2014
<b>Moksonidiini</b> C02AC05		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat päänsärky, uneliaisuus ja unihäiriöt. Vahvistaa keskushermoston toimintaa lamaavien lääkkeiden vaikutusta. Huomioi yhteisvaikutukset myös beetasalpaajien kanssa.	13.5.2013
<b>Mometasoni</b> (nenään) R01AD09		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	8.1.2015
<b>Mometasoni</b> (keuhkoihin) R03BA07		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pitkäaikainen, suuriannoksinen käyttö voi aiheuttaa systeemisiä vaikutuksia. Muistuta suun huuhtomisesta lääkkeenoton jälkeen. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin tiettyjen sienilääkkeiden kanssa.	23.2.2015
<b>Mometasoni</b> (iholle) D07AC13		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi haitalliset paikalliset vaikutukset sekä systeeminen imeytyminen.	7.4.2014

<b>Montelukasti</b> R03DC03		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Vältä greipin käyttö hoidon aikana.	23.2.2015
<b>Morfiini</b> N02AA01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Vahva opioidi. Titraa annos vasteen mukaan. Pienennä aloitusannosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa ja dialyysipotilailla. Aloita laksatiivi ummetuksen ehkäisyyn.	15.9.2014
<b>Nabumetoni</b> M01AX01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi lisääntynyt ruuansulatuskanavan vuotojen ja sydän- ja verisuonitapahtumien riski. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenhiyytymistä estävien valmisteiden kanssa. Muista, että tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	10.11.2014
<b>Naprokseeni</b> M01AE02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi lisääntynyt ruuansulatuskanavan vuotojen ja sydän- ja verisuonitapahtumien riski. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenhiyytymistä estävien valmisteiden kanssa. Muista, että tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	10.11.2014
<b>Natamysiini</b> (iholle) D01AA02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	2.10.2014
<b>Natriumdokusaatti ja yhdistelmävalmisteet</b> A06AG10	<i>Natrium-dokusaatti</i> <i>Sorbitoli</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Tilapäiseen käyttöön.	13.5.2013
		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
<b>Natriumpikosulfaatti</b> A06AB08		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa käytössä suolilaman riski.	13.5.2013
<b>Natriumpikosulfaatti ja yhdistelmävalmisteet</b> A06AB58	<i>Magnesium</i>  <i>Natrium-pikosulfaatti</i>  <i>Muut aineosat</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset. Ei sovi iäkkäiden antasidiksi.	13.5.2013
		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa käytössä suolilaman riski.	13.5.2013
		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
<b>Nebivololi</b> C07AB12		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksena bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi lääkemetsabolian yhteisvaikutukset sekä yhteisvaikutukset sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	19.12.2014
<b>Neomysiini</b> (iholle) D06AX04		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallisesti käytettynä imeytyy limakalvolta ja rikkoutuneelta iholta. Vain lyhytaikaiseen hoitoon rajoitetulle ihoalueelle.	2.10.2014

<b>Nifedipiini</b> C08CA05		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pitkävaikutteiset valmisteet sopivat iäkkäille. Älä käytä lyhytvaikutteisia valmisteita. Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	19.12.2014
<b>Nilvadipiini</b> C08CA10		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	19.12.2014
<b>Nisoldipiini</b> C08CA07		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	19.12.2014
<b>Nitratsepaami</b> N05CD02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pitkävaikutteinen bentsodiatsepiini, jolle kehittyä toleranssi. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, väsymys, muistihäiriöt sekä alttius kaatumisille ja liikenneonnettomuuksille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.	10.6.2013
<b>Nitrofurantoiini</b> J01XE01	<i>Nitrofurantoiini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Älä käytä keskivaikeassa tai vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat keuhkotulehdus, keuhkofibroosi ja perifeerinen neuropatia.	13.5.2013
	<i>C-vitamiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
<b>Noretisteroni ja estrogeeni</b> G03FB05	<i>Noretisteroni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset. Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.	3.6.2014
	<i>Estrogeeni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä systeemisesti (luokka D).</b> Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset. Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.	3.6.2014
<b>Noretisteroni ja estrogeeni</b> G03FA01	<i>Noretisteroni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset. Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.	3.6.2014
	<i>Estrogeeni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä systeemisesti (luokka D).</b> Systeemisessä käytössä huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset. Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.	3.6.2014

Norfloksasiini J01MA06		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosta pienennettävä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Voi pidentää QTc-aikaa. Voi aiheuttaa huimausta hoidon alkuvaiheessa. Lisää riskiä jännetulehdukselle. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset sekä muut yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin ja sulfonyyliureoiden kanssa.	15.9.2014
Nortriptyliini N06AA10		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, virtsaamisvaikeudet, sekavuus, muistihäiriöt, väsymys, vapina, takykardia, ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan pidentyminen, serotoniinisyndrooma ja alttius kaatumisille. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa. Käyttö mahdollista pienellä annoksella neuroopaattisen kivun hoidossa.	10.6.2013
Nystatiini A07AA02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Ei kliinisesti merkittäviä yhteisvaikutuksia.	12.3.2014
Ofloksasiini J01MA01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Ofloksasiinin eliminaatio heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Voi pidentää QTc-aikaa. Voi aiheuttaa huimausta hoidon alkuvaiheessa. Lisää riskiä jännetulehdukselle. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset sekä muut yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin ja sulfonyyliureoiden kanssa.	15.9.2014
Oksatsepaami N05BA04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Aiheuttaa riippuvuutta. Soveltuu vain lyhytaikaiseen käyttöön. Unettomuuden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Altistaa kaatumisille, liikenneonnettomuuksille ja muistihäiriöille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.	13.3.2015
Oksibutiniini G04BD04		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	13.5.2013
Oksikodoni N02AA05		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Vahva opioidi. Titraa annos vasteen mukaan. Pienennä aloitusannosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Aloita laksatiivi ummetuksen ehkäisyyn. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	15.9.2014
Okskarbatsepiini N03AF02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Runsaasti haittavaikutuksia, kuten muutokset verenkuvassa, maksavaurio ja hyponatremia. Pitkäaikaisessa käytössä huomioitava D-vitamiinilisän tarve.	15.9.2014

<b>Olantsapiini</b> N05AH03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. Käyttö altistaa ekstrapyramidaalioireille, kaatumisille ja sydän- ja verenkiertotapahtumille. Dementian käyttöoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Käytä pientä annosta ja arvioi säännöllisesti lääkehoidon tarve.	13.3.2015
<b>Olmesartaani</b> C09CA08		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
<b>Olmesartaani ja hydroklooritiatsidi</b> C09DA08	<i>Olmesartaani</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	<i>Hydroklooritiatsidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	8.1.2015
<b>Olopatadiini</b> (silmiin) S01GX09		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä.	20.10.2014
<b>Omepratsoli</b> A02BC01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Käytön tarpeellisuus arvioitava säännöllisesti. Pitkäaikaiskäytössä voi heikentää kalsiumin ja B12-vitamiinin imeytymistä. Enterorakenteen rikkominen vie lääkkeen tehon.	12.3.2014
<b>Ondansetroni</b> A04AA01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	12.3.2014
<b>Opiumjohdokset ja ekspektorantit, lukuun ottamatta mukolyyttejä</b> R05FA02	<i>Efedriini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutukset. Älä käytä iskeemistä sydänsairautta sairastavilla. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat unettomuus, vapina, palpitaatio, kohonnut verenpaine ja virtsaretentio.	19.8.2014
	<i>Difenhydramiini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutukset. Epäselektiivinen väsyttävä antihistamiini. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat ummetus, virtsaretentio, muistihäiriöt ja sydämen rytmihäiriöt.	19.8.2014
	<i>Kodeiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Heikko opioidi, jolle kehittyy toleranssi. Pienennä aloitusannosta lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Osalla henkilöistä vaste normaalia heikompi tai voimakkaampi perinnöllisistä eroista johtuen. Aloita laksatiivi ummetuksen ehkäisyyn. Huomioi yhteisvaikutukset, sillä useat lääkkeet heikentävät kodeiinin tehoa.	15.9.2014

	<i>Ammoniukloridi</i> <i>Muut aineosat</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	10.6.2013
		<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.</b>	10.6.2013
<b>Orfenadriini</b> M03BC01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	13.5.2013
<b>Orfenadriini ja parasetamoli</b> M03BC51	<i>Orfendriini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	13.5.2013
	<i>Parasetamoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Säännöllisessä käytössä korkeintaan 3 grammaa vuorokaudessa. Yliannos maksatoksinen. Huomioi verenvuotoriski yhteiskäytössä varfariinin kanssa, kun parasetamoliannos säännöllisessä käytössä yli 2 grammaa vuorokaudessa. Yhteiskäyttö varfariinin kanssa mahdollista seuraamalla INR-arvoja. Huomioi itsehoito- ja yhdistelmävalmisteiden sisältämä parasetamoli.	15.9.2014
<b>Pamidronaatti</b> M05BA03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Ei vuodepotilaille. Potilaan tulee pystyä ottamaan lääke riittävän vesimäärän kera ja olemaan puoli tuntia pystyasennossa lääkkeenoton jälkeen. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Käyttöaikausitus 5 vuotta. Huomioi yhteisvaikutukset kalsiumin, raudan, magnesiumin ja alumiinin kanssa.	10.11.2014
<b>Pantopratsoli</b> A02BC02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Käytön tarpeellisuus arvioitava säännöllisesti. Pitkäaikaiskäytössä voi heikentää kalsiumin ja B12-vitamiinin imeytymistä. Enterorakenteen rikkominen vie lääkkeen tehon.	12.3.2014
<b>Parasetamoli</b> N02BE01	<i>Parasetamoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Säännöllisessä käytössä korkeintaan 3 grammaa vuorokaudessa. Yliannos maksatoksinen. Huomioi verenvuotoriski yhteiskäytössä varfariinin kanssa, kun parasetamoliannos säännöllisessä käytössä yli 2 grammaa vuorokaudessa. Yhteiskäyttö varfariinin kanssa mahdollista seuraamalla INR-arvoja. Huomioi itsehoito- ja yhdistelmävalmisteiden sisältämä parasetamoli.	15.9.2014
	<i>C-vitamiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	15.9.2014
	<i>Kofeiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	15.9.2014
<b>Paroksetiini</b> N06AB05		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Serotonerginen. Haittavaikutuksena ovat mm. hyponatremia ja verenvuotoriskin lisääntyminen. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	13.3.2015
<b>Pensikloviiri</b> (iholle) D06BB06		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	7.4.2014



<b>Pentoksifylliini</b> C04AD03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Pidennä annosväliä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Teho on vaatimaton ja lääkkeellä on paljon haittavaikutuksia.	13.5.2013
<b>Perfenatsiini</b> N05AB03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, virtsaamisvaikeudet, muistihäiriöt, väsymys, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, takykardia, ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan pidentyminen, riski sydän- ja verenkiertotapahtumille ja alttius kaatumisille. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeitömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	10.6.2013
<b>Perindopriili</b> C09AA04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa. Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio, etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
<b>Perindopriili ja amlodipiini</b> C09BB04	<i>Perindopriili</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa. Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio, etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	<i>Amlodipiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	8.1.2015
<b>Perindopriili ja diureetit</b> C09BA04	<i>Perindopriili</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa. Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio, etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	<i>Indapamidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho menetään vaikeassa munuaisten vajaatoimissa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	8.1.2015
<b>Perisatsiini</b> N05AC01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, virtsaamisvaikeudet, muistihäiriöt, väsymys, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, takykardia, ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan pidentyminen, riski sydän- ja verenkiertotapahtumille ja alttius kaatumisille. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeitömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	10.6.2013

<b>Pilokarpiini</b> (silmaan) S01EB01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä.	20.10.2014
<b>Pindololi</b> C07AA03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Epäselektiivinen beetasalpaaja. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat unihäiriöt, masennus ja lihaskivertäisyys. Huomioi yhteisvaikutukset, erityisesti sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	13.5.2015
<b>Pioglitatsoni</b> A10BG03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Ei sovellu osteoporoosia, sydämen tai maksan vajaatoimintaa sairastaville. Huomioi nesteretention ja anemian riski. Saattaa lisätä riskiä virtsarakkosyöpään.	7.4.2014
<b>Piroksikaami</b> (iholle) M02AA07		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Käyttöohjeen mukaisesti iholle käytettynä systeeminen imeytyminen vähäistä.	10.11.2014
<b>Pitofenoni ja metamiitsoli</b> A03DA02	<i>Pitofenoni</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	13.5.2013
	<i>Metamiitsoli</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Epäselektiivinen tulehduskipulääke, jolla on havaittu tavanomaisten tulehduskipulääkkeiden haittavaikutusten lisäksi luuydinsuppressiota ja agranulosytoosia. Poistuminen hidastunut munuaisten vajaatoiminnassa.	13.5.2013
<b>Pivmesillinaami</b> J01CA08		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosväliä pidennettävä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.	18.8.2014
<b>Pramipeksoli</b> N04BC05		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Hoidon aloitus erikoislääkärin toimesta. Pienennä annosta jo keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Runsaasti haittavaikutuksia mm. ortostaattinen hypotensio, GI-kanavan oireita ja psyykkisiä haittavaikutuksia, kuten unihäiriöitä, hallusinaatioita, levottomuutta ja äkillistä nukahtelua. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin psykoosilääkkeiden kanssa.	1.4.2015
<b>Pratsosiini</b> C02CA01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat ortostaattinen hypotensio, huimaus, väsymys ja näköhäiriöt.	13.5.2013
<b>Pravastatiini</b> C10AA03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Lihaskivut ja lihaskivertäisyys mahdollisia haittoja.	8.1.2015
<b>Prednisoloni</b> (rektaalinen) C05AA04	<i>Prednisoloni</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	3.12.2013
	<i>Sinkokaiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	3.12.2013
<b>Prednisoloni</b> (suun kautta) H02AB06		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Glukokortikoidien haittavaikutukset korostuvat pitkäaikaiskäytössä. Huomioi yhteisvaikutukset.	19.5.2014
<b>Prednisoni</b> (suun kautta) H02AB07		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Glukokortikoidien haittavaikutukset korostuvat pitkäaikaiskäytössä. Huomioi yhteisvaikutukset.	19.5.2014

<b>Pregabaliini</b> N03AX16		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Voi pidentää QTc-aikaa. Runsaasti keskushermostoon kohdistuvia haittavaikutuksia. Riippuvuuden kehittyminen mahdollista. Käyttö lopetettava asteittain.	15.9.2014
<b>Proklooriperatsiini</b> N05AB04		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, virtsaamisvaikeudet, muistihäiriöt, väsymys, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, takykardia, ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan pidentyminen, riski sydän- ja verenkiertotapahtumille ja alttius kaatumisille. Dementian käyttöoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	10.6.2013
<b>Propranololi</b> C07AA05		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Epäselektiivinen beetasalpaaja. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat unihäiriöt, masennus ja lihasheikkous. Huomioi yhteisvaikutukset, erityisesti sydämen johtoratasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa.	13.5.2015
<b>Pseudoefedriini, yhdistelmävalmisteet</b> R01BA52	<i>Pseudoefedriini</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Tarvittaessa vain lyhytaikaiseen käyttöön (<10 vrk). Harvenna ottoväliä jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Lisää sympatomiteettistä vaikutusta. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin MAO-estäjien ja sympatomimeettisten aineiden kanssa.	23.2.2015
	<i>Setiritsiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Voi aiheuttaa väsymystä. Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä jo keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.	23.2.2015
	<i>Akrivastiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Voi aiheuttaa väsymystä. Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.	23.2.2015
	<i>Desloratadiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Voi aiheuttaa väsymystä. Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.	23.2.2015
<b>Rabepratsoli</b> A02BC04		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Käytön tarpeellisuus arvioitava säännöllisesti. Pitkäaikaiskäytössä voi heikentää kalsiumin ja B12-vitamiinin imeytymistä. Enterorakenteen rikkominen vie lääkkeen tehon.	12.3.2014
<b>Ramipriili</b> C09AA05		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa. Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio, etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015

Ramipriili ja diureetit C09BA05	Ramipriili	C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa. Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio, etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	Hydroklooritiatsidi	A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	8.1.2015
Ramipriili ja felodipiini C09BB05	Ramipriili	C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa. Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio, etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	Felodipiini	A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	19.12.2014
Ranitidiini A02BA02		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Iäkkäät ovat alttiita harvinaisille haittavaikutuksille, kuten päänsärylle, huimaukselle, mahasuolikanavan oireille ja sekavuudelle.	12.3.2014
Rasagiliini N04BD02		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Yleisiä haittavaikutuksia ovat masennus, aistiharhat, päänsärky, huimaus, allergia, angina pectoris ja muskuloskeetaaliset kivut. Yhteiskäyttöön SSRI- ja SNRI-lääkkeiden, trisyklisten ja tetrasyklisten masennuslääkkeiden kanssa liittyy serotoniinisyndrooman riski, joka käytännössä on kuitenkin vähäinen. Huomioi lääkkeen käytön vasta-aiheet.	7.5.2015
Rautavalmisteet B03A		A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	19.5.2014
Reboksetiini N06AX18		B	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.</b> Antikolinerginen. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	13.3.2015
Repaglinidi A10BX02		D	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	7.4.2014
Retinoli (silmiin) S01XA02		A	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä.	20.10.2014
Risedronaatti M05BA07		C	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Ei vuodepotilaille. Potilaan tulee pystyä ottamaan lääke riittävän vesimäärän kera ja olemaan puoli tuntia pystyasennossa lääkkeenoton jälkeen. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Käyttöaikausitus 5 vuotta. Huomioi yhteisvaikutukset kalsiumin, raudan, magnesiumin ja alumiinin kanssa.	10.11.2014

<b>Risperidoni</b> N05AX08		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Serotonerginen. Käyttö altistaa ekstrapyramidaalioireille, kaatumisille ja sydän- ja verenkiertotapahtumille. Dementian käyttöoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Pienenä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Käytä pientä annosta ja arvioi säännöllisesti lääkehoidon tarve.	13.3.2015
<b>Rivaroksabaani</b> B01AF01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä. Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittävin haittavaikutus verenvuotoriskin lisääntyminen. Huomioi yhteisvaikutukset. Ei tunnettua vastavaikuttajaa (antidoottia).	19.5.2014
<b>Rivastigmiini</b> N06DA03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Altistaa sydämen johtumishäiriöille. Huomioi seuranta erityisesti sairas sinus -oireyhtymässä ja sydämen harvavyöntisyydessä. Voi vaikeuttaa ahtauttavaa keuhkosairautta. Huomioi ruoansulatuskanavaan kohdistuvat haitat. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin syketaajuutta laskevien lääkkeiden kanssa. Antikolinergiset lääkkeet heikentävät Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	10.11.2014
<b>Roksitromysiini</b> J01FA06		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Voi pidentää QTc-aikaa. Huomioi yhteisvaikutus varfariinin kanssa.	18.8.2014
<b>Ropiniroli</b> N04BC04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Hoidon aloitus erikoislääkärin toimesta. Runsaasti haittavaikutuksia mm. ortostaattinen hypotensio, GI-kanavan ongelmia ja psyykkisiä haittavaikutuksia, kuten unihäiriöitä, hallusinaatioita, levottomuutta ja äkillistä nukahtelua. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin psykoosilääkkeiden kanssa.	1.4.2015
<b>Rosuvastatiini</b> C10AA07		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Lihaskivut ja lihasheikkous mahdollisia haittoja. Alumiinin ja magnesiumin samanaikainen käyttö heikentää lääkkeen tehoa. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	8.1.2015
<b>Rotigotiini</b> N04BC09		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Serotonerginen. Hoidon aloitus erikoislääkärin toimesta. Runsaasti haittavaikutuksia mm. ortostaattinen hypotensio, GI-kanavan ongelmia ja psyykkisiä haittavaikutuksia, kuten unihäiriöitä, hallusinaatioita, levottomuutta ja äkillistä nukahtelua. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin psykoosilääkkeiden kanssa.	1.4.2015
<b>Saccharomyces boulardii</b> A07FA02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Lääke tuhoutuu yhteiskäytössä sienilääkkeiden kanssa.	12.3.2014
<b>Saksagliptiini</b> A10BH03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä maksan vajaatoiminnassa. Huomioi perifeerisen nesteretention vaara. Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä.	7.4.2014

<b>Salbutamoli</b> (keuhkoihin) R03AC02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Lisää sympatomiteettistä vaikutusta. Voi aiheuttaa hypokalemiaa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sympatomimeettisten aineiden kanssa.	23.2.2015
<b>Salbutamoli ja ipratropiumbromidi</b> R03AL02	<i>Salbutamoli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Lisää sympatomiteettistä vaikutusta. Voi aiheuttaa hypokalemiaa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sympatomimeettisten aineiden kanssa.	23.2.2015
	<i>Ipratropiumbromidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Suurilla annoksilla antikolinergiset haittavaikutukset mahdollisia. Huomioi yhteisvaikutukset muiden antikolinergisten lääkkeiden kanssa.	23.2.2015
<b>Salisyylihappo</b> (iholle) M02AC	<i>Salisyylihappo</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Käyttöohjeen mukaisesti iholle käytettynä systeeminen imeytyminen vähäistä.	10.11.2014
	<i>Muut aineosat</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	10.11.2014
<b>Salmeteroli</b> R03AC12		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Lisää sympatomiteettistä vaikutusta. Voi aiheuttaa hypokalemiaa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sympatomimeettisten aineiden kanssa.	23.2.2015
<b>Salmeteroli ja flutikasoni</b> R03AK06	<i>Salmeteroli</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Lisää sympatomiteettistä vaikutusta. Voi aiheuttaa hypokalemiaa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sympatomimeettisten aineiden kanssa.	23.2.2015
	<i>Flutikasoni</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pitkäaikainen, suuriannoksinen käyttö voi aiheuttaa systeemisiä vaikutuksia. Muistuta suun huuhtomisesta lääkkeenoton jälkeen. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin tiettyjen sienilääkkeiden kanssa.	23.2.2015
<b>Selegiliini</b> N04BD01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Serotonerginen. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Yleisiä haittavaikutuksia ovat masennus, aistiharhat, päänsärky, huimaus, allergia, angina pectoris ja muskuloskeetaaliset kivut. Huomioi lääkkeen käytön vasta-aiheet. Yhteiskäyttöön SSRI- ja SNRI-lääkkeiden, trisyklisten ja tetrasyklisten masennuslääkkeiden kanssa liittyy serotoniinsyndrooman riski, joka käytännössä on kuitenkin vähäinen. Huomioi lääkkeen käytön vasta-aiheet.	7.5.2015
<b>Selekoksibi</b> M01AH01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi lisääntynyt ruansulatuskanavan vuotojen ja sydän- ja verisuonitapahtumien riski. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenhiyttymistä estävien valmisteiden kanssa. Muista, että tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	10.11.2014

<b>Seliprololi</b> C07AB08		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksena bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset, erityisesti sydämen johtorasysteemiin vaikuttavien lääkkeiden kanssa. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	19.12.2014
<b>Sennaglykosidit, yhdistelmävalmisteet</b> A06AB56	<i>Senna</i>	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa käytössä suolilaman riski.	12.3.2014
	<i>Muut aineosat</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Sopii pitkäaikaiskäyttöön. Huolehdittava riittävästä nesteensaannista.	12.3.2014
<b>Sennaglykosidit</b> A06AB06		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Suolta stimuloiva ummetuslääke. Pitkäaikaisessa käytössä suolilaman riski.	13.5.2013
<b>Sertindoli</b> N05AE03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat hypotensio, ortostaattinen hypotensio, ekstrapyramidaalioireet, QTc-ajan pidentyminen, riski sydän ja verenkiertotapahtumille ja alttius kaatumisille. Dementian käyttöoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	10.6.2013
<b>Sertraliini</b> N06AB06		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Serotonerginen. Haittavaikutuksena ovat mm. hyponatremia ja verenvuotoriskin lisääntyminen. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	13.3.2015
<b>Setiritsiini</b> R06AE07		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Voi aiheuttaa väsymystä. Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä jo keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.	23.2.2015
<b>Siklesonidi</b> R03BA08		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Pitkäaikainen, suuriannoksinen käyttö voi aiheuttaa systeemisiä vaikutuksia. Muistuta suun huuhtomisesta lääkkeenoton jälkeen. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin tiettyjen sienilääkkeiden kanssa.	23.2.2015
<b>Sildenafil</b> G04BE03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosta pienennettävä vaikeassa munuaisten tai maksan vajaatoiminnassa. Huomioi haittavaikutukset, kuten hypotensio, ortostaattinen hypotensio, päänsärky ja näköhäiriöt. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin nitraattien ja alfasalpaajien kanssa.	3.6.2014
<b>Silikonit</b> A03AX13		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	12.3.2014
<b>Simvastatiini</b> C10AA01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Lihaskivut ja lihasheikkous mahdollisia haittoja. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	8.1.2015

<b>Simvastatiini ja etsetimibi</b> C10BA02	<i>Simvastatiini</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Lihaskivut ja lihasheikkous mahdollisia haittoja. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	8.1.2015
	<i>Etsetimibi</i>	<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.</b>	8.1.2015
<b>Siprofloksasiini</b> J01MA02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vaikeiden infektioiden hoitoon. Suun kautta otettavat valmisteet: Annosta pienennettävä munuaisten vajaatoiminnassa. Voi pidentää QTc-aikaa. Voi aiheuttaa huimausta hoidon alkuvaiheessa. Lisää riskiä jännetulehdukselle. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset sekä muut yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin ja sulfonyyliureoiden kanssa.	15.9.2014
<b>Sitagliptiini</b> A10BH01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä maksan vajaatoiminnassa. Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä.	7.4.2014
<b>Sitalopraami</b> N06AB04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Serotonerginen. Haittavaikutuksena ovat mm. hyponatremia ja verenvuotoriskin lisääntyminen. Huomioi yhteisvaikutukset.	13.3.2015
<b>Skopolamiini</b> A04AD01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, takykardia, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	13.5.2013
<b>Solifenasiini</b> G04BD08		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Pienennä annosta vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt sekä QTc-ajan pidentyminen ja kääntyvien kärkien takykardia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	13.5.2013
<b>Somatropiini</b> H01AC01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Merkittäviä haittavaikutuksia ovat turvotus, päänsärky, parestesia ja nivelkivut. Käytöstä iäkkäillä vähäisesti näyttöä ja kokemusta.	20.6.2013
<b>Sotaloli</b> C07AA07		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Epäselektiivinen beetasalpaaja. Vakavana haittana QTc-ajan piteneminen. Käyttö edellyttää erikoislääkärin arviota. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksina mm. bradykardia ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	19.12.2014
<b>Spironolaktoni</b> C03DA01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi hyperkalemian riski.	19.12.2014



<b>Strontiumranelaat</b> M05BX03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Huomioi sydän- ja verisuonitapahtumien (valtimo- ja laskimotukokset) lisääntynyt riski. Vakavat, harvinaiset ihoreaktiot mahdollisia.	10.11.2014
<b>Sukralfaatti</b> A02BX02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Voi aiheuttaa neurologisia haittoja. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset.	13.5.2013
<b>Sulfametoksatsoli ja trimetopriimi</b> J01EE01	<i>Sulfa- metoksatsoli</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Suun kautta otettavat valmisteet: Annosväliä pidennettävä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa kolmen käyttöpäivän jälkeen. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin varfariinin ja sulfonyyliureoiden kanssa. Voi voimistaa metotreksaatin vaikutusta.	18.8.2014
	<i>Trimetopriimi</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin varfariinin ja sulfonyyliureoiden kanssa. Voi voimistaa metotreksaatin vaikutusta.	18.8.2014
<b>Sulfasalatsiini</b> A07EC01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Älä käytä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa.	12.3.2014
<b>Sulpiridi</b> N05AL01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Käyttö altistaa ekstrapyramidaalioireille, kaatumisille ja sydän- ja verenkiertotapahtumille. Dementian käyttöoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Käytä pientä annosta ja arvioi säännöllisesti lääkehoidon tarve.	13.3.2015
<b>Syanokobalamiini</b> B03BA01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	19.5.2014
<b>Syklitsiini</b> R06AE03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat sekavuus, väsymys, suun kuivuminen, ummetus, huimaus, palpitaatio, virtsaamisvaikeudet ja alttius kaatumisille. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	10.6.2013
<b>Tadalafiili</b> G04BE08		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosta pienennettävä jo lievässä munuaisten tai maksan vajaatoiminnassa. Huomioi haittavaikutukset, kuten hypotensio, ortostaattinen hypotensio, päänsärky ja näköhäiriöt. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin nitraattien ja alfasalpaajien kanssa. Greippi tehostaa hoidon vaikutusta. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	3.6.2014
<b>Tafluprosti</b> (silmiin) S01EE05		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä. Saattaa aiheuttaa silmän värikalvon pigmenttimuutoksia ja ripsien kasvua.	20.10.2014
<b>Tamsulosiini</b> G04CA02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi haittavaikutukset, kuten huimaus, ortostaattinen hypotensio ja kaatumisriski. Huomioi yhteisvaikutukset verenpainetta alentavien lääkkeiden kanssa.	3.6.2014

Tavanomaiset aluminium/kalsium /magnesiumyhdiste et A02AD01	Magnesium	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset. Ei sovi iäkkäiden antasidiksi.	13.5.2013
	Kalsium	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	13.5.2013
Telitromysiini J01FA15		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Voi pidentää QTc-aikaa. Runsaasti potentiaalisesti vaarallisia yhteisvaikutuksia.	18.8.2014
Telmisartaani C09CA07		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
Telmisartaani ja diureetit C09DA07	Telmisartaani	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	Hydrokloori- tiatsidi	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	8.1.2015
Tematsepaami N05CD07		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Aiheuttaa riippuvuutta. Soveltuu vain lyhytaikaiseen käyttöön. Unettomuuden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Altistaa kaatumisille, liikenneonnettomuuksille ja muistihäiriöille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta.	13.3.2015
Teofylliini R03DA04		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Kapea terapeutinen leveys. Seuraa lääkepitoisuutta. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat mahasuolikanavan oireet, ärtyneisyys, levottomuus, takykardia ja huimaus. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Tupakointi vähentää vaikutusta.	10.6.2013
Teofylliini ja quaifenesiini R03DA54	Teofylliini	<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Kapea terapeutinen leveys. Seuraa lääkepitoisuutta. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat mahasuolikanavan oireet, ärtyneisyys, levottomuus, takykardia ja huimaus. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Tupakointi vähentää vaikutusta.	3.12.2013
	Quaifenesiini	<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.</b>	3.12.2013
Terbinafiini (iholle) D01AE15		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Ohjeen mukaan iholle käytettynä systeeminen imeytyminen vähäistä.	7.4.2014
Terbinafiini (suun kautta) D01BA02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Peroraalista annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin CYP2D6:n kautta metaboloituvien lääkkeiden kanssa. Heikentää kodeiinin vaikutusta.	7.4.2014
Terbutaliini R03AC03		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Lisää sympatomiteettistä vaikutusta. Voi aiheuttaa hypokalemiaa. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin sympatomimeettisten aineiden kanssa.	23.2.2015

<b>Testosteroni</b> G03BA03		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Käyttöä voi harkita kohtalaisessa tai vaikeassa hypogonadismissa. Älä käytä eturauhassyövässä. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat kohonnut verenpaine ja psyykkiset häiriöt. Huomioi yhteisvaikutukset.	20.6.2013
<b>Tetrasykliini</b> J01AA07		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Vältä käyttöä munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset. Vältettävä altistumista auringonvalolle.	18.8.2014
<b>Tiboloni</b> G03CX01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Huomioi haittavaikutukset, kuten sydän- ja verisuonisairauksien sekä laskimotukosten riski. Huomioi yhteisvaikutukset. Vasta-aihe estrogeeniriippuvainen syöpä.	3.6.2014
<b>Tikagrelori</b> B01AC24		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Merkittävin haittavaikutus on verenvuotoriskin lisääntyminen. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Greippi tehostaa hoidon vaikutusta. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	20.10.2014
<b>Timololi</b> (silmään) S01ED01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä. Hoidon aloitus vain silmälääkärin valvonnassa. Huomioi mahdolliset systeemiset haittavaikutukset, erityisesti annosteluvirheen yhteydessä.	20.10.2014
<b>Timololi ja brintsolamidi/ dortsolamidi/ travoprosti/ pilokarpiini</b> (silmään) S01ED51	<i>Timololi</i>	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä. Hoidon aloitus vain silmälääkärin valvonnassa. Huomioi mahdolliset systeemiset haittavaikutukset, erityisesti annosteluvirheen yhteydessä.	20.10.2014
	<i>Brintsolamidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä.	20.10.2014
	<i>Dortsolamidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä. Älä käytä vaikeassa tai loppuvaiheen munuaisten vajaatoiminnassa. Varoen maksan vajaatoimintapotilaille.	20.10.2014
	<i>Travoprosti</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä. Saattaa aiheuttaa silmän värikalvon pigmenttimuutoksia ja ripsien kasvua.	20.10.2014
	<i>Pilokarpiini</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä.	20.10.2014
<b>Tiokonatsoli</b> (iholle) D01AC07		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	2.10.2014
<b>Tiokonatsoli</b> (emättimeen) G01AF08		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	2.10.2014
<b>Tiotropiumbromidi</b> R03BB04		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Suurilla annoksilla antikolinergiset haittavaikutukset mahdollisia. Huomioi yhteisvaikutukset muiden antikolinergisten lääkkeiden kanssa.	23.2.2015

<b>Titsanidiini</b> M03BX02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Annostele vain kerran vuorokaudessa vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat hypotensio, väsymys, QTc-ajan pidentyminen ja sen myötä kääntyvien kärkien takykardia sekä alttius kaatumisille. Huomioi yhteisvaikutukset.	13.5.2013
<b>Tolfenaamihappo</b> M01AG02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Vältä käyttöä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi lisääntynyt ruuansulatuskanavan vuotojen ja sydän- ja verisuonitapahtumien riski. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin verenhiyymistä estävien valmisteiden kanssa. Muista, että tulehduskipulääkkeiden käyttö on yleistä itsehoidossa.	10.11.2014
<b>Tolterodiini</b> G04BD07		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt sekä QTc-ajan pidentyminen ja kääntyvien kärkien takykardia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	13.5.2013
<b>Topiramaatti</b> N03AX11		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Käyttö mahdollista erikoislääkärin valvonnassa. Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Käytettävä varoen potilaille, joilla on maksan toiminnan häiriöitä. Runsaasti keskushermostoon kohdistuvia haittavaikutuksia.	15.9.2014
<b>Tramadoli</b> N02AX02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. Heikko opioidi. Pienennä annosta ja/tai pidennä annosväliä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Aloita laksatiivi ummetuksen ehkäisyyn. Iäkkäät herkittyneitä haittavaikutuksille, kuten sekavuudelle ja painajaisille. Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin serotoniinisyndrooman riski ja varfariinin vaikutuksen voimistuminen. Useat lääkkeet heikentävät tramadolin tehoa.	15.9.2014
<b>Traneksaamihappo</b> B02AA02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Eliminaatio vähenee jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa.	19.5.2014
<b>Tratsodoni</b> N06AX05		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Serotonerginen. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	13.3.2015
<b>Travoprosti</b> (silmään) S01EE04		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Paikallishoitoon silmässä. Saattaa aiheuttaa silmän värikalvon pigmenttimuutoksia ja ripsien kasvua.	20.10.2014
<b>Triamsinoloni</b> R01AD11		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b>	8.1.2015

<b>Triatsolaami</b> N05CD05		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Lyhytvaikutteinen bentsodiatsepiini, jolle kehittyä toleranssi. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat lääkeriippuvuus, väsymys, rebound-unettomuus, muistihäiriöt sekä alttius kaatumisille ja liikenneonnettomuuksille. Voi paradoksaalisesti lisätä ahdistuneisuutta, levottomuutta ja aggressiivisuutta. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	10.6.2013
<b>Trikloorimetriatsidi ja kaliumia säästävät diureetti</b> C03EA02	<i>Trikloorimetriatsidi</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	19.12.2014
	<i>Triamtereeni</i>	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	19.12.2014
<b>Trimetopriimi</b> J01EA01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosta pienennettävä vaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi virtsatieinfektioiden hoitosuosituksen linjaukset. Huomioi yhteisvaikutus varfariinin kanssa.	18.8.2014
<b>Trimipramiini</b> N06AA06		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Serotonerginen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, virtsaamisvaikeudet, sekavuus, muistihäiriöt, väsymys, vapina, takykardia, ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan pidentyminen, serotoniinisyndrooma ja alttius kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	10.6.2013
<b>Trospium</b> G04BD09		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, huimaus, virtsaamisvaikeudet, sekavuus ja muistihäiriöt sekä QTc-ajan pidentyminen ja kääntyvien kärkien takykardia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset.	13.5.2013
<b>Tsafirlukasti</b> R03DC01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi yhteisvaikutukset, etenkin varfariinin ja fenytoiinin kanssa.	23.2.2015
<b>Tsiprasidoni</b> N05AE04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Serotonerginen. Älä käytä dementiaan liittyvien käytöshäiriöiden hoidossa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, virtsaamisvaikeudet, muistihäiriöt, väsymys, sekavuus, ekstrapyramidaali-oireet, takykardia, ortostaattinen hypotensio ja alttius kaatumisille. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	20.6.2013

<b>Tsofenopriili</b> C09AA15		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Pienennä annosta munuaisten vajaatoiminnassa. Seuraa munuaisten toimintaa. Haittavaikutuksena ortostaattinen hypotensio, etenkin hoidon aloittamisen yhteydessä. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
<b>Tsolpideemi</b> N05CF02		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Sedatiivinen. Aiheuttaa riippuvuutta. Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Unettomuuden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Altistaa kaatumisille, liikenneonnettomuuksille ja muistihäiriöille.	13.3.2015
<b>Tsopikloni</b> N05CF01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Aiheuttaa riippuvuutta. Vain lyhytaikaiseen käyttöön. Unettomuuden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Altistaa kaatumisille, liikenneonnettomuuksille ja muistihäiriöille. Voi aiheuttaa metallinmakua suuhun.	13.3.2015
<b>Tsuklopentiksoli</b> N05AF05		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Antikolinerginen. Sedatiivinen. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat suun kuivuminen, ummetus, virtsaamisvaikeudet, muistihäiriöt, väsymys, sekavuus, ekstrapyramidaalioireet, takykardia, ortostaattinen hypotensio, QTc-ajan pidentyminen, riski sydän ja verenkiertotapahtumille ja alttius kaatumisille. Dementian käytösoireiden hoidossa lääkkeettömät hoitomuodot ovat ensisijaisia. Huomioi runsaat yhteisvaikutukset. Heikentää Alzheimerin taudin lääkkeiden tehoa.	10.6.2013
<b>Ursodeoksikooli-happo</b> A05AA02		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Huomioi imeytymisvaiheen yhteisvaikutukset. Seuraa maksa-arvoja.	12.3.2014
<b>Valasikloviiri</b> J05AB11		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Valasikloviirin eliminaatio heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi yhteisvaikutus teofylliinin kanssa.	18.8.2014
<b>Valerianae radix</b> N05CM09		<b>B</b>	<b>Tutkimusnäyttö, käyttökokemus tai teho vähäistä.</b>	13.3.2015
<b>Valproiinihappo</b> N03AG01		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Sedatiivinen. Matala seerumin albumiinipitoisuus voimistaa lääkevastetta. Runsaasti haittavaikutuksia, kuten muutokset verenkuvassa ja maksavaurion riski.	15.9.2014

Valsartaani C09CA03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
Valsartaani ja amlodipiini C09DB01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	8.1.2015
Valsartaani ja amlodipiini C09DB01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	8.1.2015
Valsartaani ja amlodipiini C09DB01		<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	8.1.2015
Valsartaani ja amlodipiini C09DB01	Valsartaani	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	Amlodipiini	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	8.1.2015
Valsartaani ja diureetit C09DA03	Valsartaani	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	Hydrokloori- tiatsidi	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	8.1.2015
Valsartaani, amlodipiini ja hydroklooritiatsidi C09DX01	Valsartaani	<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Varmista asianmukainen nestetasapaino ennen hoidon aloittamista. Seuraa munuaisten toimintaa lääkehoidon aikana. Vältä tulehduskipulääkkeiden samanaikaista käyttöä.	8.1.2015
	Amlodipiini	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Haittavaikutuksena mm. nilkkaturvotus ja ortostaattinen hypotensio. Huomioi yhteisvaikutukset. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	8.1.2015
	Hydrokloori- tiatsidi	<b>A</b>	<b>Sopii iäkkäille.</b> Teho heikkenee munuaisten vajaatoiminnassa. Huomioi ortostaattisen hypotonian ja elektrolyyttihäiriöiden mahdollisuus.	8.1.2015

<b>Vardenafiili</b> G04BE09		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Huomioi haittavaikutukset, kuten huimaus, hypotensio, ortostaattinen hypotensio, päänsärky ja näköhäiriöt. Huomioi yhteisvaikutukset etenkin nitraattien ja alfasalpaajien kanssa. Greippi tehostaa hoidon vaikutusta. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	3.6.2014
<b>Varfariini</b> B01AA03		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Merkittävin haittavaikutus on verenvuotoriskin lisääntyminen. Huomioi mahdollinen kaatuilu ja pitkälle edennyt dementia. Huomioi yhteisvaikutukset myös itsehoitolääkkeiden ja luontaistuotteiden kanssa. Yhteiskäyttö muiden verenhyttymiseen vaikuttavien valmisteiden kanssa vain erityistapauksissa.	19.5.2014
<b>Venlafaksiini</b> N06AX16		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Serotonerginen. Huomioi yhteisvaikutukset.	13.3.2015
<b>Verapamiili</b> C08DA01		<b>D</b>	<b>Vältä käyttöä iäkkäillä.</b> Pienennä annosta keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Merkittäviä haittavaikutuksia ovat bradykardia, ummetus, sydämen vajaatoiminta ja turvotus. Huomioi yhteisvaikutukset erityisesti digoksiinin ja beetasalpaajien kanssa. Vältä greipin käyttöä hoidon aikana.	13.5.2013
<b>Vigabatriini</b> N03AG04		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Pienennä annosta jo lievässä munuaisten vajaatoiminnassa. Haittavaikutuksia ovat mm. näkökenttäpuutokset, painon nousu, muistihäiriöt, masennus ja kiihtymys.	15.9.2014
<b>Vildagliptiini</b> A10BH02		<b>C</b>	<b>Soveltuu varauksin iäkkäille.</b> Annosta pienennettävä keskivaikeassa munuaisten vajaatoiminnassa. Älä käytä maksan vajaatoiminnassa. Käyttökokemus iäkkäillä vähäistä.	7.4.2014