

**Ditt namn:**

---

---

**Läkarens namn** (som förskrev JYSELECA):

---

---

**Läkarens telefonnummer:**

---

---

**Datum då du började använda JYSELECA:**

---

---

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet. Se bipacksedeln om hur du rapporterar biverkningar.

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)  
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea  
Biverkningsregistret  
PB 55, 00034 FIMEA

**Gå in på vår websida:**

[www.jyseleca.eu](http://www.jyseleca.eu)

Jyseleca-PAC-v2.0-09-2021  
SE-UC-FIL-202112-00002



# Patient- informationskort

Bär alltid med dig det här kortet.

Säkerhetsinformation om JYSELECA® ▼  
(filgotinib) för patienter.



**Jyseleca®**  
filgotinib

Detta kort innehåller viktig information för patienter om säkerheten för JYSELECA. Läs bipacksedeln för mer information.

Bär alltid med dig detta kort medan du tar JYSELECA och visa kortet för all hälso- och sjukvårdspersonal som är delaktig i din vård eller behandling, till exempel apotekspersonal eller akutläkare.

**Galapagos**

## Infektioner

- JYSELECA kan förvärra en befintlig infektion eller öka risken för att du får en ny infektion. Tala genast om för läkare om du blir sjuk eller märker tecken på infektion, till exempel:
  - Feber eller frossa, andnöd, hosta, onormal trötthetskänsla – dessa symtom kan vara tecken på lunginflammation
  - Feber, svettning, viktnedgång eller hosta som inte försvinner – dessa symtom kan vara tecken på tuberkulos (TBC)
  - Smärtsamma hudutslag med blåsor – detta kan vara ett tecken på bältros (herpes zoster)
- Innan du börjar ta JYSELECA ska din läkare utreda om du tidigare varit utsatt för TBC
- Tala om för din läkare om du nyligen har varit i nära kontakt med en person med TBC

## Blodproppar i benvenor eller lungor

- Sök genast läkarvård om du får symtom på blodproppar i benen eller lungorna, som t.ex. svullnad eller smärta i ett ben, bröstsmärta eller andnöd

## Kolesterol

Högt kolesterol är en viktig riskfaktor för hjärtsjukdom. Medan du tar JYSELECA kommer läkaren att kontrollera dina kolesterolnivåer. Detta hjälper till att bestämma om du behöver behandling för att sänka dina kolesterolnivåer.

## Vacciner

- Du ska inte ta vissa (s.k. levande) vacciner (till exempel Zostavax™ som används mot bältros) medan du tar JYSELECA
- Tala med läkare angående vacciner innan du börjar ta JYSELECA. De kanske vill säkerställa att dina vaccinationer är uppdaterade

## Graviditet, preventivmedel och amning

JYSELECA får inte användas under graviditet:

- Använd effektivt preventivmedel medan du tar JYSELECA och i en (1) vecka efter att du tagit din sista dos
- Om du blir gravid medan du tar JYSELECA, eller tror att du kan vara gravid, sluta ta JYSELECA och kontakta genast läkare
- Om du planerar att bli gravid ska du tala om det för läkare

Du får inte amma medan du tar JYSELECA.

## Påverkan på manlig fertilitet

Det är möjligt att Jyseleca kan minska antalet spermier eller påverka spermakvaliteten, vilket skulle kunna leda till en nedsatt förmåga att få barn. Det är okänt om dessa förändringar är övergående.

Tala med din läkare om du vill få barn nu, eller i framtiden.