

### Jos saat vakavan allergisen reaktion:

- Lopeta pegvaliaasin pistäminen
- Ota tarvittaessa adrenaliinia (ennen pegvaliaasin käytön aloittamista lääkärisi määrää sinulle adrenaliini-injektorin ja neuvoo sinulle ja tarkkailijallesi, milloin ja miten adrenaliinia otetaan). Pidä adrenaliini-injektori aina mukanas
- Soita hätänumeroon tai mene lähimpään terveydenhuollon päivystykseen

### TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

Tälle potilaalle on määrätty pegvaliaasia. Tämän valmisteen käyttöön on osoitettu liittyvän vaikeita allergisia reaktioita.

Lue lisätietoja pegvaliaasista valmisteyhteenvedosta.

Ilmoita kaikki haittavaikutukset [drugsafety@bmrn.com](mailto:drugsafety@bmrn.com) tai osoitteeseen Lääke-alan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA ([www.sivusto: www.fimea.fi](http://www.sivusto: www.fimea.fi)).

© 2021 BioMarin International Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.  
EU-PAL-00002 Tammikuu 2021

**BOMARIN**<sup>®</sup>

# PALYNZIQ<sup>▼</sup> (pegvaliaasi) Potilaskortti

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti kokemistasi haittavaikutuksista sähköpostilla [drugsafety@bmrn.com](mailto:drugsafety@bmrn.com); faksilla: +1-415-532-3144 tai puhelimella: +1-415-506-6179. Haittavaikutuksista voit myös ilmoittaa osoitteeseen Lääke-alan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA ([www.sivusto: www.fimea.fi](http://www.sivusto: www.fimea.fi)).

Potilaan nimi: \_\_\_\_\_

Ikä: \_\_\_\_\_

Tiedot allergioista: \_\_\_\_\_

Muut terveyttä koskevat tiedot (esim. astma): \_\_\_\_\_

**Yhteystiedot hätätilanteiden varalle:**

Hätäyhteys henkilön nimi: \_\_\_\_\_

Hätäyhteys henkilön yhteystiedot: \_\_\_\_\_

Lääkärin nimi: \_\_\_\_\_

Lääkärin yhteystiedot: \_\_\_\_\_

Lääkärin yhteystiedot  
virka-ajan ulkopuolella: \_\_\_\_\_

**Pegvaliaasi voi aiheuttaa vaikeita allergisia reaktioita, jotka voivat olla hengenvaarallisia. Niitä voi ilmetä milloin tahansa pegvaliaasin pistämisen jälkeen. Lopeta pegvaliaasin pistäminen, jos saat minkä tahansa seuraavista oireista.**

**TÄRKEÄÄ: Pidä adrenaliini-injektori ja tämä kortti aina mukana. Näytä kortti terveydenhuoltohenkilöstölle hätätilanteessa.**

**Vaikeiden allergisten reaktioiden oireita voivat olla:**

- Kasvojen, silmien, huulten, suun, kurkun, kielen, käsien ja/tai jalkojen turvotus
- Hengitysvaikeudet tai hengityksen vinkuminen
- Kurkun käheys tai tukehtumisen tunne
- Nielemis- tai puhevaikeudet
- Huimaus tai pyörtyily
- Virtsan tai ulosteen pidätyskyvyttömyys
- Nopea sydämensyke
- Nopeasti leviävä nokkosihottuma (kutiava, rakkulainen ihottuma)
- Punoitus
- Vaikeat vatsakrampit tai kova vatsakipu, oksentelu tai ripuli