



Elanco Animal Health  
c/o Oy Eli Lilly Finland Ab  
Laajalahdentie 23, 3. krs  
FI-00330 Helsinki

23. huhtikuut 2018

### Hyvä eläinlääkinnän ammattilainen

Osurnian (terbinafiini, florfenikoli ja beetametasoniasetaatti) käytöstä on raportoitu silmävammoja (ml. sarveiskalvon haavaumat) vahingossa tapahtuneiden silmäaltistusten yhteydessä.

Elanco Europe Ltd. haluaa yhdessä Euroopan lääkeviraston kanssa tiedottaa Osurnia-korvageelin aiheuttamista tahattomista ihmisten ja koirien silmäaltistumisista.

Elanco on vastaanottanut raportteja ihmisten ja mahdollisesti koirien silmäaltistumisista Osurnian osalta. Silmäaltistuminen on useimmissa tapauksissa tapahtunut, kun koira on tuotteen annostelun yhteydessä ravistellut päätään sen jälkeen, kun Osurniaa on annosteltu korvakäytäviin. Ilmoitetut kliiniset oireet ovat sisältäneet silmän ärsytystä ja punoitusta sekä sarveiskalvon haavaumia. Näiden haittavaikutusten yleinen esiintymistiheys on hyvin harvinainen (<1 per 10 000 hoidettua eläintä, mukaan lukien yksittäiset ilmoitukset).

#### Suosittelvat toimenpiteet:

- Osurnia-hoitoa antavien henkilöiden on huolehdittava siitä, ettei tuote pääse kosketuksiin omien, lemmikkien omistajien, muiden ihmisten eikä koirien silmien kanssa Osurniaa annettaessa.
- Koiraa tulee pitää kunnolla kiinni Osurnia-hoidon aikana ja on varmistettava tarvittavat toimenpiteet, jotta vältetään vahingossa tapahtuva silmäkosketus tuotteen kanssa.
- Lemmikkien omistajien on seurattava Osurnialla hoidettuja koiria ja otettava yhteyttä eläinlääkəriin erityisesti silmiin liittyvien haittavaikutusten yhteydessä. Tällaisia voivat olla mm. silmien siristys, punoitus tai erite silmästä.
- Jos valmistetta vahingossa joutuu silmiin, huuhtelee huolellisesti vedellä 10-15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin hoitoon ja näytä hänelle pakkausseloste [http://www.ema.europa.eu/docs/fi\\_FI/document\\_library/EPAR\\_-\\_Product\\_Information/veterinary/003753/WC500171492.pdf](http://www.ema.europa.eu/docs/fi_FI/document_library/EPAR_-_Product_Information/veterinary/003753/WC500171492.pdf)

Eläinlääkinnän ammattilaisia muistutetaan siitä, että Osurnian kohdelaji on koira ja ennen kuin Osurniaa annostellaan koiran korvakäytävään, on tutkittava huolellisesti, ettei tärykalvo ole puhjennut. Tämä edellyttää, että annostelu suoritetaan eläinlääkäriin tekemänä tai valvonnassa. Kun tutkimuksessa silmä altistettiin akuutisti Osurnialle, todettiin sen ärsyttävän silmän sarveiskalvoa tai sidekalvoa, reaktion mennessä ohi viimeistään 7 päivän kuluessa altistuksesta. Huomioithan myös, että Osurnia on pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

Eläinlääkäreitä suositellaan ilmoittamaan haittavaikutuksista viipymättä Elancon yhteyshenkilölle tai osoitteeseen [info.finland@elanco.com](mailto:info.finland@elanco.com) tai paikalliselle viranomaiselle (Fimea).

Yhteistyöterveisin,

**Elanco Animal Health**