

Cibinqo



(abrositinibi)

POTILASKORTTI



Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta.
Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta
koskevaa uutta tietoa.

Versio: 2.0

| Hyväksytty: 23.12.2022

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

*Jos havaitset haittavaikutuksia,
kerro niistä lääkärille tai apteekki-
henkilökunnalle. Voit ilmoittaa
haittavaikutuksista myös Lääkealan
turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen
Fimeaan [www-sivusto: www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)*

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 FIMEA

tai

Pfizer Oy:n puhelinvaihteen (09-430 040) kautta.

Nimi:

Cibinqo-valmistetta määränneen lääkärin nimi:

Lääkärin puhelinnumero:

Cibinqo-hoidon aloituspäivä:

Turvallisuustietoa potilaille Cibinqo-valmisteesta

- Tämä kortti sisältää tärkeää turvallisuustietoa, josta sinun on oltava tietoinen ennen Cibinqo-hoidon aloittamista ja hoidon aikana.
- Katso lisätietoa Cibinqo-pakkauksessa olevasta pakkausselosteesta.
- Kysy lääkäriltä tai apteekkihenkilökunnalta, jos jokin asia askarruttaa sinua.

Pidä tämä kortti mukanasasi ja näytä sitä kaikille hoitoosi osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille, esim. apteekkihenkilökunnalle tai lääkärille ensiavussa.

Mitä Cibinqo on ja mihin sitä käytetään

Cibinqo-valmisteen vaikuttava aine on abrositinibi. Se kuuluu lääkeryhmään nimeltä Janus-kinaasin estäjät, jotka auttavat vähentämään tulehdusta. Se toimii alentamalla kehon entsyymin nimeltä "Janus-kinaasi" aktiivisuutta. Janus-kinaasi on osallisena tulehduksessa.

Cibinqo-valmistetta käytetään hoitamaan aikuisia, joilla on keskivaikea tai vaikea atooppinen ihottuma, joka tunnetaan myös nimellä atooppinen ekseema.

Koska Cibinqo-valmiste alentaa Janus-kinaasi-entsyymien aktiivisuutta, se lievittää kutinaa ja ihotulehdusta. Tämä puolestaan voi lievittää unen häiriintymistä ja muita atooppisen ihottuman seurauksia, kuten ahdistuneisuutta tai masennusta, ja parantaa yleistä elämänlaatua.

Sinun tulee olla tietoinen tietyistä jäljempänä luetelluista haittavaikutuksista ja muista seikoista.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille.

Infektioriski

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Cibinqo-hoitoa tai sen aikana, jos

- sinulla ilmenee oireina esimerkiksi kuumetta, haa-voja, tavallista voimakkaampaa väsymystä tai hammasvaivoja, sillä ne voivat olla merkkejä infektiosta.

Rokotukset:

Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos olet saanut hiljattain rokotteen tai suunnittelet rokotteen ottamista (immunisaatiota). Cibinqo-valmisteen käytön aikana tai juuri ennen sitä ei suositella eläviä, hei-

kennettyjä taudinaiheuttajia sisältävien rokotteiden (esim. tuberkuloosi- ja vesirokkorokote sekä MPR eli tuhkarokko-, vihurirokko- ja sikotautirokote) käyttöä.

Veritulpan riski laskimoissa tai keuhkoissa

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa, jos

- sinulla ilmenee äkillisesti hengenhädistystä tai hengitysvaikeuksia, rintakipua tai yläselän kipua, turvotusta sääressä tai käsivarressa, kipua tai arkuutta sääressä taikka punoitusta tai värinmuutoksia sääressä tai käsivarressa, koska nämä voivat olla merkkejä veritulpista laskimoissa.

Sydänvaivojen riski:

Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen Cibinqo-hoitoa tai sen aikana, jos

- sinulla ilmenee voimakasta rintakipua tai puristavaa tunnetta (joka voi levitä käsivarsiin, leukaan, kaulaan tai selkään), hengenahdistusta, kylmänhikeä, pyörrytystä tai äkillistä huimausta, koska nämä voivat olla merkkejä sydäninfarktista.

Syöpäriski:

Cibinqo-valmistetta käyttävillä potilailla on todettu ei-melanoottista ihosyöpää. Lääkäri voi suositella sinulle

ihon tutkimista säännöllisesti Cibinqo-hoidon aikana. Jos uusia ihomuutoksia ilmenee hoidon aikana tai sen jälkeen tai jos nykyisten ihomuutosten ulkonäkö muuttuu, kerro siitä lääkärille.

Seurantakokeet

Lääkäri määrää sinulle verikokeita (mukaan lukien kolesterolimittaus) ennen Cibinqo-hoidon aloittamista ja sen aikana, ja voi tarvittaessa muuttaa hoitoasi.

Ehkäisy ja raskaus

Cibinqo-valmistetta **EI** saa käyttää raskauden aikana.

Jos olet nainen, joka voi tulla raskaaksi, sinun pitää käyttää tehokasta ehkäisymenetelmää Cibinqo-hoidon aikana ja ainakin yhden kuukauden ajan viimeisen lääkemannoksen saamisen jälkeen. Keskustele lääkärin kanssa sinulle sopivista ehkäisymenetelmistä.

Kerro lääkärille heti, jos tulet raskaaksi tai epäilet tulleesi raskaaksi hoidon aikana.

Versio: 2.0 | Hyväksytty: 23.12.2022

PP-CIB-FIN-0069-09122022