

Turvallisuuden liittyviä neuvoja potilaille.  
Ole hyvä ja pidä tämä kortti aina mukanas.

# Potilas kortti

## Tärkeitä turvallisuustietoja ensihoitajille

**Jinarc<sup>®</sup> voi aiheuttaa maksavaurion.** Maksakokeet on tehtävä säännöllisesti (ensimmäisen 18 kuukauden aikana kuukausittain ja sen jälkeen 3 kuukauden välein). Jos hoidon aikana havaitaan maksavaurioon viittaavia oireita tai merkkejä tai poikkeavan suuria ALAT- tai ASAT-arvoja, Jinarc-hoito on keskeytettävä välittömästi.

**Jinarc<sup>®</sup> voi lisätä virtsaneritystä merkittävästi.** Tämä voi johtaa vaikeaan elimistön kuivumiseen tai vakavaan nestehukkaan. Nestehukan oireita voivat olla jano, suun kuivuminen, väsymys, vähentynyt virtsaneritys, päänsärky, kuiva iho, huimaus, sydämen tykyttely, sekavuus ja ihon heikko kimmoisuus.

Lisätietoja on saatavilla sivustolla [www.laakeinfo.fi](http://www.laakeinfo.fi).

Potilaan nimi:

---

Jinarc®-valmisteen ensimmäinen määräämispäivä:

---

Lääkärin nimi:

---

Sairaalan hoitokeskuksen nimi:

---

Hoitokeskuksen puhelinnumero:

---

## Tärkeitä turvallisuustietoja potilaille

### **Jinarc® voi vaikuttaa maksan toimintaan.**

Ota yhteys lääkäriin, jos sinulla ilmenee väsymystä, ruokahaluttomuutta, vatsakipua, kuumetta, virtsan tummuutta tai ihon tai silmien keltaisuutta, vaikeaa kuivumista, pahoinvointia, oksentelua, kutinaa tai nivel- ja lihaskipua yhdessä kuumeen kanssa.

### **Jinarc® voi aiheuttaa vaikeaa elimistön kuivumista.**

Juo runsaasti nesteitä kuivumisen tai voimakkaan nestehukan estämiseksi ja ota yhteys lääkäriin, jos et pysty nauttimaan nesteitä suun kautta.