

Tietoa potilaalle

Deltyba™[▼] (delamanidi) -valmisteen käyttö raskauden ja imetyksen aikana

▼ Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista. Ks. sivulta www.fimea.fi, miten haittavaikutuksista ilmoitetaan.

Sinulla on todettu vakava bakteeri-infektio nimeltään monilääkeresistentti tuberkuloosi. Lääkärisi on päättänyt hoitaa sinua useilla eri antibiooteilla, joihin kuuluu uusi antibiootti nimeltään Delyba (delamanidi). Näitä antibiootteja käytetään yhdessä, jotta voitisi kohentuisi.

Perehdy tähän oppaaseen huolellisesti, sillä se sisältää tärkeää tietoa Delyban (delamanidin) käytöstä raskauden tai imetyksen aikana. Tämä opas ei korvaa lääkärin kanssa käytävää keskustelua sairaudestasi tai hoidostasi. Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt lääkkeen pakkauksessa mukana olevan pakkausselosteen ja että olet keskustellut hoidosta lääkärisi kanssa, ennen kuin otat Delybaa (delamanidia).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia ottaessasi Delybaa (delamanidi), käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Delytba-valmistetta (delamanidia) raskauden tai imetyksen aikana

Ennen Delytba (delamanidi) -hoidon aloittamista sinun tulee tietää seuraavat asiat:

- Delytba (delamanidi) saattaa aiheuttaa haittaa syntymättömälle lapselle.
- Kerro heti lääkärille, jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet raskautta, ja noudata hänen antamia ohjeita.
- Ottaessasi Delytbaa (delamanidia) sinun on käytettävä luotettavaa raskaudenehkäisyä raskauden välttämiseksi.
- Jos huomaat tulleesi raskaaksi Delytba (delamanidi) -hoidon aikana, ota yhteyttä lääkäriin ja sovi viipymättä vastaanottoaika.
- Jos imetät lastasi, siirry pulloruokintaan ennen Delytba (delamanidi) -hoitoa, sillä lääke voi siirtyä lapsen elimistöön rintamaidon kautta.

Varmista, että olet lukenut kokonaan Delytban (delamanidin) pakkauksen mukana tulevan pakkausselosteen. Se sisältää kaikki tätä lääkettä koskevat tärkeät tiedot, jotka sinun tulee tietää.



Jos olet epävarma tai sinulla on kysyttävää lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.

Lisätietoja

Tämä potilaan opas on saatavilla myyntiluvan haltijan verkkosivustolla:
<https://otsuka-onpg.com/about-our-product-against-mdr-tb>.

Valmistaja:

Otsuka Novel Products GmbH
Erika-Mann-Straße 21
80636 München
Saksa

