

Potilaille

Pidä tämä kortti aina mukana ja näytä se kaikille hoitoosi osallistuville terveydenhuollon ammattilaisille kertoaksesi, että sinua hoidetaan joko nivolumabilla (OPDIVO®) tai nivolumabi-ipilimumabiyhdistelmähoidolla (OPDIVO® + YERVOY®).

Jos havaitset mitä tahansa merkkejä tai oireita, ilmoita niistä välittömästi hoitavalle lääkäriillesi.

⚠️ TÄRKEÄÄ

Nivolumabi-hoito voi lisätä vakavien tai henkeä uhkaavien immuunivälitteisten haittavaikutusten esiintyvyyttä kehon eri osissa, kuten:

- **Rintakehä (sydän ja keuhkot):** hengitysvaikeudet, yskä, hengityksen vinkuminen, rintakipu, epäsäännöllinen sydämen syke, sydämen tykytys (lisääntynyt tietoisuus sykkeestäsi)
- **Vatsan alue (maha ja suolisto):** ripuli (vetinen, löysä tai pehmeä uloste), verinen tai limainen uloste, tumma uloste, mahan tai vatsan alueen kipu tai arkuus
- **Maksa:** silmien tai ihon keltaisuus (ikterus), kipu vatsan oikealla puolella
- **Munuaiset:** muutokset virtsan määrässä ja/tai virtsaamistiheydessä
- **Hormoneja tuottavat rauhaset (mukaan lukien diabetes):** päänsärky, näön sumentuminen tai kaksoiskuvat, väsymys (uupumus), painon muutokset, muutokset käyttäytymisessä (kuten seksuaalinen haluttomuus, ärtyneisyys tai muistamattomuus), kova jano, painon lasku ruokahalun lisääntymisestä huolimatta, heikotus, uneliaisuus, masennus, ärtyneisyys, yleinen sairauden tunne, muutokset virtsan määrässä ja/tai virtsaamistiheydessä
- **Iho:** ihottuma, kutina, rakkulat ja/tai ihon kuoriutuminen (saattaa erittäin vakavana johtaa kuolemaan), haavaumat, kuiva iho, ihonystyrät
- **Muut oireet:** heikotus, väsymys (uupumus), ruokahalun väheneminen, pahoinvointi, oksentelu, käsivarsien tai jalkojen kihelmöinti tai tunnottomuus, kävelyvaikeudet, kuume, imusolmukkeiden turpoaminen, päänsärky, kouristelu, niskan jäykkyys, sekavuus, uneliaisuus, lihaskipu, jäykkyys, tumma virtsa, silmän kipu tai punoitus, näön sumentuminen tai muut näköhäiriöt

⚠️ TÄRKEÄÄ

- Kerro lääkäriillesi terveyshistoriasi, mukaan lukien jos olet saanut luuydin- tai kantasolusiirron toiselta henkilöltä (allogeeninen, luovuttajan soluihin perustuva siirto).
- Välittömästi lääkärisi aloittama haittavaikutusten hoito todennäköisemmin vähentää nivolumabin tai nivolumabi-ipilimumabiyhdistelmähoidon keskeyttämisen tai lopettamisen tarvetta.
- Lievät merkit ja oireet voivat muuttua nopeasti vakavammiksi, jos ne jätetään hoitamatta.
- **Älä** yritä hoitaa oireitasi itse.
- Merkit tai oireet voivat ilmaantua viiveellä, jopa viikkoja tai kuukausia viimeisen lääkeannoksen jälkeen.

Hoitavan lääkäri yhteystiedot

(nivolumabin tai nivolumabi-
ipilimumabiyhdistelmähoidon
määrännyt lääkäri)

Lääkäri nimi:

Puhelinnumero virka-aikana:

Puhelinnumero virka-ajan
ulkopuolella:

Omat yhteystietoni

Potilaan nimi:

Potilaan puhelinnumero:

Yhteyshenkilö hätätilanteissa
(nimi ja puhelinnumero):

TÄRKEÄÄ tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

- Tätä potilasta hoidetaan **nivolumabilla (OPDIVO®)** tai **nivolumabi-ipilimumabiyhdistelmähoidolla (OPDIVO® + YERVOY®)**.
- Immuunivälitteisiä haittavaikutuksia voi ilmetä milloin tahansa hoidon aikana tai kuukausia hoidon lopettamisen jälkeen.
- Haittavaikutusten varhainen diagnosointi ja asianmukainen hoito on tärkeää, jotta mahdolliset henkeä uhkaavat komplikaatiot voidaan minimoida.
- Onkologin tai muun erikoislääkäriin konsultointi voi olla hyödyllistä elinkohtaisten immuunivälitteisten haittavaikutusten hoidossa.
- Lisätietoja terveydenhuollon ammattilaisille OPDIVO® -valmisteyhteenvedosta www.ema.europa.eu tai puhelimitse Bristol Myers Squibbin lääkeneuvonnasta 09-25121244.

**Potilaalle nivolumabin tai nivolumabi-
ipilimumabiyhdistelmähoidon määränneen lääkärin
tulee täydentää yhteystietonsa tämän potilaskortin
kohtaan “Hoitavan lääkäri yhteystiedot”.**

Potilaskortti!
(nivolumabi)
OPDIVO®