

## Påminnelsekort för patienter

**Detta påminnelsekort innehåller viktig säkerhetsinformation som du måste känna till före och under behandling med Tsoledronihappo medac för cancerrelaterade tillstånd.**

Din läkare har rekommenderat att du får behandling med Tsoledronihappo medac för att förebygga benkomplikationer (t.ex. frakturer) orsakade av benmetastaser eller för att minska mängden kalcium i blodet hos vuxna patienter när denna är för hög på grund av en tumör. En biverkning som kallas osteonekros i käken (ONJ) (benskada i käken) har rapporterats i mindre vanliga fall i kliniska prövningar och efter godkännandet för försäljning hos patienter som får zoledronsyra behandling för cancerrelaterade tillstånd. ONJ kan också uppstå efter avslutad behandling.

För att minska risken för att utveckla osteonekros i käken finns det vissa försiktighetsåtgärder som du bör vidta:

### **Innan behandling påbörjas:**

- Be din läkare berätta om ONJ innan du påbörjar behandling.
- Kontrollera med din läkare om en tandundersökning rekommenderas innan du påbörjar behandling med Tsoledronihappo medac.
- Tala om för din läkare/sjuksköterska (sjukvårdspersonal) om du har några problem med munnen eller tänderna.

Patienter som genomgår tandkirurgi (t.ex. tandutdragning), inte går till tandläkaren regelbundet eller har tandköttssjukdom, är rökare, får olika typer av cancerbehandlingar eller tidigare har behandlats med bisfosfonat (läkemedel som används för att behandla eller förebygga bensjukdomar) kan ha en högre risk för att utveckla ONJ.

### **Under behandling:**

- Du ska upprätthålla god munhygien, se till att dina proteser passar ordentligt och genomgå regelbundna tandkontroller.
- Om du får tandbehandling eller ska genomgå tandkirurgi (t.ex. tandutdragning), informera din läkare och tala om för din tandläkare att du behandlas med Tsoledronihappo medac.
- Kontakta omedelbart din läkare och tandläkare om du får några problem med munnen eller tänderna, såsom lösa tänder, smärta eller svullnad, sår som inte läker eller sekret, eftersom detta kan vara tecken på osteonekros i käken.

Läs bipacksedeln för ytterligare information.