

Anvisningar om användning

Inom egenårds är Pronaxen 250 mg tabletter avsedda för tillfällig användning hos vuxna och ungdomar över 12 år:

- För symtomatisk egenårds av lindriga och medelsvåra smärttillstånd i högst 5 dygn utan läkarordination
- För att sänka feber inom egenårds i högst 3 dygn utan läkarordination

Dosering

- 1 tablett vid behov 1–2 gånger om dygnet
- Maximal dos inom egenårds är 500 mg om dygnet

Begränsning av användning

Samtidig användning med andra inflammationshämmande värkmediciner ökar biverkningar i magtarmkanalen som kan vara livsfarliga.

- Samtidig användning med andra inflammationshämmande värkmediciner måste absolut undvikas

Lämplighet för egenårds

Hinder för användning av Pronaxen 250 mg tabletter inom egenårds:

- användning hos barn under 12 år
- sår i magen eller tolvfingertarmen
- tidigare sår i magen eller tolvfingertarmen som har återkommit en eller flera gånger
- tidigare hål (perforation) i magtarmkanalen eller blödningar (t.ex. svart eller blodig avföring, blodiga kräkningar, anemi) i samband med användning av inflammationshämmande värkmedicin
- läkardiagnostiserad benägenhet för blödningar i magtarmkanalen
- sjukdom som försämrar blodkoagulationen (blödarsjuka [hemofili] eller brist på blodplättar [trombocytopeni])
- läkemedel som hindrar blodets koagulation och bildning av blodproppar (t.ex. warfarin)
- hjärtsvikt eller kranskärllsjukdom
- nedsatt njurfunktion
- svårt nedsatt leverfunktion
- blodtryckssjukdom
- astma eller allergi mot naproxen, acetylsalicylsyra eller andra inflammationshämmande värkmedicin eller något annat innehållsämne i Pronaxen

Graviditet

- Använd inte under den sista trimestern