

Ogluo[®]

injektioglukagonia

Ogluo[®] 0,5 mg injektioliuosta valmiiksi täytetyssä pistoskynässä (glukagonia)

Ogluo[®] 1 mg injektioliuosta valmiiksi täytetyssä pistoskynässä (glukagonia)

ANTOTAPASELOSTE

Tärkeää tietoa turvalliseen ja vaikuttavaan käyttöön

Julkaisujankoha: Lokakuu 2022

VALMIIKSI TÄYTETTY OGLUO[®]-PISTOSKYNÄ ON STRONGBRIDGE DUBLIN LIMITEDIN REKISTERÖITY TAVARAMERKKI.

www.Tetrispharma.com

Laatimisajankohta: Lokakuu 2022

TETRIS⁺PHARMA


OGLUOFIRMM0001.2

Tietoa valmiiksi täytetystä Ogluo®-pistoskynästä ja tästä selosteesta



- Valmiiksi täytettyä Ogluo®-pistoskynää käytetään erittäin matalan verensokerin (vaikean hypoglykemian) hoitoon aikuisilla, nuorilla ja lapsilla (vähintään 2-vuotiailla), joilla on diagnosoitu diabetes.
- Tässä antotapaselosteessa kerrotaan, miten valmiiksi täytettyä Ogluo®-pistoskynää käytetään.
- Lue kaikki tuotetiedot pakkausselosteesta ja katso ohjevideo. Ne saa verkko-osoitteesta: www.Ogluo.info
- Kerro nämä tiedot hoitajallesi tai ystävillesi/kollegoillesi, joiden on mahdollisesti autettava sinua, jos verensokerisi laskee erittäin paljon ja tarvitset apua.
- Tässä selosteessa annetaan tärkeitä varoituksia seikoista, jotka sinun on huomioitava valmiiksi täytetyn Ogluo®-pistoskynän käytössä. Jos et ymmärrä jotakin selosteen kohtaa, ota yhteys terveydenhoidon ammattilaiseen.
- Sinun tai hoitajasi on tiedettävä hoitoon liittyvät riskit.
- Verkko-osoitteesta www.Ogluo.info voi katsoa ohjevideon

Antotapa


- Säilytä tämä antotapaseloste senkin jälkeen, kun terveydenhoidon ammattilainen on opettanut sinua käyttämään valmiiksi täytettyä Ogluo®-pistoskynää (saatat tarvita sitä myöhemmin).
- Älä poista valmiiksi täytettyä Ogluo®-pistoskynää foliopussista, jos et aio käyttää sitä.
- Älä kokeile valmiiksi täytettyä Ogluo®-pistoskynää ennen käyttöä, koska jokaista pistosvälinettä voidaan käyttää vain kerran.
- Jos vaikutusta ei havaita 15 minuutin kuluessa pistoksen antamisesta, toisen annoksen antaminen uudella valmiiksi täytetyllä pistoskynällä voi olla tarpeen.
- Antotapaselosteen avulla voidaan opastaa valmiiksi täytetyn Ogluo®-pistoskynän oikea käsittely- ja antotapa läheisillesi.
- Alla olevassa kaaviossa selitetään lyhyesti, miten valmiiksi täytettyä Ogluo®-pistoskynää käytetään.
- Hypoglykemian uusiutumisen ehkäisemiseksi on potilaalle annettava hiilihydraatteja suun kautta maksan glykogeenin täydentämiseksi, kun potilaan hoitovaste on havaittu.



1. Valmistelu



2. Injektointi



3. Avustaminen



Nosta kynä injektio kohdasta suoraan ylöspäin.

- Injektion antamisen jälkeen keltainen neulansuojus lukittu neulan päälle.

Käyttöä koskevat erityisvaroitukset ja varotoimenpiteet

Huomioi, että:

Ogluo® ei välttämättä toimi oikein, jos:

- olet paastonut tai et ole syönyt vähään aikaan tai verensokerisi on ollut matala kauan
- adrenaliinitasosi on matala
- verensokerisi on matala liiallisen alkoholin käytön seurauksena
- sinulla on kasvain, joka vapauttaa glukagonia tai insuliinia.

Jos et ymmärrä jotakin kohtaa, kysy neuvoa terveydenhoidon ammattilaiselta.

Yleisiä muistutuksia

Jos sinulle on määrätty valmiiksi täytetty Ogluo®-pistoskynä, varmista, että::

- kerrot perheenjäsenillesi, työtoverillesi ja läheisille ystävillesi, että sinulla on valmiiksi täytetty Ogluo®-pistoskynä ja miten ja milloin sitä on annettava
- pidät valmiiksi täytettyä Ogluo®-pistoskynää aina mukanas
- osaat säilyttää valmiiksi täytettyä Ogluo®-pistoskynää oikein
- et ole allerginen glukagonille etkä muille valmiiksi täytetyn Ogluo®-pistoskynän ainesosille
- lisämunuaisessasi ei ole kasvainta (feokromosytooma).

Kopioita tästä selosteesta ja muita aineistoja voi tilata:

puhelimitse: **0330 1359 433**

sähköpostitse: **medinfo@Tetrispharma.com**

verkosta: **www.Ogluo.info**

Lisätietoja ja opetusvideo find osoitteessa **www.Ogluo.info**,
tai skannaamalla tämä QR-koodi



Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Ilmoita epäillyistä haittavaikutuksista

Epäillyistä haittavaikutuksista ilmoittaminen lääkkeen myyntiluvan myöntämisen jälkeen on tärkeää. Se mahdollistaa lääkkeen käyttö-riskisuhteen jatkuvan seurannan.

Suomessa potilaita pyydetään ilmoittamaan epäillyistä haittavaikutuksista FIMEA lle osoitteeseen.

www-sivusto: <http://www.fimea.fi>

www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

Haittavaikutuksista/haittavaikutuksista on ilmoitettava myös Tetris Pharma B.V. ille seuraavalla osoitteella

0330 1359 433 tai medinfo@tetrispharma.com

www.Ogluo.info

Laatimisaikajankohta: Lokakuu 2022