

## XENPOZYME (olipudaasi alfa)

## POTILASKORTTI

sonofi  
versio 1, hyväksytty 19.10.2022 (Fimea), VV-PV-0492546

Tämä potilaskortti sisältää tärkeitä tietoja, joista sinun on oltava tietoinen saadessasi XENPOZYME-hoitoa. Tutustu pakkausselosteessa oleviin täydellisiin tietoihin.



### Yleisiä ohjeita

Näytä tämä kortti kaikille hoitoosi osallistuville lääkäreille tai sairaanhoitajille.

Voit hakea lisätietoa skannaamalla QR-koodin.

**XENPOZYME**  
(olipudaasi alfa)

## Merkittävät haittavaikutukset

XENPOZYME annetaan infuusiona laskimoon. Harvinaisissa tapauksissa potilaalle voi kehittyä infuusion aikana tai sen jälkeen vaikea allerginen reaktio, joka on hoidettava välittömästi. Hakeudu kiireellisesti lääkärin hoitoon, jos jokin seuraavista oireista tai merkeistä ilmenee tai pahenee infuusion aikana tai sen jälkeen:

- hengenahdistus / tukehtumisen tunne
- huimaus, heikotus tai pyörtäminen
- heikko, nopea syke
- pahoinvointi, oksentelu tai ripuli
- iholle lehahtava punoitus ja ihon kalpeus, nokkosihottuma, kutina

Ilmoita kaikista tapahtumista lääkkeen määränneelle / sinua hoitavalle lääkärille.

Potilaan nimi:

Lääkkeen määrännyt / hoitava lääkäri:

• Nimi:

• Yhteystiedot (puhelinnumero):

Sairaala/kliniikka:

• Nimi:

• Yhteystiedot hätätilanteessa (puhelinnumero):

## Mitä XENPOZYME on?

## Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi, mukaan lukien nuoret

Keskustele ehkäisykeinoista lääkkeen määränneen / hoitavan lääkärin kanssa.

Ota yhteys lääkkeen määränneeseen / hoitavaan lääkäriin, jos epäilet olevasi raskaana tai suunnittelet raskautta.

XENPOZYME on lääke, joka sisältää vaikuttavana aineena keinokehoista olipudaasi alfa nimitystä entsyymiä.

Tätä lääkettä käytetään erään entsyymin eli happaman sfiingomyeliinasiin korvaamiseen. Happaman sfiingomyeliinasiin puutosta sairastavien potilaiden elimistöä puuttuu tätä puutosta sairastavien potilaiden elimistöä puuttuu on heillä tavanomaisista vähäisempää tai puuttuu kokonaan, mikä voi aiheuttaa erilaisia oireita.

XENPOZYME-valmistetta käytetään entsyymikorvaushoitoon happaman sfiingomyeliinasiin puutoksen muualla kuin keskushermostossa todettavien ilmenymien hoidossa pediatrisille potilaille ja aikuispotilaille, joiden tauti on tyyppiä A/B tai tyyppiä B.