

## Apteekkihenkilökunnan opas – tärkeää tietoa riskien minimoinnista

Tämän oppaan tietoja ei ole tarkoitettu korvaamaan valmisteyhteenvedon tietoja.

Lue tämän oppaan lisäksi myös Blincyto-valmisteyhteenvedo.

Blincyto-valmisteyhteenvedo ja -pakkausseloste ovat saatavilla Euroopan lääkeviraston verkkosivuilla osoitteessa <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/blincyto#product-information-section>. Lisäksi Blincyto-valmisteyhteenvedo on saatavilla osoitteessa [pharmacafennica.fi](http://pharmacafennica.fi) ja -pakkausseloste osoitteessa [lääkeinfo.fi](http://lääkeinfo.fi).

Tämä opas on laadittu osana riskienhallintasuunnitelmaa (RMP) apteekkihenkilökunnalle, joka osallistuu Blincyto-valmisteen käyttökuntoon saattamiseen ja infuusioliuoksen valmistamiseen. Oppaassa on lisätietoja siitä, **miten lääkitysvirheet voi minimoida tai ehkäistä**.

▼ Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Terveystieteiden ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista joko Fimealle:  
www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)  
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea  
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri  
PL 55  
00034 Fimea  
tai Amgenille:  
Amgen AB, sivuliike Suomessa  
PL 86  
02101 ESPOO  
e-mail: [nordic.baltic.drugsafety@amgen.com](mailto:nordic.baltic.drugsafety@amgen.com)  
puh.: (09) 54 900 500

### SISÄLTÖ

- 1 YLEISKATSAUS
- 2 TÄRKEÄÄ TIETOA BLINCYTO-ANNOKSESTA
- 3 TÄRKEÄÄ TIETOA BLINCYTO-INFUUSION VALMISTAMISESTA LASKIMOON ANTOA VARTEN

## 1 YLEISKATSAUS

### Tärkeää tietoa lääkitysvirheistä

- Lääkitysvirheet ovat tahattomia virheitä lääkevalmisteen määräämisessä, toimittamisessa tai antamisessa valmisteen ollessa terveydenhoitohenkilökunnan tai potilaan / potilaasta huolehtivan henkilön hallussa.
- Lääkitysvirheitä, myös infuusioliuoksen valmistamiseen liittyviä, on havaittu Blincyto-hoidon aikana.
- Lääkitysvirheet voivat aiheuttaa Blincyto-valmisteen ali- tai yliannostelun. Aliannostelun seurauksena teho voi olla odotettua vähäisempi, ja yliannostelu voi suurentaa haittavaikutusriskiä.



### Lääkitysvirheiden riskin minimointi:

- Lue Blincyto-valmisteen valmistus- ja anto-ohjeet Blincyto-valmisteyhteenvedon kohdasta 6.6 tai pakkausselosteen lopusta. Varmista, että ohjeita noudatetaan tarkasti lääkitysvirheiden minimoimiseksi.

## 2 TÄRKEÄÄ TIETOA BLINCYTO-ANNOKSESTA

- Suositeltu vuorokausiannos määritetään potilaan painon perusteella.
  - Jos potilas painaa vähintään 45 kg, hänelle annetaan kiinteä annos.
  - Alle 45 kg painaville potilaille annos lasketaan kehon pinta alan (BSA) perusteella
- Lue huolellisesti ohjeet, jotka koskevat Blincyto-valmisteen käyttökuntoon saattamista ja laimentamista potilaan painon tai kehon pinta-alan perusteella, ja tutustu annostustaulukoihin, jotka ovat Blincyto-valmisteyhteenvedon kohdassa 6.6 sekä pakkausselosteen lopussa terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettussa kohdassa.

## 3 TÄRKEÄÄ TIETOA BLINCYTO-INFUUSION VALMISTAMISESTA LASKIMOONANTOA VARTEN

- Tarkat vaiheet, joilla Blincyto-valmiste saatetaan käyttökuntoon ja infuusiopussit valmistellaan aseptiikkaa noudattaen, sekä tarvittavat välineet Blincyto-infuusion valmisteluun on eritelty Blincyto-valmisteyhteenvedossa sekä pakkausselosteen lopussa terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettussa kohdassa.

### ! Tärkeimmät muistutukset:

- Ennen Blincyto-valmisteen infusointia on ehdottomasti suoritettava **kaikki** Blincyto-valmisteyhteenvedossa kuvatut vaiheet lääkitysvirheiden välttämiseksi.
- Blincyto-annos perustuu potilaan painoon tai kehon pinta-alaan.
- Toimi seuraavasti ennen Blincyto-infuusion valmistelua:
  - » Tutustu annostustaulukoihin, jotka ovat Blincyto-valmisteyhteenvedon kohdassa 6.6.
  - » Varaa saataville sopivat tarvikkeet, kuten
    - Blincyto-pakkaus tai -pakkaukset (joissa on Blincyto-kuiva-ainetta sisältävä injektio-pullo ja liuosta (stabilointiliuosta) sisältävä injektio-pullo), steriilit kertakäyttöruiskut, 21–23 G:n neula tai neuloja, injektionesteisiin käytettävää vettä (Blincyto-valmisteen liuottamiseen), infuusiopussi, jossa on natriumkloridi 9 mg/ml (0,9 %) -infuusionestettä, sekä infuusioletkusto (joka on yhteensopiva infuusiopumpun kanssa).
  - » Selvitä potilaan paino tai kehon pinta-ala ja vahvista annos.
- Muista seuraavat seikat Blincyto-valmisteen käyttökuntoon saattamisessa ja valmistamisessa:
  - » Blincyto-liuos ei sisällä säilytysaineita.
  - » Noudata Blincyto-liuoksen valmistamisessa aseptiikkaa.
  - » **Älä** käytä liuosta (stabilointiliuosta) Blincyto-kuiva-aineen liuottamiseen.
  - » **Älä** ravista sisältöä, vaan pyörittele varovasti välttäen liiallista vaahdon muodostumista.
  - » Tarkista käyttövalmis liuos silmämääräisesti: sen on oltava kirkasta tai hieman opalisoivaa ja väritöntä tai kellertävää. Liuos ei saa olla sameaa, eikä siinä saa olla sakkaa.
  - » Poista kaikki ilma valmiista Blincyto-infusio-liuos-pussista.
  - » Esitäytä infuusioletku vain valmiilla infusio-liuoksella. Älä esitäytä infuusioletkua keittosuolaliuoksella (natriumkloridi 0,9 % -infuusionesteellä).
  - » Infuusiopusseilla annettavien infuusioiden kesto vaihtelee annoksen mukaan.
  - » Säilytä valmiista Blincyto-infusio-liuos-pussia tavalla, joka on kuvattu Blincyto-valmisteyhteenvedon kohdassa 6.3.

Kaikista epäilyistä haittavaikutuksista ja lääkitysvirheistä pyydetään ilmoittamaan (ks. ohjeet sivulta 1).