


Kuinka Xyrem®-valmistetta käytetään

Xyrem®-pakkaus sisältää yhden lääkepullon, mittaruiskun, pulloon painettavan adapterin ja kaksi annosmittaa, joissa on turvasulkimet sekä pakkausselosteen. On tärkeää, että käytät Xyrem®-annosten valmistamiseen vain pakkauksessa olevaa mittaruiskua.




Kuva 1.

Ennen kuin otat ensimmäisen Xyrem®-annoksen, lue pakkausseloste, sillä se sisältää tärkeää lisätietoa. Ota Xyremiä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.


Valmista molemmat annokset ennen nukkumaan menoa.

- 1.** Poista pullon suljin painamalla sitä alaspäin ja kiertämällä sitä vastapäivään (vasemmalle). Poistetuksi suljimen aseta pullo pöydälle pystyasentoon. Pullon suulla on muovilla päällystetty foliosinetti, joka pitää poistaa ennen pullon ensimmäistä käyttökertaa. Pidä pullo pystyasennossa ja työnnä pulloon painettava adapteri pullon kaulaan. Tämä tehdään vain, kun pullo avataan ensimmäisen kerran. Adapteri voidaan jättää pulloon myöhempiä käyttökertoja varten (ks. kuva 2).




Kuva 2.

- 2.** Työnnä mittaruiskun kärki pullonsuun keskustassa olevaan aukkoon ja paina lujasti alaspäin (ks. kuva 3)



Kuva 3.

- 3.** Pitele pulloa ja ruiskua toisella kädellä ja vedä ruiskuun ohjeenmukainen lääkeannos vetämällä mäntää toisella kädellä. HUOMAA: Ruiskuun ei tule lääkettä, ellei pullo ole pystyasennossa (ks. kuva 4)




Kuva 4.

- 4.** Ota ruisku ulos pullonsuun keskustassa olevasta aukosta. Tyhjennä lääke ruiskusta toiseen annosmittaan painamalla mäntää. Tee sama toisen annosmitan kohdalla. Lisää kumpaankin annosmittaan noin 60 ml vettä (60 ml on noin 4 ruokalusikallista) (ks. kuva 5).



Kuva 5.

- 5.** Pane annosmittoihin sulkimet kiertämällä myötäpäivään (oikealle) kunnes kuuluu napsahdus ja suljin lukittuu lapsiturvallisesti (ks. kuva 6). Huuhtele ruisku vedellä.



Kuva 6.

- 6.** Aseta toinen annos vuoteesi lähelle juuri ennen nukkumaan menoa. Sinun on ehkä pantava herätyskello soimaan, jotta heräisit ottamaan toisen annoksen aikaisintaan 2,5 tunnin ja viimeistään 4 tunnin kuluttua ensimmäisestä annoksesta. Poista ensimmäisen annosmitan suljin (ks. kuva 7) painamalla turvalukitus-



nipukkaa ja kiertämällä suljinta vastapäivään (vasemmalle). Ota ensimmäinen annos vuoteessa istuen, laita suljin takaisin paikoilleen, ja asetu heti makuulle.

Kuva 7.

- 7.** Kun heräät 2,5–4 tunnin kuluttua, avaa toisen annosmitan suljin. Ota toinen annos vuoteessa istuen, asetu heti makuulle ja jatka uniasi. Laita toisen mitan suljin takaisin paikoilleen.

UCB, Xyrem, Kuinka Xyrem®-valmistetta käytetään, v3.0
© Copyright UCB Biopharma SRL 2020. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämä opas on osa Euroopan lääkeviraston edellyttämää riskienhallintaohjelmaa.



UCB Pharma Oy Finland
Bertel Jungin aukio 5, 02600 Espoo
Puh. (09) 2514 4221
ucb.finland@ucb.com