

## Viktig säkerhetsinformation för patienter

### Gör

- Ha alltid detta kort med dig.
- Visa detta kort för läkare och vårdpersonal involverade i din behandling.
- Ta med dig en lista över alla dina läkemedel när du besöker läkare eller vårdpersonal.
- Tala omedelbart om för din läkare om du upplever ovanliga symptom som till exempel konstiga tankar, inklusive tankar på att skada andra, medan du tar Xyrem<sup>®</sup>.
- Förvara Xyrem<sup>®</sup> utom syn- och räckhåll för barn.

Denna information är en del av det riskhanteringsprogram som begärts av EMA.

# Kontakt- information

Datum då Xyrem®  
först förskrivits:

---

Patientens namn

---

Patientens telefonnummer

---

Namn på närmast anhörig

---

Telefon till närmast anhörig

---

Namn på behandlande läkare

---

Telefon till behandlande läkare

---

Telefonnummer för akut medicinsk assistans

# Viktig säkerhetsinformation för patienter

Xyrem® kan sänka din andning och medvetandegrad.

**GÖR INTE** något av följande:

- Drick **INTE** alkohol medan du behandlas med Xyrem®.
- Ta **INTE** mer än den dos din läkare förskrivit.
- Kör **INTE** bil eller använd tunga maskiner inom 6 timmar efter att du tagit Xyrem®.
- Ta **INTE** några andra läkemedel utan att ha diskuterat dem med din läkare.
- Dela **INTE** Xyrem® med någon annan.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal.

Du kan också rapportera biverkningar till UCB med e-post [ds.fi@ucb.com](mailto:ds.fi@ucb.com) eller Fimea:

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

# Viktig säkerhetsinformation för läkare/vårdpersonal

Denna patient tar Xyrem® för behandling av narkolepsi med kataplexi.

Xyrem® kan orsaka andningsdepression, hämning av CNS, epileptiska anfall, psykos, depression och självmordsbenägenhet.

Opioider eller barbiturater bör inte användas tillsammans med Xyrem®. Andra CNS-hämmande läkemedel och läkemedel som kan ge andningsdepression bör undvikas. Var särskilt försiktig vid användning av topiramata och valproat tillsammans med Xyrem®.

Xyrem® är potentiellt missbruks- och beroendeframkallande.

Vänligen läs produktresumén för Xyrem® innan förskrivning/dispensering av andra läkemedel till denna patient.



UCB Pharma Oy Finland  
Bertel Jungs plats 5, 02600 Esbo  
Tel. (09) 2514 4221  
ucb.finland@ucb.com