

XYREM[®]

(natriumoksibaatti)

Potilaskortti

Muista

- Pidä tämä kortti aina mukanasasi.
- Näytä kortti kaikille hoitoosi osallistuville lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle.
- Ota mukaan lista kaikista käyttämästäsi lääkkeistä, kun käyt lääkärin vastaanotolla tai asioit hoitohenkilökunnan luona.
- Ilmoita lääkärille heti, jos sinulla esiintyy Xyrem[®]-hoidon aikana epätavallisia oireita, kuten outoja ajatuksia, mukaan lukien ajatuksia muiden ihmisten vahingoittamisesta.
- Säilytä Xyrem[®]-valmiste lasten ulottumattomissa.

Yhteystiedot

Xyrem®-valmistetta
määrättiin ensimmäisen
kerran (pvm):

Potilaan nimi

Potilaan puhelinnumero

Lähiomaisen nimi

Lähiomaisen puhelinnumero

Hoitavan lääkärin nimi

Hoitavan lääkärin puhelinnumero

Puhelinnumero, johon tulee ottaa yhteyttä hätätapauksessa

UCB, Xyrem, Potilaskortti, v3.0

© Copyright UCB Biopharma SRL 2020. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä opas on osa Euroopan lääkeviraston edellyttämää riskienhallintaohjelmaa.

Potilaskortti

Xyrem® voi lamata hengitystä ja laskea tajunnan tasoa.

- **ÄLÄ** nauti alkoholia Xyrem®-hoidon aikana.
- **ÄLÄ** ota Xyrem®-valmistetta enemmän kuin lääkäri on määrännyt.
- **ÄLÄ** aja autoa tai käytä koneita Xyrem®-valmisteen ottamista seuraavien 6 tunnin aikana.
- **ÄLÄ** käytä mitään muita lääkkeitä, ellet ole keskustellut niistä lääkärisi kanssa.
- **ÄLÄ** anna Xyrem®-lääkettä kenellekään muulle.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös UCB:lle sähköpostitse ds.fi@ucb.com tai Fimealle:

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 Fimea

Tärkeää turvallisuustietoa lääkäreille / hoitohenkilökunnalle

Potilas käyttää Xyrem®-valmistetta narkolepsia-katapleksian hoitoon.

Xyrem® voi aiheuttaa hengitys- ja keskushermostolaman, kouristuskohtauksia, psykoottisia tapahtumia, masennusta ja itsetuhoisuutta.

Xyrem®-valmisteen kanssa ei saa käyttää opioideja eikä barbituraatteja. Muiden hengitystä ja keskushermostoa lamaavien lääkkeiden käyttöä tulee välttää. Erityisen varovainen tulee olla käytettäessä topimaraattia ja valproaattia Xyrem®-valmisteen kanssa.

Xyrem®-valmisteeseen saattaa liittyä väärinkäytön, virheellisen käytön ja riippuvuuden kehittymistä.

Pyydämme perehtymään Xyrem®-valmisteen valmisteyhteenvetoon ennen kuin potilaalle määrätään/toimitetaan muita lääkkeitä.



UCB Pharma Oy Finland
Bertel Jungin aukio 5, 02600 Espoo
Puh. (09) 2514 4221
ucb.finland@ucb.com