

POTILAAN JA HÄNEN LÄHEISTENSÄ OPAS

Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joihin sinun on hyvä perehtyä ennen kuin Imlygic-hoito aloitetaan ja hoidon aikana. Lue tämä opas huolellisesti ennen jokaista hoitokertaa ja jokaisen hoitokerran jälkeen. Lue myös Imlygic-valmisteen pakkausseloste, jonka saat terveydenhoitohenkilökunnalta. Keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa, jos sinulla on kysyttävää hoidosta tai jos jokin asia huolestuttaa sinua.

MITÄ MINUN PITÄISI TIETÄÄ IMLYGIC-HOIDOSTA?

- Imlygic on heikennetty tyyppin 1 *Herpes simplex* -virus (HSV-1), jota kutsutaan yleisesti huuliherpesvirukseksi (yskänrokkovirukseksi).
- Imlygic voi aiheuttaa hengenvaarallisen herpesinfektion ihmisille, joiden immuunijärjestelmän toiminta on heikentynyt.
- Imlygic voi vahingoittaa sikiötä. Kerro lääkärille, jos olet raskaana tai suunnittelet raskautta.
- Sinulle voi kehittyä huuliherpes (yskänrokko) tai vakavampi herpesinfektio Imlygic-hoidon aikana tai sen jälkeen.
- Imlygic-virus voi tarttua myös läheisiisi (samassa taloudessa asuviin, sinusta huolehtivaan henkilöön, seksikumppaniisi tai samassa sängyssä nukkuvaan ihmiseen), jos he ovat suoraan kosketuksessa ruumiinnesteiden tai pistoskohdan kanssa.
- Kerro nämä tiedot myös läheillesi, erityisesti niille, jotka ovat raskaana tai joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt.
- Pistoskohdat on pidettävä koko ajan ilma- ja vesitiiviillä sidoksilla peitettynä. Kiinnitä side terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaisesti. Jos side löystyy tai irtoaa, vaihda heti tilalle puhtas side.

HERPESINFEKTION OIREET

- Kipu, kirvely tai pistely rakkuloissa, joita voi ilmaantua suun ympärille (yskänrokko), sukuelimiin, sormiin tai korviin ja joihin voi muodostua myös rupia
- Silmäkipu, valonarkuus, silmän rähmiminen, punoitus, kyynelvuoto tai näön hämärtyminen
- Heikkouden tunne käsissä tai jaloissa
- Voimakas uneliaisuus (väsymyksen tunne)
- Kuume, johon liittyy päänsärkyä
- Oksentelu
- Sekavuus
- Muistinmenetys
- Kouristuskohtaukset

**KERRO HETI LÄÄKÄRILLE, JOS SINULLE ILMAANTUU JOKIN NÄISTÄ OIREISTA
IMLYGIC-HOIDON AIKANA TAI JÄLKEEN.**

Jatkuu kääntöpuolella.

Tässä oppaassa ei ole kaikkia sinulle tärkeitä Imlygic-valmisteen turvallisuustietoja. Lue lisätietoja Imlygic-valmisteen pakkausselosteesta, jonka saat terveydenhoitohenkilökunnalta. Lue pakkausseloste jokaisen pistoskerran yhteydessä, sillä tiedot saattavat muuttua ajan myötä.

MITEN VOIN ESTÄÄ IMLYGIC-TARTUNNAN?

- Vältä läheistesi joutumista suoraan kosketukseen pistoskohdan tai ruumiinnesteiden kanssa:
 - Hoitoa saaneen potilaan on toimittava niin, etteivät läheiset joudu kosketuksiin hänen verensä ja ruumiinnesteidensä kanssa Imlygic-hoidon aikana ja 30 vuorokauden ajan viimeisen Imlygic-hoitokerran jälkeen. Seuraavia toimintoja on vältettävä:
 - Yhdyntää ilman lateksikondomia
 - Suutelemista, jos jommallakummalla teistä on avoin haava suussa
 - Yhteisten ruokailuvälineiden, astioiden ja juomalasiensa käyttämistä
 - Yhteisten injektioneulojen, parranajovälineiden ja hammasharjojen käyttämistä
- Vältä pistoskohdan koskettelua tai raapimista.
- Pidä pistoskohta koko ajan ilma- ja vesitiiviillä siteellä peitettynä. Jos pistoskohdasta vuotaa tai tihkuu eritettä, pidä side paikoillaan, kunnes eritevuoto tai tihkuminen on loppunut. Kiinnitä side terveydenhuollon ammattilaisen antamien ohjeiden mukaisesti. Jos side löystyy tai irtoaa, vaihda heti tilalle puhdas side.
- Laita käytetyt sidemateriaalit ja puhdistusvälineet suljettavaan muovipussiin ja hävitä ne talousjätteiden mukana pussiin suljettuina, jotta samassa taloudessa asuvat eivät joudu suoraan kosketukseen niiden kanssa.

MITÄ MINUN PITÄISI KERTOA LÄHEISILLENI IMLYGIC-HOIDOSTA?

Neuvo heitä

- välttämään suoraa kosketusta ruumiinnesteidesi tai pistoskohtien kanssa.
- käyttämään suojakäsineitä aina sidettäsi vaihtaessaan.
- puhdistamaan altistunut alue vedellä ja saippualla ja/tai desinfiointiaineella, jos he altistuvat vahingossa Imlygic-valmisteelle. Jos heille ilmaantuu herpesinfektion merkkejä tai oireita, kehoita heitä ottamaan yhteyttä lääkäriin.

Jos läheisesi on raskaana tai hänen immuunijärjestelmänsä on heikentynyt, hän ei saa vaihtaa siteitäsi eikä puhdistaa pistoskohtaasi.

KESKUSTELE LÄÄKÄRIN TAI SAIRAANHOITAJAN KANSSA, JOS SINULLA ON KYSYTTÄVÄÄ IMLYGIC-HOIDOSTA.

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä terveydenhuollon ammattilaiselle. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan osoitteeseen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA (www-sivusto: www.fimea.fi). Kerro aina potilaskorttiisi merkitty eränumero, kun ilmoitat haittavaikutuksista.

Tässä oppaassa ei ole kaikkia sinulle tärkeitä Imlygic-valmisteen turvallisuustietoja. Lue lisätietoja Imlygic-valmisteen pakkausselosteesta, jonka saat terveydenhoitohenkilökunnalta. Lue pakkausseloste jokaisen pistoskerran yhteydessä, sillä tiedot saattavat muuttua ajan myötä.