

PATIENTINFORMATION

ORUDIS® 2,5 % gel har ordinerats till dig av din läkare. Hon/han har informerat dig om vilka försiktighetsåtgärder som bör vidtas med detta läkemedel.

Följande text är en påminnelse.

ORUDIS® 2,5 % gel innehåller ketoprofen. Exponering av sol (även vid soldis) eller UV-ljus från solarium på områden som behandlats med läkemedel som innehåller ketoprofen för utvärtes bruk kan ge hudreaktioner som kan vara allvarliga (ljusöverkänslighet) och sällsynta fall av allvarliga reaktioner såsom eksem med blåsor som kan sprida sig eller bli allmänna. Andra allergiska hudreaktioner såsom rodnad, klåda och brännande känsla kan också förekomma.

Dessutom har överkänslighetsreaktioner inträffat vid samtidig användning av produkter innehållande oktokrylen och ketoprofen. Oktokrylen är kemiska solfilter som används i åtskilliga kosmetik- och hygienartiklar, såsom solskyddsmedel, schampo, rakvatten, dusch- och badgeler, hudkrämer, läppstift, antirynekkrämer, make-up borttagningsmedel och hårspray för att skydda mot ljusets nedbrytning.

Därför måste följande rekommendationer följas **före, under användning och två veckor efter behandling** med ketoprofen gel.

- Använd inte ketoprofen gel om du har känd allergi mot ketoprofen (det aktiva ämnet), tiaprofensyra, fenofibrat, UV-blockerare (solskyddsmedel, speciellt de som innehåller oktokrylen) eller parfymer.
- Utsätt inte områden behandlade med ketoprofen gel för solljus (eller soldis) eller UV-ljus från solarium. Vid vistelse utomhus ska dessa områden skyddas genom att bära kläder, under behandlingen och 2 veckor efter avslutad behandling.
- Använd inte ketoprofen gel under tätt sittande bandage.
- Tvätta händerna noggrant efter varje användning av ketoprofen gel.
- Begränsa användning av ketoprofen gel upp till en vecka.
- Sluta använda gel omedelbart om du får allergiska reaktioner, inklusive reaktioner efter samtidig användning av produkter innehållande oktokrylen.

För ytterligare information, kontakta din läkare eller apotekspersonal.