

# Femke 30 mg

kalvopäällysteinen tabletti  
ulipristaaliasetaatti

## *Femke jälkiehkäisyvalmiste*

**Femke on lisäinformaatiota vaativa itsehoitolääke.  
Se soveltuu hedelmällisessä iässä oleville  
naisille, mukaan lukien nuoret.**

**Annostus:** Yksi tabletti suun kautta mahdollisimman pian, mutta viimeistään 5 vuorokauden (120 tunnin) kuluessa suojaamattoman yhdynnän tai ehkäisy menetelmän pettämisen jälkeen. Jos oksentaa kolmen tunnin kuluessa tabletin ottamisen jälkeen, on otettava toinen tabletti mahdollisimman pian.

### **Kehota ottamaan Femke mahdollisimman pian**

Femke estää tai viivästyttää ovulaatiota. Ovulaation ajankohtaa kuukautiskierrossa ei voi tarkkaan ennustaa, ja siksi jälkiehkäisytabletti on aina otettava mahdollisimman pian suojaamattoman yhdynnän jälkeen painosta tai painoindeksistä riippumatta.

**Yleiset haittavaikutukset:** Mielialahäiriöt, päänsärky, heitehuimaus, pahoinvointi, vatsakipu, epämukava olo vatsassa, oksentelu, lihaskipu, selkäkipu, dysmenorrea, lantiokipu, rintojen arkuus, väsymys.

**AMMATTILAISEN TASKUKORTTI**

# Jotta jälkiehkäisy onnistuisi, käy asiakkaan kanssa läpi seuraavat asiat:

1. Femke-valmistetta ei suositella:
    - Vaikeaa maksan vajaatoimintaa sairastaville
    - Naisille, joilla on vaikea astma, jota hoidetaan suun kautta otettavalla glukokortikoidilla
    - Tiettyjen epilepsia-, HIV- ja tuberkuloosilääkkeiden kanssa
    - Mäkiuimaa sisältävien valmisteiden kanssa
    - Vasta-aiheet: yliherkkyys vaikuttavalle aineelle tai apuaineille
  2. Pyydä asiakasta lukemaan pakkausseloste.
  3. Kerro, että Femke-tabletti on otettava heti.
  4. Imetystä ei suositella viikkoon Femke-valmisteen käytön jälkeen.
  5. Kuukautiset tai mahdollinen raskaus:
    - Femke-tabletin ottamisen jälkeen
  - kuukautiset voivat alkaa aiemmin tai myöhemmin
  - Jos kuukautiset ovat yli 7 vrk myöhässä, on tehtävä raskaustesti
  - Raskaustesti on tehtävä myös, jos kuukautiset ovat epätavallisen niukat, runsaat tai jos esiintyy raskausoireita
  - Femke-valmistetta käyttäneiden naisten raskaudet pyydetään ilmoittamaan rekisteriin: [www.ulipristal-pregnancy-registry.com](http://www.ulipristal-pregnancy-registry.com), jossa potilastiedot säilytetään nimettöminä
  - Femke ei keskeytä jo alkanutta raskautta
6. Luotettavaa ehkäisymenetelmää pitää käyttää seuraavien yhdyntöjen aikana, seuraaviin kuukautisiin saakka.
  7. Kehota asiakasta kääntymään lääkärin puoleen keskustelemaan hänelle sopivasta, säännöllisestä ehkäisymenetelmästä.

**Femke 30 mg kalvopäällysteinen tabletti. Vaikuttava aine:** Ulipristaaliasetaatti. **Käyttöaihe:** Jälkiehkäisy. **Annostus ja antotapa:** Yksi tabletti otetaan suun kautta mahdollisimman pian, mutta viimeistään 120 tunnin (viiden päivän) kuluessa suojaamattoman yhdynnän tai ehkäisymenetelmän pettämisen jälkeen. Tabletti voidaan ottaa missä tahansa vaiheessa kuukautiskiertoa. Jos kolmen tunnin kuluessa tabletin ottamisesta ilmenee oksentelua, on otettava toinen tabletti. Jos naisen kuukautiset ovat myöhässä tai jos ilmenee raskauden oireita, raskauden mahdollisuus tulee poissulkea ennen kuin tabletti annetaan. **Vasta-aiheet:** Yliherkkyys ulipristaalille tai apuaineille. **Varoitukset ja käyttöön liittyvät varoimet:** Vain satunnaisesti käyttöön. Jos seuraavat kuukautiset ovat yli seitsemän päivää myöhässä, jos kuukautiset ovat luonteeltaan epänormaali tai jos ilmenee raskauden oireita tai tilanne on muutoin epäselvä, tulee tehdä raskaustesti. Ei suositella käytettäväksi samanaikaisesti levonorgestreeliä sisältävän jälkiehkäisyvalmisteen kanssa tai naisille, joilla on vaikea maksan vajaatoiminta tai suun kautta otettavalla glukokortikoidilla hoidettava vaikea astma. Sisältää laktoosia. **Yhteisvaikutukset:** Femken teho saattaa heikentyä, jos ritonaviriä tai CYP3A4-induktoreita käytetään samanaikaisesti tai jos näitä valmisteita on käytetty edeltävien 4 viikon aikana. Femke saattaa heikentää progestiinia sisältävien lääkevalmisteiden vaikutusta. **Hedelmällisyys, raskaus ja imetys:** Ei pidä käyttää raskauden aikana. Imetystä ei suositella viikkoon Femken käytön jälkeen. **Vaikutus ajokykyyn ja koneidenkäyttökykyyn:** Ulipristaaliasetaatilla on vähäinen tai kohtalainen vaikutus ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn. **Haittavaikutukset:** Yleiset: Mielialahäiriöt, päänsärky, heitehuimaus, pahoinvointi, vatsakipu, epämukava olo vatsassa, oksentelu, lihaskipu, selkäkipu, dysmenorrea, lantiokipu, rintojen arkuus, väsymys. Muut haittavaikutukset, ks. valmisteyhteenveto. **Pakkauskoiko ja hinta (01/2020):** 1 tabl 10,60 €. Ei korvattavuutta. **Tutustu valmisteyhteenvetoon ennen lääkkeen määräämistä.**