

Sumatriptan Teva 50 mg, 2 tablettia

Lääkkeen toimittamisohje

Ennen kun toimitat Sumatriptan Tevaa varmista, että tuote soveltuu potilaalle. Sumatriptan Teva on tarkoitettu ainoastaan lääkärin diagnosoiman migreenin hoitoon, johon on aiemmin määrätty hoidoksi sumatriptaania Tarkista potilaalle määrätty lääkitys e-reseptitietokannasta potilaan suostumuksella.

1. Varmista, että


- A. potilaan oireet viittaavat migreeniin **JA**
- B. potilas on käyttänyt aiemmin sumatriptaania migreeninsä hoitoon **JA**
- C. potilaan sumatriptaani-lääkemääräyksen voimassaolo on päättynyt korkeintaan 6 kuukautta aiemmin.

2. Ohjaa potilas lääkäriin, jos;

- A. Potilaan migreenioireet ovat muuttuneet: tiheys on kasvanut merkittävästi aiemmasta tai oireet ovat pahentuneet edellisen lääkrissäkäynnin jälkeen.
- B. Potilaalla esiintyy migreenikohtauksen aikana seuraavia oireita: vartalon toispuolista heikkoutta, kömpelyyttä ja vaikeuksia koordinoida liikkeitä, korvien soimista (tinnitus), tajunnantason heikkenemistä tai kouristuksia.
- C. Potilas käyttää MAO:n estäjää (esim. moklobemidi, selegiliini, rasagiliini)
- D. Potilas käyttää masennuslääkkeitä (SSRI, SNRI) jotka on määrätty sen jälkeen, kun potilas edellisen kerran käynyt migreenin vuoksi lääkärin vastaanotolla.
- E. Potilas käyttää sydän- ja verenpainetaudin hoitoon määrättyjä valmisteita (mm. ACE-estäjät, AT-II –estäjät, beetasalpaajat, lipidejä muuntavat lääkeaineet, nitraatit)
- F. Potilas on alle 18- tai yli 65-vuotias tai raskaana

Potilaalle voi toimittaa kerrallaan yhden 2 tabletin Sumatriptan Teva 50 mg pakkauksen. Jos potilaan resepti on vanhentunut, muistuta potilasta varaamaan aika lääkäriin migreenin hoidon seuranta-aikaan ja reseptin uusimista varten.

Epäselvissä tapauksissa ohjaa potilas aina lääkärin vastaanotolle.



Sumatriptan Tevan annostus:

Annos 18-65-vuotiaille aikuisille: 1 tabletti (50 mg) migreenikohtaukseen. Tabletti tulee niellä kokonaisena veden kera. Jos potilaalla on nielemisvaikeuksia, voi tabletin puolittaa ja ottaa kahdessa osassa. Jos migreenioireet lievittyvät ensimmäisen tabletin jälkeen, mutta palaavat myöhemmin, potilas voi ottaa vielä toisen tabletin. Potilaan on odotettava ainakin 2 tuntia ensimmäisen tabletin ottamisesta ennen kuin hän voi ottaa toisen tabletin. Annostus korkeintaan 2 tablettia 24 tunnin sisällä. Jos migreenioireet eivät lieydy ensimmäisen tabletin oton jälkeen, eikä tabletilla ole vaikutusta, ei tule ottaa

lisäannoksia saman kohtauksen aikana. Seuraavan kerran, kun potilaalle tulee migreenikohtaus, Sumatriptan Tevaa voi käyttää uudelleen.

Jos päänsärky kestää yli 72 tuntia tai oireet muuttuvat tai pahenevat aiemmista migreenikohtauksista, ohjaa potilas ottamaan välittömästi yhteys lääkäriin.

ratiopharm