

Lista över allergier:

---

Lista över andra läkemedel:

---

---

Se till att du alltid tar med en lista över alla andra läkemedel som du använder vid varje besök till hälso- och sjukvårdspersonal.

FI-NON-00771 12.4.2022

Datum för påbörjad behandling  
med Remicade:

Senaste behandlingar:

---

---

---

---

FI-NON-00771 12.4.2022

Be din läkare att notera typ och datum för  
senaste tuberkulosundersökning:

Datum

Undersökning:

---

Resultat:

---

Datum

Undersökning:

---

Resultat:

---

FI-NON-00771 12.4.2022

# Patientkort



Namn, patient:

---

Namn, läkare:

---

Telefonnummer, läkare:

---

FI-NON-00771 12.4.2022

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan och under behandlingen med Remicade.

Visa detta kort vid varje tillfälle som du besöker läkare.

## INFEKTIONER

### Före behandling med Remicade

- Tala om för din läkare om du har en infektion, även en lindrig sådan.
- Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare om du någonsin har haft tuberkulos eller om du har varit i nära kontakt med någon som har haft tuberkulos. Din läkare kommer att undersöka om du har tuberkulos. Be din läkare att notera typ och datum för senaste tuberkulosundersökning på kortet.
- Tala om för din läkare om du har hepatit B eller om du vet eller misstänker att du är bärare av hepatit B virus.

### Under behandling med Remicade

- Tala omedelbart om för din läkare om du har tecken på en infektion. Sådana tecken omfattar feber, trötthetskänsla, (ihållande) hosta, andfåddhet, viktminskning, nattliga svettningar, diarré, sår, tandbesvär, sveda vid urinering eller influensaliknande symtom.

## GRAVIDITET, AMNING OCH VACCINATIONER

Om du har fått Remicade under din graviditet eller om du ammar, är det viktigt att du informerar ditt barns läkare om detta innan ditt barn får något vaccin. Ditt barn ska inte få 'levande vacciner', såsom BCG (används för att förhindra tuberkulos) inom 12 månader efter födseln eller medan du ammar, om inte ditt barns läkare rekommenderar något annat.

Ha alltid med dig detta kort i 4 månader efter din sista Remicade-dos, eller i händelse av graviditet i 12 månader efter ditt barns födelse. Biverkningar kan uppträda långt efter sista dosen.

Läs noga Remicade bipacksedel i förpackningen innan du börjar använda detta läkemedel. Det är viktigt att du och din läkare skriver ned produktnamnet och tillverkningsatsnumret på ditt läkemedel.

