

Allergiat:

---

Luettelo muista käytössä olevista lääkkeistä:

---

---

---

Varmista, että sinulla on mukana luettelo kaikista muista käyttämäsi lääkkeitä, kun menet vastaanotolle.

Remicade-hoito aloitettu (pvm):

Annetut infuusiot (pvm):

---

---

---

---

REMICADE-HOIDOT

Pyydä lääkärää merkitsemään tähän tiedot viimeisimmästä tuberkuloosiseulonnasta:

Menetelmä:

Tulos:

Menetelmä:

Tulos:

TUBERKULOOSITESTIT



Potilaskortti

Potilaan nimi:

Lääkärin nimi:

Lääkärin puh.nro:

Tämä potilaskortti sisältää tärkeää turvallisuuteen liittyvää tietoa, josta sinun on hyvä olla tietoinen ennen Remicade-hoidon aloitusta ja sen aikana.

Näytä tämä kortti kaikille hoitoosi osallistuville lääkäreille.

### SYDÄMEN VAJAATOIMINTA

#### Ennen Remicade-hoitoa, kerro lääkärille

- jos sinulla on jokin sydänongelma kuten lievä sydämen vajaatoiminta.

#### Remicade-hoidon aikana, kerro lääkärille heti

- jos sinulle ilmaantuu sydänongelmien oireita. Tällaisia oireita ovat hengenahdistus, jalkojen turvotus tai muutos sydämen lyöntirytmissä.

### INFEKTIOT

#### Ennen Remicade-hoitoa, kerro lääkärille

- jos sinulla on jokin infektio, vaikka se olisi hyvin vähäinenkin.
- jos sinulla on joskus ollut tuberkuloosi tai jos olet joskus ollut läheisessä kontaktissa henkilön kanssa, jolla on ollut tuberkuloosi. Sinulle tehdään tuberkuloosin seulontakokeet. Pyydä, että lääkäri merkitsee tiedot seulontakokeista tähän korttiin.
- jos sinulla on B-hepatiitti tai jos tiedät tai epäilet olevasi B-hepatiittiviruksen kantaja.

#### Remicade-hoidon aikana kerro heti lääkärille

- jos sinulle ilmaantuu infektio-oireita, kuten kuumetta, väsymystä, (itsepintaista) yskää, hengenahdistusta, painon alenemista, yöhikoilua, ripulia, haavaumia, hammasongelmia, kirvelyä virtsatessa tai flunssan kaltaisia oireita.

### RASKAUS JA ROKOTUKSET

- Jos olet saanut Remicadea raskauden aikana, on tärkeää että kerrot siitä lastasi hoitavalle lääkärille, ennen kuin lapsesi saa mitään rokotuksia. Lapsellesi ei saa antaa "elävää rokotetta", kuten BCG-rokotetta (käytetään tuberkuloosin ehkäisyyn) 6 kuukauteen syntymän jälkeen.

Pidä tämä kortti mukanasasi 4 kuukauden ajan Remicade-annoksen jälkeen, tai jos olet raskaana, vähintään 6 kuukauden ajan synnytyksen jälkeen. Haittavaikutuksia voi ilmaantua pitkänkin ajan kuluttua viimeisestä annoksesta.

Lue Remicaden pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

On tärkeää, että sinä ja lääkäri merkitsette muistiin lääkkeesi kaupanimen ja eränumeron.

### TÄMÄ POTILAS SAA REMICADE-HOITOA.

REMICADE on TNF-alfa-salpaaja. Lääkärin tulee huomioida, että TNF-alfan suppressio saattaa peittää infektion oireita kuten kuumeen. Vakaviin infektoihin liittyvien poikkeavien kliinisten ilmenemisten varhainen tunnistaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta diagnoosin ja hoidon viivästyminen minimoitaisiin.

**THIS PATIENT IS ON REMICADE**, which is an TNF alpha inhibitor. It should be noted that suppression of TNF alpha may mask symptoms of infection such as fever. Early recognition of atypical clinical presentations of serious infections is critical in order to minimize delays in diagnosis and treatment.

