

Lista över allergier:

Lista över andra läkemedel:

Se till att du alltid tar med en lista över alla andra läkemedel som du använder vid varje besök till hälso- och sjukvårdspersonal.

Datum för påbörjad behandling med Remicade:

Senaste behandlingar:

Be din läkare att notera typ och datum för senaste tuberkulosundersökning:

Undersökning:

Resultat:

Undersökning:

Resultat:



Patientkort

Namn, patient:

Namn, läkare:

Telefonnummer, läkare:

Detta patientkort innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan och under behandlingen med Remicade.

Visa detta kort vid varje tillfälle som du besöker läkare.

HJÄRTSVIKT

Före behandling med Remicade

- Tala om för din läkare om du har hjärtproblem såsom lindrig hjärtsvikt.

Under behandling med Remicade

- Tala omedelbart om för din läkare om du märker tecken på hjärtproblem. Sådana tecken omfattar andfåddhet, svullna fötter eller förändringar av hur hjärtat slår.

INFEKTIONER

Före behandling med Remicade

- Tala om för din läkare om du har en infektion, även en lindring sådan.
- Det är mycket viktigt att du talar om för din läkare om du någonsin har haft tuberkulos eller om du har varit i nära kontakt med någon som har haft tuberkulos. Din läkare kommer att undersöka om du har tuberkulos. Be din läkare att notera typ och datum för senaste tuberkulosundersökning på kortet.
- Tala om för din läkare om du har hepatit B eller om du vet eller misstänker att du är bärare av hepatit B virus.

Under behandling med Remicade

- Tala omedelbart om för din läkare om du har tecken på en infektion. Sådana tecken omfattar feber, trötthetskänsla, (ihållande) hosta, andfåddhet, viktminskning, nattliga svettningar, diarré, sår, tandbesvär, sveda vid urinering eller influensaliknande symtom.

GRAVIDITET OCH VACCINATIONER

- Om du har fått Remicade under din graviditet, är det viktigt att du informerar ditt barns läkare om detta innan ditt barn får något vaccin. Ditt barn ska inte få 'levande vacciner', såsom BCG (används för att förhindra tuberkulos) inom 6 månader efter födseln.

Ha alltid med dig detta kort i 4 månader efter din Remicade-dos, eller i händelse av graviditet i minst 6 månader efter ditt barns födelse. Biverkningar kan uppträda långt efter sista dosen.

Läs noga Remicade bipacksedel i förpackningen innan du börjar använda detta läkemedel. Det är viktigt att du och din läkare skriver ned produktnamnet och tillverkningsnumret på ditt läkemedel.

TÄMÄ POTILAS SAA REMICADE-HOITOA.

REMICADE on TNF-alfa-salpaaja. Lääkäriin tulee huomioida, että TNF-alfan suppressio saattaa peittää infektion oireita kuten kuumeen. Vakaviin infektiioihin liittyvien poikkeavien kliinisten ilmenemisten varhainen tunnistaminen on ratkaisevan tärkeää, jotta diagnoosin ja hoidon viivästyminen minimoitaisiin.

THIS PATIENT IS ON REMICADE, which is an TNF alpha inhibitor. It should be noted that suppression of TNF alpha may mask symptoms of infection such as fever. Early recognition of atypical clinical presentations of serious infections is critical in order to minimize delays in diagnosis and treatment.

