

Näytä tämä kortti hoitohenkilökunnalle



POTILASKORTTI

Potilas saa Ruconest®-hoitoa periytyvän angioedeeman akuutteihin kohtauksiin. Ruconest® on ihmisen C1-esteraasi-inhibiittorin rekombinantti, joka on puhdistettu siirtogeenisen kanin maidosta ja sisältää kanin proteiinien jäämiä. Ennen Ruconest®-hoidon aloittamista potilaan aiempi ja nykyinen sairaushistoria on arvioitava huolellisesti kaniiallergian varalta. Jos potilaalla tiedetään tai epäillään olevan kaniiallergia, muita, ei-kaniperäisiä hoitovaihtoehtoja on harkittava.

Noudata tämän potilaan hoidon suhteen seuraavaa käytäntöä:

1. Seuraa potilaan kliinisiä yliherkkyyteen viittaavia merkkejä ja oireita.
2. Anafylaktisen reaktion tai sokin tapauksessa järjestä ensihoito välittömästi.
3. Kerro potilaalle yliherkkyyksireaktion yleisistä merkeistä, joita ovat mm. nokkosihottuma, yleistynyt urtikaria, puristava tunne rinnassa, hengityksen vinkuminen, hypotensio ja anafylaksia, ja että jonkin näistä oireista ilmaantuessa asiasta on ilmoitettava hoitohenkilökunnalle. Keskustele potilaan kanssa miten oireet eroavat angioedeemakohtauksesta.
4. Neuvo potilasta määräjain raportoimaan mahdollisista kaniiallergiareaktioista välittömästi.
5. Pyydä potilasta pitämään tätä korttia aina mukanaan ja esittämään se periytyvän angioedeeman akuuttia kohtausta hoitavalle henkilökunnalle.
6. Raportoi kaikista epäilyistä yliherkkyyksireaktioista / immunologisista haittavaikutuksista.

Lisätietoa saat tutustumalla opetusmateriaaliin ja valmisteyhteenvetoon tai ottamalla yhteyttä paikalliseen Ruconest®-edustajaan Oy Swedish Orphan Biovitrum AB, puhelin: 0201 558 840.

Minulla on periytyvä angioedeema (HAE)

Potilaan nimi: _____

Henkilötunnus: _____

Paino: _____

Oma HAE-asiantuntija tai -hoitoyksikkö:

Nimi: _____

Puhelin: _____

Minulla on diagnosoitu periytyvä angioedeema (HAE), harvinainen autosominen häiriö, johon liittyy selvästi havaittavia toistuvia turvotuskohtauksia. Turvotuskohtaukset johtuvat hallitsemattomista komplementti- ja kontaktijärjestelmien aktivaatioista, jotka puolestaan aiheutuvat endogeenisen C1-esteraasi-inhibiittorin määrällisestä tai toiminnallisesta puutteesta. Ilman asianmukaista hoitoa HAE-kohtaukset voivat vakavasti vaarantaa terveyden, mikäli turvotus ilmenee esimerkiksi nielun tai kurkunpään alueella.

Voin käyttää Ruconest®-valmistetta vain, jos minulla ei ole tunnettua tai epäiltyä kaniallergiaa.

Käy lääkärillä, jos uskot allergisoituneesi kaneille.
Lisätietoja, lue pakkausseloste.



Oy Swedish Orphan Biovitrum Ab
Äyritie 18
01510 Vantaa

PHARMING