

Detta påminnelsekort innehåller viktig säkerhetsinformation som du måste känna till före och under behandling med zoledronsyra (Zoledronic acid Stada 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning) injektioner mot cancerrelaterade tillstånd.

Din läkare har rekommenderat att du får zoledronsyra (Zoledronic acid Stada 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning) injektioner för att förebygga benkomplikationer (t.ex. benbrott) som orsakas av skelettmastaser och/eller för att minska mängden kalcium i blodet hos vuxna patienter med alltför höga halter p.g.a. en tumör.

En biverkning som kallas osteonekros i käken (svåra bensador i käken) har rapporterats i mindre vanliga fall hos patienter som får zoledronsyra (Zoledronic acid Stada 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning) injektioner mot cancerrelaterade tillstånd. Osteonekros i käken kan också uppstå efter avslutad behandling.

För att minska risken för att utveckla osteonekros i käken finns det vissa försiktighetsåtgärder du bör vidta:

Innan du börjar behandlingen:

- Be din läkare berätta för dig om osteonekros i käken innan du inleder behandlingen.
- Fråga din läkare om en tandundersökning rekommenderas innan du inleder behandling med zoledronsyra (Zoledronic acid Stada 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning).
- Berätta för din läkare/sjuksköterska (hälso- och sjukvårdspersonal) om du har några problem med din mun eller tänder.

Patienter som genomgår tandgrepp (t.ex. tandutdragning), inte får regelbunden tandvård, har en sjukdom i tandköttet, röker, får olika typer av cancerbehandlingar eller har tidigare behandlats med en bifosfonat (för behandling eller förebyggande av skelettsjukdomar) kan ha en högre risk för osteonekros i käken.

Under behandlingen:

- Du bör upprätthålla en god munhygien, se till att dina tandproteser passar ordentligt och gå på regelbundna tandkontroller.
- Om du får tandbehandling eller ska genomgå tandkirurgi (t.ex. dra ut en tand), informera din läkare om din tandvård och berätta för din tandläkare att du behandlas med zoledronsyra (Zoledronic acid Stada 4 mg/100 ml infusionsvätska, lösning).
- Kontakta din läkare och tandläkare omedelbart om du upplever några problem med din mun eller tänder såsom lösa tänder, smärta eller svullnad, eller sår som inte läker eller vätskar, eftersom dessa kan vara tecken på osteonekros i käken.

Läs bipacksedeln för mer information.