



## Potilaskortti

**Pidä tämä kortti mukanasasi tai Enbrelä saavan lapsen mukana vielä 2 kk ajan viimeisen Enbrel-annoksen jälkeen, sillä haittavaikutuksia voi esiintyä vielä Enbrel-hoidon päätyttyäkin.**

Fimean hyväksymispäivämäärä 29.10.2020  
Versio 1.0 PP-ENB-FIN-0281-02112020

Tämä kortti sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joista sinun tai Enbrelä saavan lapsen tulee tietää ennen Enbrel-hoidon aloittamista ja hoidon aikana. Jos jokin kortin seikka jää epäselväksi, pyydä lääkäriä selittämään se sinulle.

- Näytä tämä kortti kaikille sinua tai lasta hoitaville lääkäreille.
- Ks. lisätiedot Enbrel-valmisteen pakkausselosteesta.
- Sinun ja lääkärisi on tärkeää muistaa merkitä muistiin saamasi lääkkeen nimi ja eränumero.

### Infektiot

Enbrel voi suurentaa riskiä saada jokin, ehkä vakavakin, infektio.

- Älä käytä Enbrelä, jos sinulla tai Enbrelä saavalla lapsella on jokin infektio. Jos olet epävarma, kysy neuvoa lääkäriltäsi.
- Hakeudu heti lääkärin hoitoon, jos sinulle tai Enbrelä saavalle lapselle kehittyy infektioihin viittaavia oireita kuten kuumetta, pitkittynyttä yskää, painon laskua tai voimattomuutta.
- Sinut tai Enbrelä saava lapsi on tutkittava tuberkuloosin varalta. Lääkäri merkitsee viimeisimmän tuberkuloositutkimuksen päivämäärän ja tulokset tähän.

Testi: \_\_\_\_\_

Päivämäärä: \_\_\_\_\_

Tulokset: \_\_\_\_\_

Testi: \_\_\_\_\_

Päivämäärä: \_\_\_\_\_

Tulokset: \_\_\_\_\_

- Pyydä lääkäriä kirjaamaan tähän muut lääkkeesi tai Enbrelä saavan lapsen lääkkeet, jotka voivat suurentaa riskiä saada infektio.

_____	_____
_____	_____
_____	_____

## Kongestiivinen sydämen vajaatoiminta

- Jos sinulla tai Enbrelä saavalla lapsella esiintyy kongestiivisen sydämen vajaatoimintaan tai jo todetun kongestiivisen sydämen vajaatoiminnan pahentumiseen liittyviä oireita kuten hengenahdistusta, nilkkojen turvotusta, pitkittynyttä yskää tai uupumusta, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Potilaan nimi: \_\_\_\_\_

Lääkärin nimi: \_\_\_\_\_

Lääkärin puhelinnumero: \_\_\_\_\_

## Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukseen Fimeaan ([www.fimea.fi](http://www.fimea.fi), Haittavaikutuksista ilmoittaminen) tai Pfizer Oy:n puhelinvaihteen (09-430 040) kautta.