

Tämä kortti sisältää tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja, joista sinun on oltava tietoinen ennen kuin saat hoitoa seuraavilla lääkkeillä ja hoidon aikana:

## Zoledronic Acid Hospira

**5 mg/100 ml infuusioneste, liuos**

Lääkäri on suositellut sinulle hoitoa Zoledronic Acid Hospira 5 mg/100 ml infuusionesteellä, liuksella, jota käytetään Pagetin luutaudin hoitoon aikuisilla. Tämä sairaus aiheuttaa luukatoa ja luiden haurastumista, jolloin luut voivat murtua tavanomaista helpommin.

Tsoledronihappoa osteoporoosin hoitoon saaneilla potilailla on raportoitu hyvin harvinaisena haittavaikutuksena leuan osteonekroosiksi kutsuttua sairautta (leukaluun vaikea-asteinen vaurio). Leuan osteonekroosi voi ilmetä myös hoidon lopettamisen jälkeen.

On tärkeää pyrkiä estämään leuan osteonekroosi, koska se on kivulias sairaus ja se voi olla vaikea hoitaa. Jotta leuan osteonekroosin kehittymisen riskiä voidaan vähentää, sinun pitää noudattaa joitakin varotoimia:

### Ennen hoidon aloittamista:

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle (terveydenhuollon ammattilaiselle), jos sinulla on ongelmia suun tai hampaiden kanssa. Lääkäri saattaa kehottaa sinua käymään hammastarkastuksessa, jos

- olet aiemmin saanut bisfosfonaattihoitoa
- käytät kortikosteroideiksi kutsuttuja lääkkeitä (esim. prednisolonia tai deksametasonia)
- tupakoit
- sairastat syöpää
- et ole pitkään aikaan käynyt hammastarkastuksessa
- sinulla on ongelmia suun tai hampaiden kanssa.

### Hoidon aikana:

- Sinun pitää säilyttää hyvä suuhygienia, pestä hampaat säännöllisesti ja käydä säännöllisesti hammastarkastuksessa. Jos käytät hammasproteesia, pidä huoli, että se istuu kunnolla.
- Jos saat hammashoitoja tai sinun on määrä mennä hammasleikkaukseen (esim. hampaanpoisto), kerro siitä lääkärille ja kerro hammaslääkärille, että saat tsoledronihappohoitoa.
- Ota välittömästi yhteyttä lääkäriin ja hammaslääkəriin, jos sinulla on ongelmia suun tai hampaiden kanssa (esim. hampaiden heiluminen, kipu tai turvotus tai haavaumien parantumattomuus tai märkiminen), sillä ongelmat saattavat olla oire leuan osteonekroosista.

Lue lisätietoja pakkauksessa olevasta pakkausselosteesta

### Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan [www-sivusto: www.fimea.fi](http://www.fimea.fi), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.