

TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

Tämä potilas saa Zinbryta-hoitoa, johon liittyy vakavan maksavaurion riski



Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Epäillyistä haittavaikutuksista pyydetään ilmoittamaan Fimealle (www.fimea.fi).

LÄÄKÄRIN YHTEYSTIEDOT

Lääkärin nimi:

Puhelinnumero:

POTILAAN TIEDOT

Zinbryta-hoito aloitettu:

Potilaan nimi:

Omaishoitajan / muun sinua hoitavan henkilön nimi ja puhelinnumero
(häätötilanteita varten):

DA-FH0010(1) | 01/2017 versio numero: 1,
hyväksymispäivämäärä: 09/2016

POTILASKORTTI

Zinbryta (daklitsumabi)

150 mg pistoksena ihon alle

Injektioneste, liuos, esitäytetty kynä

Injektioneste, liuos, esitäytetty ruisku



MIKSI SINULLA ON TÄMÄ KORTTI JA MIKÄ SEN TARKOITUS ON

POTILASKORTTI

Potilaskortissa on tärkeitä turvallisuustietoja, joista sinun pitää olla tietoinen Zibryta-hoidon aikana. Pidä potilaskortti aina mukanas. Aina kun saat jotakin hoitoa, kerro lääkärille, että saat Zinbryta-hoitoa, ja näytä hänelle potilaskortti, vaikka hoito ei koskisikaan MS-tautia.

KORTIN SÄILYTTÄMINEN

Pidä kortti mukanas vielä 4 kuukauden ajan Zinbryta-hoidon lopettamisen jälkeen, sillä haittavaikutuksia voi ilmaantua vielä hoidon päättymisen jälkeen.

Katso lisätietoja pakkausselosteesta.

MIHIN ZINBRYTA®-VALMISTETTA KÄYTETÄÄN

Zinbryta 150 mg -valmistetta käytetään MS-taudin hoitoon. Zinbryta pistetään ihon alle (subkutaanisesti) kuukauden välein.

VAKAVAT HAITTAVAIKUTUKSET

Zinbryta voi aiheuttaa maksan toimintahäiriöitä. Jos sinulla on joskus ollut maksan toimintahäiriöitä, kerro siitä lääkärille ennen kuin käytät Zinbryta-valmistetta.

TIETOA MAKSAN TOIMINTAKOKEISTA

Maksan toimintakokeet

Lääkäri määrää sinulle verikokeita maksan toiminnan tutkimiseksi ennen Zinbryta-hoidon aloittamista, kuukauden välein hoidon aikana ja kuukausittain 4 kuukauteen saakka hoidon lopettamisen jälkeen.

On tärkeää, että käyt näissä säännöllisesti otettavissa verikokeissa.

MAKSAN TOIMINTAHÄIRIÖIDEN OIREET JA LÖYDÖKSET

Maksan toimintahäiriöiden oireet ja löydökset

Jos sinulla on jotakin seuraavista, ota välittömästi yhteys lääkäriin:

- selittämätön pahoinvointi
- oksentelu
- mahakipu
- lisääntynyt väsymys
- ruokahaluttomuus
- ihon ja silmänvalkuaisten keltaisuus
- tumma (teen värinen) virtsa

Nämä oireet saattavat viitata maksan toimintahäiriöihin. Jos sinulle kehittyy maksan toimintahäiriöitä, hoitava lääkäri voi keskeyttää Zinbryta-hoidon ja lähettää sinut maksasairauksiin erikoistuneen lääkärin hoitoon.

MITEN TOIMIA, JOS SINULLA ON MAKSAN TOIMINTAHÄIRIÖIDEN OIREITA TAI LÖYDÖKSIÄ

Miten toimia, jos sinulla on maksan toimintahäiriöiden oireita tai löydöksiä

Jos sinulla on jokin mainituista maksan toimintahäiriöiden oireista tai löydöksistä, hakeudu viipymättä lääkärinhoitoon.

Lieviltäkin tuntuvat oireet voivat johtaa vakaviin tai jopa hengenvaarallisiin sairauksiin, jos niitä ei hoideta.