

Patient Alert Card



Eliquis[®]

(apixaban)

Carry this card with
you at all times

Show this card to your pharmacist, dentist and
any other healthcare professionals that treat you.

Information for patients

- Take Eliquis[®] regularly as instructed. If you miss a dose, take it as soon as you remember and continue to follow your dosing schedule.
- Do not stop taking Eliquis[®] without talking to your doctor, as you are at risk of suffering from a stroke or other complications.
- Eliquis[®] helps to thin your blood. However, this may increase your risk of bleeding.
- Signs and symptoms of bleeding include bruising or bleeding under the skin, tar-coloured stools, blood in urine, nose-bleed, dizziness, tiredness, paleness or weakness, sudden severe headache, coughing up blood or vomiting blood.
- If the bleeding does not stop on its own, **seek medical attention immediately.**
- If you need surgery, inform your doctor that you are taking Eliquis[®].



Potilaskortti



Eliquis[®]

(apiksabaani)

Pidä tämä kortti aina
mukanasi.

Näytä tämä kortti apteekkihenkilökunnalle,
hammaslääkärille tai muulle sinua hoitavalle
terveydenhuollon ammattilaiselle.

Tietoa potilaille

- Ota Eliquis[®] säännöllisesti ohjeiden mukaan. Jos unohdat annoksen, ota se heti kun muistat ja jatka sitten hoitoa tavanomaisen aikataulun mukaan.
- Älä lopeta Eliquis[®]-lääkkeen käyttöä keskustelematta ensin lääkärisi kanssa, sillä sinulla on riski saada aivohalvaus tai muita komplikaatioita.
- Eliquis[®] auttaa ohentamaan verta. Tämä voi kuitenkin suurentaa verenvuotoriskiäsi.
- Verenvuodon merkkeihin ja oireisiin kuuluvat mustelmat tai ihonalainen verenvuoto, mustaksi värjäytyvä uloste, verinen virtsa, nenäverenvuoto, huimaus, väsymys, kalpeus tai heikotus, äkillinen vaikea päänsärky, veriyskä tai verioksentus.
- Jos verenvuoto ei lopu itsestään, **hakeudu heti hoitoon.**
- Jos tarvitset leikkaushoitoa, kerro lääkärillesi, että käytät Eliquis[®]-lääkettä.



Patientkort



Eliquis[®]

(apixaban)

Bär med dig detta kort vid
alla tillfällen

Visa detta kort på apoteket, hos tandläkaren och för
all annan sjukvårdspersonal som behandlar dig.

Information till patienten

- Ta Eliquis[®] regelbundet enligt instruktionerna. Om du missar en dos, ta den så snart du kommer ihåg och fortsätt följa ditt doseringsschema.
- Sluta inte ta Eliquis[®] utan att rådfråga din läkare, eftersom du riskerar att få en stroke eller andra komplikationer.
- Eliquis[®] hjälper till att förtunna blodet. Emellertid kan detta öka risken för blödning.
- Tecken och symtom på blödning kan vara blåmärken eller blödning under huden, svartfärgad avföring, blod i urinen, näsblod, yrsel, trötthet, blekhet eller svaghet, plötslig svår huvudvärk, att man hostar blod eller kräks blod.
- Om blödningen inte slutar av sig själv, **sök medicinsk vård omedelbart**
- Om du behöver opereras ska du tala om för läkaren att du använder Eliquis[®].

I am under anticoagulation treatment with Eliquis® (apixaban) to prevent blood clots

Information for healthcare professionals

- Eliquis® (apixaban) is an oral anticoagulant acting by direct selective inhibition of factor Xa.
- Eliquis® may increase the risk of bleeding. In case of major bleeding events, it should be stopped immediately.
- Treatment with Eliquis® does not require routine monitoring of exposure. A calibrated quantitative anti-Factor Xa assay may be useful in exceptional situations, e.g., overdose and emergency surgery (prothrombin time (PT), international normalized ratio (INR) and activated partial thromboplastin time (aPTT) clotting tests are not recommended) – see SmPC.

Please complete this section or ask your doctor to do it

Name: _____

Birth Date: _____

Indication: _____

Dose: _____ mg twice daily

Doctor's Name: _____

Doctor's telephone: _____

 Bristol-Myers Squibb





Saan verenhyytymistä estävää Eliquis®-hoitoa (apiksabaani) verisuonitukosten estämiseksi

Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

- Eliquis® (apiksabaani) on suun kautta otettava antikoagulantti, joka vaikuttaa estämällä suoraan ja selektiivisesti hyytymistekijä Xa:ta.
- Eliquis® saattaa suurentaa verenvuotoriskiä. Jos verenvuoto on voimakasta, lääkkeen käyttö on lopetettava välittömästi.
- Lääkeainepitoisuuksia elimistössä ei tarvitse mitata rutiinimaisesti Eliquis®-hoidon aikana. Poikkeustilanteissa, esimerkiksi yliannostuksen ja hätäleikkauksen yhteydessä, anti-FXa-määrittämisestä kalibroidulla kvantitatiivisella testillä voi olla hyötyä. Näitä ei suositella: protrombiiniaika (PT), internationalized normalized ratio (INR) ja aktivoitu partiaalinen tromboplastiiniaika (aPTT) - katso valmisteyhteenveto.

Ole hyvä ja täytä tämä osio itse tai pyydä lääkäriäsi tekemään se

Nimi: _____

Syntymäaika: _____

Käyttöaihe: _____

Annos: _____ mg kahdesti vuorokaudessa

Lääkärin nimi: _____

Lääkärin puhelinnumero: _____

 Bristol-Myers Squibb





Jag behandlas med Eliquis® (apixaban) ett antikoagulantium för att förhindra blodproppar

Information till vårdpersonal

- Eliquis® (apixaban) är ett oralt antikoagulantium som verkar genom att direkt selektivt hämma faktor Xa.
- Eliquis® kan öka risken för blödning. Om en större blödning inträffar ska apixabanbehandlingen omedelbart avbrytas.
- Behandling med Eliquis® kräver inte rutinmässig koncentrationsmätning. Ett kalibrerat kvantitativt anti-faktor Xa test kan vara till hjälp under exceptionella omständigheter, t.e.x vid överdosering och akut kirurgi (protrombintid (PT), internationellt normaliserat ratio (INR) och aktiverad partiell tromboplastintid (aPTT) koaguleringsstest rekommenderas inte) – se Produktresumé.

Vänligen fyll i detta avsnitt eller be din läkare fylla i

Namn: _____


Födelsedatum: _____

Indikation: _____

Dos: _____ mg två gånger dagligen

Läkarens namn: _____

Läkarens telefonnummer: _____

 Bristol-Myers Squibb

