

Kom ihåg-kort för patienter

Erivedge® kan skada ditt foster
eller orsaka fosterdöd.

F/ERN/1702/0012



Riskhanteringsmaterial – September 2016



Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Kvinnliga patienter som kan bli gravida måste:

- Alltid använda **2 former** av rekommenderade preventivmetoder under behandling och inom 24 månader efter sin sista dos (se broschyren "Erivedge graviditetsförebyggande program: Information till patienter som tar Erivedge®" för mer information)
- Göra graviditetstester varje månad för att kontrollera om de är gravida.

Manliga patienter måste:

- Alltid använda kondom (med spermiedödande medel, om tillgängligt) när de har sex med kvinnliga partners under behandling och inom två månader efter sin sista dos.
- Avstå från att donera sperma under behandlingen och inom 2 månader efter den sista dosen.

Du måste omedelbart tala med läkare eller sjukvårdspersonal om du eller din sexpartner inte får menstruation, har missat en menstruation, misstänker graviditet eller är gravid.

• Kvinnliga patienter:

Prata med läkare om du misstänker att du är gravid medan du tar Erivedge® och inom 24 månader efter din sista dos.

• Manliga patienter:

Prata med läkare om din kvinnliga partner misstänker att hon är gravid medan du tar Erivedge® och inom två månader efter din sista dos.

Alla patienter måste:

Aldrig ge detta läkemedel till någon annan person. Avstå från att lämna blod under behandlingen eller inom 24 månader efter den sista dosen. Återlämna alla oanvända kapslar efter avslutad behandling

Telefonnummer vid nödsituation

Kontorstid	
Utanför kontorstid	