

## Allvarliga infektioner

Andra allvarliga infektioner kan inträffa med TYSABRI. Tala med din läkare så fort som möjligt om du tror att du fått en allvarlig och långvarig infektion, exempelvis långvarig feber.

Patientens namn \_\_\_\_\_

Läkarens namn \_\_\_\_\_

Läkarens telefonnummer \_\_\_\_\_

Datum behandling med TYSABRI påbörjade \_\_\_\_\_

Biogen Finland Oy  
Bertel Jungs platsen 5 C  
02600 Esbo

[www.biogen.fi](http://www.biogen.fi) (på finska)  
[www.ms-nyt.fi](http://www.ms-nyt.fi) (på finska)



## PATIENTINFORMATIONSKORT FÖR TYSABRI (natalizumab)



TY-FI-0183(2) | 04/2017  
Godkännandedatum: 06/2016

**Detta informationskort** innehåller viktig säkerhetsinformation som du behöver känna till innan, under och efter avslutad behandling med TYSABRI.

- Visa detta kort för alla behandlande läkare, inte endast neurologen.
- Läs bipacksedeln för TYSABRI innan du påbörjar behandlingen.
- Spara det här kortet i sex månader efter sista TYSABRI-dosen eftersom biverkningar kan inträffa efter avslutad behandling med TYSABRI.
- Visa det här kortet för din partner eller vårdgivare. De kan upptäcka symtom på PML som du själv inte ser, till exempel förändrat humör eller beteende, minnesluckor eller tal- och kommunikationssvårigheter. Du bör vara uppmärksam på symtom som kan uppstå i upp till 6 månader efter avslutad behandling med TYSABRI.

## Före behandling med TYSABRI

- Du får inte behandlas med TYSABRI om du har allvarliga problem med immunsystemet.
- Du ska inte ta några andra läkemedel för långvarig behandling av multipel skleros medan du får TYSABRI.

## Under behandling med TYSABRI

### **Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)**

PML, en mindre vanlig hjärninfection, har inträffat hos patienter som fått TYSABRI. PML leder vanligtvis till allvarlig funktionsnedsättning eller döden. Risken för PML förefaller öka med behandlingstiden, i synnerhet efter två år. Symtomen på PML kan likna ett MS-skov. Om du tror att din MS försämras eller om du upptäcker nya symtom under behandling med TYSABRI eller i upp till 6 månader efter avslutad behandling med TYSABRI är det därför viktigt att

du talar med din läkare så fort som möjligt. PML-symtom utvecklas i allmänhet långsammare än symtom för ett MS-skov (över dagar eller veckor), men kan likna MS-symtom. Tecken kan vara:

- förändringar i mental förmåga och koncentration
- beteendeförändringar
- svaghet i kroppens ena sida
- synstörningar
- nya neurologiska symtom du inte känner igen.

Behandling av PML kräver att behandlingen med TYSABRI upphör och att blodet renas från läkemedlet, vanligtvis genom plasmautbyte. För patienter med PML uppträder vanligen en allvarlig inflammatorisk reaktion, kallad IRIS, inom dagar eller veckor efter att behandlingen mot PML påbörjats (och TYSABRI avlägsnats). IRIS kan leda till olika symtom, inklusive försämrad neurologisk funktion.