

Potilaskortti

Tietoa potilaille OLUMIANT[®] -lääkkeestä (barisitinibi)

Tässä potilaskortissa kerrotaan tärkeistä turvallisuustiedoista, joihin sinun on tutustuttava ennen Olumiant-hoidon aloittamista ja pidettävä mielessä hoidon aikana.

Pidä nämä tiedot mukanasasi ja näytä potilaskortti sinua hoitaville terveydenhuollonammattilaisille.

Nimesi:

Olumiant-lääkkeen määränneen lääkärin nimi:

Lääkärin puhelinnumero:

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan:

www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

FI-00034 FIMEA

tai myyntiluvanhaltijalle:

Oy Eli Lilly Finland Ab,

medinfo_finland@lilly.com,

puh. 0800 140 240 (ma-pe klo 9-15)



Raskaus

- Älä käytä Olumiant-lääkettä, jos olet tai epäilet olevasi raskaana.
- Käytä tehokasta ehkäisyä Olumiant-hoidon aikana (ja 1 viikon ajan hoidon päättymisen jälkeen).
- Kerro heti lääkärille, jos tulet raskaaksi (tai suunnittelet raskautta).

Infektiot

Olumiant voi pahentaa olemassa olevaa infektiota tai suurentaa uuden infektion saamisen tai virusten uudelleen aktivoitumisen mahdollisuutta. Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulla on infektioiden oireita, esim. seuraavia:

- Kuumetta, haavoja, tavallista voimakkaampaa väsymystä tai hammasvaivoja.
- Pitkittyvää yskää, yöhikoilua ja painon laskua. Ne voivat olla tuberkuloosin (keuhkojen infektiotaudin) merkkejä.
- Kivuliasta, rakkulaista ihottumaa. Se voi olla vyöruusun merkki.

Veren rasva-arvot

Lääkäri saattaa tarkistaa veren rasva-arvot ja kolesteroliarvot Olumiant-hoidon aikana.

Veritulpat

Olumiant voi aiheuttaa tilan, jossa alaraajaan muodostuu veritulppa, joka voi kulkeutua keuhkoihin. Kerro välittömästi lääkärille, jos sinulla on jokin seuraavista oireista:

- Turvotusta tai kipua toisessa jalassa
- Kuumotusta tai punoitusta toisessa jalassa
- Odottamatonta hengästy mistä
- Nopeaa hengitystä
- Rintakipua.

Version 06/2022

Fimea hyväksynyt potilaskortin 5.7.2022