


## OHJEET:

Aseta paino ja pituus soveltaen sopivia mittayksiköitä. Lue kehon pinta-ala nuolen kohdalta.



Kehon pinta-ala (m<sup>2</sup>)

Laskettu kaavalla: Dubois and Dubois, Arch Intern Med 1916;17:863

3,5 mg VELCADE®-liuoksen käyttövalmiiksi saattaminen

Laskimoon antoa varten

Antoreitti	Pakkauskoko	Liutustilavuus	Lopullinen pitoisuus
Vain laskimon sisäiseen antoon	3,5 mg	3,5 ml	1,0 mg/ml

3,5 mg VELCADE®-liuoksen saattaminen käyttövalmiiksi

Ihonalaista antoa varten

Antoreitti	Pakkauskoko	Liutustilavuus	Lopullinen pitoisuus
Vain ihon alaiseen antoon	3,5 mg	1,4 ml	2,5 mg/ml

Tietoja annostuksen muuttamisesta löydät valmisteyhteenvedon osioista varoitukset ja käyttöön liittyvät varoitimet sekä annostus ja antotapa.

**Annetaan vain ihon alle tai laskimoon. Ei saa antaa minkään muun antoreitin kautta.**

# Antotapa

## Injektiona laskimoon:

Käyttövalmiiksi saatettu liuos annetaan 3–5 sekuntia kestäväenä bolusinjektiona perifeeriseen laskimoon tai keskuslaskimokatetrin kautta, jonka jälkeen huuhdellaan steriilillä 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridi-injektionesteellä.

## Injektiona ihon alle:

Käyttövalmiiksi saatettu liuos annetaan ihon alle reiteen (oikea tai vasen, proksimaaliset ja distaaliset kohdat) tai vatsaan (oikea tai vasen puoli, ylempi tai alempi kvadrantti). Peräkkäisten pistosten pistoskohtaa on vaihdeltava.

### Esimerkki

Kehon pinta-ala m <sup>2</sup>	Tarvittava kokonaisannos (mg) käytettäessä 1,3 mg/m <sup>2</sup>	Sovellettava tilavuus annettaessa laskimoon (ml)	Sovellettava tilavuus annettaessa ihon alle (ml)
1.5	1.95	2.0	0.8
1.6	2.08	2.1	0.8
1.7	2.21	2.2	0.9
1.8	2.34	2.3	0.9
1.9	2.47	2.5	1.0
2.0	2.60	2.6	1.0
2.1	2.73	2.7	1.1

Viite: Moreau P et al, Lancet Oncol 2011;12:431-40

