



Potilaan turvallisuskortti

Pidä tämä kortti mukanasasi tai Enbrelä saavan lapsen mukana vielä 2 kk ajan viimeisen Enbrel-annoksen jälkeen, sillä haittavaikutuksia voi esiintyä vielä Enbrel-hoidon päätyttyäkin.

Tämä kortti sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, joista sinun tai Enbrelä saavan lapsen tulee tietää ennen Enbrel-hoidon aloittamista ja hoidon aikana. Jos jokin kortin seikka jää epäselväksi, pyydä lääkäriä selittämään se sinulle.

- Näytä tämä kortti kaikille sinua tai lasta hoitaville lääkäreille.
- Ks. lisätiedot Enbrel-valmisteen pakkausselosteesta.
- Sinun ja lääkärisi on tärkeää muistaa merkitä muistiin saamasi lääkkeen nimi ja eränumero.

Infektiot

Enbrel voi suurentaa riskiä saada jokin, ehkä vakavakin, infektio.

- Älä käytä Enbrelä, jos sinulla tai Enbrelä saavalla lapsella on jokin infektio. Jos olet epävarma, kysy neuvoa lääkäriltäsi.
- Hakeudu heti lääkärin hoitoon, jos sinulle tai Enbrelä saavalle lapselle kehittyvät infektioihin viittaavia oireita kuten kuumetta, pitkittynyttä yskää, painon laskua tai voimattomuutta.
- Sinut tai Enbrelä saava lapsi on tutkittava tuberkuloosin varalta. Lääkäri merkitsee viimeisimmän tuberkuloositutkimuksen päivämäärän ja tulokset tähän.

Testi: _____

Päivämäärä: _____

Tulokset: _____

Testi: _____

Päivämäärä: _____

Tulokset: _____

- Pyydä lääkäriä kirjaamaan tähän muut lääkkeesi tai Enbrelä saavan lapsen lääkkeet, jotka voivat suurentaa riskiä saada infektio.

_____	_____
_____	_____
_____	_____

Kongestiivinen sydämen vajaatoiminta

- Jos sinulla tai Enbrelä saavalla lapsella esiintyy kongestiivisen sydämen vajaatoimintaan tai jo todetun kongestiivisen sydämen vajaatoiminnan pahentumiseen liittyviä oireita kuten hengenhdistusta, nilkkojen turvotusta, pitkittynyttä yskää tai uupumusta, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.

Muuta tietoa (täytä)

Potilaan nimi: _____

Lääkärin nimi: _____

Lääkärin puhelinnumero: _____