

Cerdelga®
eliglustaatti

POTILASKORTTI

Tietoja potilaalle

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista Fimealle: www.fimea.fi, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA.

Pitäkää tämä kortti aina mukanaan ja näyttäkää se kaikille terveydenhuollon ammattilaisille, jotta he tietävät CERDELGA®-hoidostanne.

- Älkää aloittako mitään reseptilääkitystä, itsehoitolääkitystä tai rohdosvalmisteiden käyttöä kertomatta siitä lääkärille tai farmaseutille.
- Älkää käytäkö greippivalmisteita.

Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

CERDELGA®-valmistetta käytetään niiden tyyppin I Gaucher'n tautia (GD1) sairastavien aikuispotilaiden pitkäaikaiseen hoitoon, joilla CYP2D6-metabolia on hidasta, keskinopeaa tai nopeaa.

Lisätietoja saatte valmisteyhteenvedosta.

Nopeat ja keskinopeat CYP2D6-metabolioijat:

- CERDELGA®-valmistetta ei tule käyttää yhdessä vahvan tai kohtalaisen CYP2D6:n estäjän kanssa, kun samanaikaisesti käytetään vahvaa tai kohtalaista CYP3A:n estäjää
- CERDELGA®-valmistetta ei tule käyttää potilaille, jotka ovat nopeita CYP2D6-metabolioijia ja joilla on
 - vaikea maksan vajaatoiminta
 - lievä tai kohtalainen maksan vajaatoiminta, kun samanaikaisesti käytetään vahvaa tai kohtalaista CYP2D6:n estäjää
- CERDELGA®-valmisteen käyttöä ei suositella
 - nopeille CYP2D6-metabolioijille, joilla on kohtalainen maksan vajaatoiminta
 - keskinopeille CYP2D6-metabolioijille, joilla on minkä tahansa vaikeusasteen maksan vajaatoiminta
- CERDELGA®-valmisteen yhteiskäyttöä vahvan CYP3A:n induktorin kanssa ei suositella
- CERDELGA®-valmistetta tulee käyttää varoen yhdessä seuraavien kanssa:
 - kohtalainen CYP2D6:n estäjä
 - vahva tai kohtalainen CYP3A:n estäjä
 - P-gp:n tai CYP2D6:n substraatti (kyseisten lääkkeiden annoksen pienentäminen saattaa olla tarpeen)

- CERDELGA®-valmistetta ei suositella nopeille tai keskinopeille CYP2D6-metabolioijille, joilla on loppuvaiheen munuaissairaus, eikä keskinopeille CYP2D6-metabolioijille, joilla on lievä, kohtalainen tai vaikea munuaisten vajaatoiminta
- CERDELGA®-annos tulee laskea tasolle 84 mg KERRAN päivässä:
 - nopeilla tai keskinopeilla CYP2D6-metabolioijilla, jotka saavat samanaikaisesti vahvaa CYP2D6:n estäjää
 - nopeilla CYP2D6-metabolioijilla, joilla on lievä maksan vajaatoiminta ja jotka saavat heikkoa CYP2D6:n estäjää tai mitä tahansa CYP3A:n estäjää.

Hitaat CYP2D6-metabolioijat:

- CERDELGA®-valmistetta ei tule käyttää yhdessä vahvan CYP3A:n estäjän kanssa
- CERDELGA®-valmisteen käyttöä ei suositella hitaille CYP2D6-metabolioijille, joilla on minkä tahansa vaikeusasteen maksan vajaatoiminta
- CERDELGA®-valmisteen yhteiskäyttöä seuraavien kanssa ei suositella:
 - vahva CYP3A:n induktori
 - kohtalainen CYP3A:n estäjä
- CERDELGA®-valmistetta ei suositella hitaille CYP2D6-metabolioijille, joilla on loppuvaiheen munuaissairaus, eikä hitaille CYP2D6-metabolioijille, joilla on lievä, kohtalainen tai vaikea munuaisten vajaatoiminta
- CERDELGA®-valmistetta tulee käyttää varoen yhdessä seuraavien kanssa:
 - heikko CYP3A:n estäjä
 - P-gp:n tai CYP2D6:n substraatti (kyseisten lääkkeiden annoksen pienentäminen saattaa olla tarpeen).



Potilaan nimi: _____

CERDELGA®-hoidon
aloituspäivämäärä: _____

Hoitopaikka: _____

Hoitava lääkäri: _____

Hoitavan lääkärin
puhelinnumero: _____