

Guide med vanliga frågor för patienter som använder Xyrem®

Denna guide innehåller frågor och svar om Xyrem® och hur du använder det. Vi ber dig tala med sjukvårdspersonal angående andra eventuella frågor samt att läsa igenom bipacksedeln som finns i Xyrem®-förpackningen.

1. Vad är Xyrem®?

Xyrem® är ett receptbelagt läkemedel som tas via munnen och används för att behandla vuxna som:

- ofta somnar på dagtid och vid oväntade tillfällen (narkolepsi);
- drabbas av plötslig muskelsvaghet eller förlamning när de upplever starka känslor (kataplexi).

2. Får jag dricka alkohol medan jag tar Xyrem®?

Nej, du får inte dricka alkohol medan du tar Xyrem®. Alkohol kan förstärka Xyrem's effekter och försvåra andningen (andningsdepression) och detta kan vara livshotande. Även störningar i tankeverksamheten eller förvirring kan förekomma.

3. Vilka allvarliga biverkningar har Xyrem®?

Andningssvårigheter (andningsdepression)

Xyrem® kan påverka andningen. Om du har andningssvårigheter eller lungproblem ska du informera läkaren innan du börjar

ta Xyrem®. Om du är överviktig är risken för andningsdepression större än vanligt. Alkohol ska inte heller användas eftersom den kan öka risken för andningsdepression. Andningsdepression kan vara allvarlig och till och med livshotande.

Depression och självdestruktiva tankar

Om du känner dig nedstämd eller har tankar på att skada dig själv medan du tar Xyrem® ska du genast informera din läkare. Du ska också informera din läkare om du tidigare har lidit av depression.

Sänkt medvetandegrad

Eftersom Xyrem® verkar direkt på hjärnan orsakar det dåsighet och kan sänka medvetandegraden. Detta kan leda till koma och kan vara livshotande. Det är viktigt att inte dricka alkohol under behandling med Xyrem®. Andra läkemedel som orsakar dåsighet ska inte användas. Undvik även att köra bil eller använda maskiner under minst 6 timmar efter intag av Xyrem®.

Krampanfall

Xyrem® kan orsaka krampanfall. Innan du börjar ta Xyrem® ska du tala om för läkaren om du har haft krampanfall tidigare.

Beroende/missbruk/felanvändning

Den aktiva substansen i Xyrem® är gammahydroxybutyrat (GHB). GHB är en kemisk substans som har missbrukats och felanvänts. Din läkare kommer därför att specifikt fråga dig om du har missbrukat läkemedel tidigare. Missbruk och felanvändning av Xyrem® är farligt och kan till och med leda till dödsfall.

Dessa är inte alla Xyrem's biverkningar. Vi ber dig vända dig till din läkare om du vill ha mer information om biverkningarna.

4. Är Xyrem® säkert att använda tillsammans med andra läkemedel?

Som med alla andra läkemedel är det mycket viktigt att du informerar din läkare om alla andra läkemedel som du tar, inklusive s.k. egenvårdsläkemedel. Xyrem® ska inte användas i kombination med läkemedel som orsakar dåsighet eller till exempel narkotiska smärtstillande läkemedel eller andra läkemedel som kan dämpa det centrala nervsystemet. Kom ihåg att tala om för din läkare om du tar läkemedel som ökar aktiviteten i det centrala nervsystemet, antidepressiva läkemedel eller läkemedel som kroppen hanterar på liknande sätt, till exempel valproat, topiramat, fenytoin eller etosuximid.

Be sjukvårdspersonal om ett patientkort för Xyrem® och ha det alltid med dig för att påminna dig om hur Xyrem® ska användas. Visa detta kort för alla läkare som behandlar dig så att de vet att du tar Xyrem®, särskilt om de skriver ut andra läkemedel till dig.

5. Vad ska jag göra om jag råkar ta mer Xyrem® än den förskrivna dosen?

Sök genast akut hjälp om du tar för mycket Xyrem® (överdosering). Symtom på överdosering av Xyrem® kan vara upprördhet, förvirring, nedsatt rörlighet, andningssvårigheter, dimsyn, överdriven svettning, huvudvärk, kräkningar och sänkt medvetandegrad som leder till koma samt krampanfall. Det underlättar för sjukvårdspersonalen att behandla dina symtom om du tar med dig den etikettförsedda läkemedelsflaskan, även om den är tom.

6. Vad händer om jag plötsligt slutar att ta Xyrem®?

Om du plötsligt slutar att ta Xyrem® kan du uppleva abstinens. De kataplektiska anfällen kan återkomma och i vissa sällsynta fall kan sömnlöshet, huvudvärk, ångest, yrsel, sömnsvårigheter, dåsighet, hallucinationer och onormala tankar förekomma.

7. Vad annat är viktigt att veta om behandling med Xyrem®?

- Dela inte Xyrem® med någon.
- Använd endast den dos som din läkare skrivit ut till dig. Om du anser att dosen behöver ändras, kontakta din läkare.
- Var noga med att vänta minst 2 timmar efter en måltid innan du tar Xyrem®.
- Förvara alltid Xyrem® på en säker plats i originalförpackningen.
- Förvara Xyrem® utom syn- och räckhåll för barn
- Lämna tillbaka oanvänt läkemedel till ditt apotek
- Tala omedelbart om för din läkare om du upplever ovanliga symptom som till exempel ovanliga tankar, inklusive tankar på att skada andra, medan du tar Xyrem®.

UCB Xyrem Guide med vanliga frågor för patienter som använder Xyrem v. 2.2
Denna information är en del av det riskhanteringsprogram som begärts av EMA.



UCB Pharma Oy Finland
Bertel Jungs plats 5, 02600 Esbo
Tel. (09) 2514 4221
ucb.finland@ucb.com